



BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele III


**XXIII**

**C**

**19**

APOLI









26.  
INSTITUTIONES  
*PHILOSOPHICÆ,*

AUCTORITATE

D. D.

ARCHIEPISCOPI LUGDUNENSIS,

AD USUM SCHOLARUM SUE DIOECESIS  
EDITÆ.

TOMUS SEXTUS.



*PHYSICÆ PARS II.*



BASSANI, MDCCXCI.

---

PROSTANT  
VENETIIS APUD REMONDINI.

*Superiorum Permissu, ac Privilegio.*

CHRYSLER  
CORPORATION  
CHRYSLER

6.2.1 THE PROPOSED PROJECT CA  
6.2.2 THE PROPOSED PROJECT CA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET



ARMED AND DANGEROUS

# INDEX

Tomi Sexti.

## PARS TERTIA

### PHYSICÆ SPECIALIS

*Sive de Terra & Corporibus terrestribus.* pag. II.

#### DISSERTATIO I.

**D**E qualitatibus Corporum terrestrium sensibilibus. ibid.

**CAPUT I.** De corporum qualitatibus ad tactus organum pertinentibus. 12

**SECTIO I.** De Igne. ibid.

**PROPOSITIO.** Ignis est fluidum, ubique diffusum, cujus partes sunt tenuissima, elastica, rigida, motuque pernicissimo agitata. 13

**Q. I.** Quenam sint ignis proprietates. ibid.

**Q. II.** Undenam pendeat ignis inflammatio & propagatio. 16

**QUESTIONES** alia plurima circa ignem. 18

**SECTIO II.** De Calore. 26

**ART. I.** De Caloris causa. ibid.

**PROP.** Calor oritur e particulis igneis e corpore calido erumpentibus. 27

**QUEST.** diversæ circa calorem. 28

**ART. II.** De Fermentatione. 32

**EXPERIM.** quedam circa fermentationem. ib.

**Q.** Quenam sit genuina fermentationis causa. 36

**ART. III.** De Calore subterraneo & centrali. 37.

**ARGUMENTA** Physicorum qui globo terrestri centalem vindicant calorem. 38

**ARG.** Physicorum qui calorem terræ centalem rejiciunt. 40

- SECTIO III. De Frigore. — 46  
 ART. I. De Frigoris nature causis. ibid.  
 PROP. Frigus ex parte corporis frigidi consistit  
 in partium ignearum absentia, vel quiete. 47  
 QUÆST. Variæ circa frigus. ibid.  
 ART. II. De Glacie. 49  
 §. I. Quid sit Glacies, quomodo concreascet,  
 quanta sit ipsius firmitas, utrum dilatetur a-  
 qua congelata. 50  
 §. II. De Congelationis causa. 52  
 §. III. Variæ proponuntur questiones ad gelu &  
 glaciem pertinentes. 57  
 SECTIO IV. De Corporum duritie. 62  
 SECTIO V. De Corporum fluiditate. 66  
 CAPUT II. De qualitate Corporum sensibili quæ  
 gustum afficit. 69  
 PROP. Sapor ex parte corporis sapidi consistit in  
 illius particularum motu, figura, aliisque affe-  
 ctionibus mechanicis. 70  
 CAPUT III. De sensibili Corporum qualitate  
 quæ odoratus organum afficit. 72  
 PROP. Odores consistunt in effluviis partium sul-  
 phurearum & salinarum, quæ sunt tenuissi-  
 me. ibid.  
 CAPUT IV. De qualitate Corporum sensibili,  
 quæ auditus organum afficit, sive de Sono. 76  
 ART. I. In quo consistat sonus, & quo medio  
 nostras ad aures perveniat. ibid.  
 PROP. I. Sonus ex parte corporis spectatus con-  
 sistit in partium ejus insensibilium motu tre-  
 mulo, reciproco, seu vibrationis. ibid.  
 PROP. II. Aer est vehiculum soni. 78  
 PROP. III. Sonus ab aere non diffunditur per  
 motum undulationis. 79  
 PROP. IV. Sonus ad aures nostras ab aere de-  
 fertur per motum ipsius tremulum, seu vibra-  
 tionis. ibid.  
 Solvuntur objecta. 81  
 Q. I. Utrum aqua sit etiam soni vehiculum. 84  
 Q. II. An corpora etiam solida possint sonum  
 trans-

<i>transmittere.</i>	86
ART. II. De Soni proprietatibus.	87
§. I. De Soni propagatione.	ibid.
Q. I. Quanta velocitate sonus propagetur.	ibid.
Q. II. Utrum flante vento minuatur, an augeatur Soni velocitas.	88
Q. III. Quenam sit ratio juxta quam vis Soni propagatione minuatur.	ibid.
§. II. De Soni reflexione.	89
QUÆST. variae de Sono reflexo, de Tuba vocali, de causa & effectibus echo, &c.	ibid.
ART. III. De Soni effectibus.	93
ART. IV. De modo quo formatur Vox humana.	96
Q. An Lingua præcipuum sit vocis humanæ organum.	97
CAPUT V. De Corporum qualitate sensibili, quæ visus organum afficit, sive de Lumine.	98
ART. I. De natura Luminis.	99
SENTENTIA Cartesii.	100
SENT. Malebranchii.	102
SENT. Newtonis.	103
ART. II. De Luminis propagatione.	106
PROP. I. Propagatio Luminis fit per lineas rectas.	ibid.
PROP. II. Lumen a sole ad oculos pervenit intra 7. circiter minuta.	ibid.
PROP. III. Lumen diffunditur per radios divaricantes (divergens) qui conos lucidos efficiunt.	107
PROP. IV. Vis Luminis eo minor est quo magis crescit spatium illuminatum.	ibid.
PROP. V. Vis, seu densitas Luminis decrescit, prout crescit quadratum distantie id est, vis Luminis semper est in ratione inversa quadrati distantiarum a corpore lucido.	108
ART. III. De Lumine reflexo.	109
Q. I. Quenam causa Luminis radios reflectat.	ib.
Q. II. Quenam corpora sint reflectendis radiis aptiora.	111
SECT. I. De Speculis planis.	112

SECT. II. De Speculis convexis & sphericis .	115
SECT. III. De Speculis concavis .	118
ART. IV. De Lumine refracto .	119
Q. I. Cur radii Luminis ab aere in aquam, vel aliud medium densius commeantes, ad perpendiculararem lineam accedant, dum legem oppositam alia sequuntur corpora .	120
Q. II. Quam mutationem subeant radii luminis, dum ex aere in vitrum, & vice versa transiunt .	122
SECT. I. De vitris convexis .	ibid.
SECT. II. De Vitris concavis .	124
ART. V. De Visione .	125
§. I. De Visus organo, sive Oculo .	ibid.
Q. I. Quenam sint præcipue Oculi tunice .	ib.
Q. II. Quinam sine Oculi humores .	127
Q. III. Quem ad usum illas Oculi tunicas, illos humores Deus destinaverit .	ibid.
Q. IV. Cur Myopes objecta propinqua clare videant, confuse vero ea quæ sunt remota .	129
Q. V. Cur Presbytæ objecta remota clare videant, confuse autem propinqua .	130
§. II. Traduntur quedam definitiones & theoremata, quæ ad Visionem pertinent .	ibid.
§. III. Proponuntur variae quæstiones ad Visionem spectantes .	138
ART. VI. De Coloribus .	140
PROP. I. Lumen constat ex radiis specie diversis .	143
PROP. II. Radii specie diversi variis modis refringuntur .	ibid.
PROP. III. Radii qui magis refringuntur, facilius etiam reflectuntur .	144
PROP. IV. Luminis radius simplex eundem semper colorem retinet, quocumque modo reflectatur aut refringatur .	145
PROP. V. Color albus ex radiorum simplicium permixtione oritur .	ibid.
PROP. VI. Corpus ideo nigrum apparet, quod omnes aut fere omnes radios absorbeat .	146
PROP.	

PROP. VII. *Colorum diversitas quæ in corporibus sese prodit, ex eo pendet quod nonnullos radios abundantius reflectant, quam alios quoscunque.* ibid.

CAPUT VII. *De Phosphoris.* 149

*De Phosphoris naturalibus.* ibid.

*De Phosphoris artificialibus.* 152

## DISSERTATIO II.

*De Phænomenis ad globum terrestrem pertinentibus.* 155

CAPUT I. *De Phænomenis terrestribus.* ibid.

ART. I. *De Magnete.* ibid.

ART. II. *De Electricitate.* 160

§. I. *De Signis ex quibus pater corpus aliquod esse actu electricum; de instrumentis excitandæ electricitati idoneis; quid conductoris nomine intelligatur, & quæ esse debeant ipsius dotes.* 161.

§. II. *De modo quo materia electrica in conductorem transeat, in ipsoque colligatur.* 165

§. III. *De materiæ electricæ natura.* 167

PROP. I. *Inter materiam electricam & ignem communem ac lumen plurima est cognatio.* ibid.

PROP. II. *Inter electricitatem & ignem tum communem, tum solarem, multiplex intercedit discrepantia.* 172

§. IV. *De causa effectuum electricorum physica, & præsertim de opinione D. Nollet.* 174

*Explicantur phænomena quædam electrica juxta D. Nollet systema.* 176

*Diversitas opinionum D. Franklin & D. Nollet in explicando Leidensi (de Leyde) experimento.* 179

Q. I. *Utra sententia magis ad verum accedat.* 181

Q. II. *Utrum aqua, vel minutum plumbum, aliave corpuscula quæ in lagenam excitandæ commotioni destinata intromitti solent, ele-*

- Electricitatem in seipsis recipiant; an vero mera sint vehicula quibus electricitas in superficiem lagenæ interiorē deferatur.* 182
- §. V. De proprietate quam habent cuspides (les pointes) materiam electricam hauriendi. 184
- §. VI. De causis virtutem electricam minuētib. 185
- §. VII. De materie electricæ variis corporibus applicatione. 188
- ART. III. De terre motu. 191
- §. I. De causis quibus tribuendi sint terræ motus. ibid.
- §. II. Proponuntur variae quæstiones ad terræ motum pertinentes. 195
- ART. IV. De Montibus vulcaniis (des Volcans.) 199
- CAPUT II. De Phænomenis aqueis. 201
- ART. I. De natura & proprietatibus Aquæ. ibid.
- QUÆRES 1. quenam figura aquæ partibus tribuenda sit; 2. quotuplex sit aquæ utilitas; 3. utrum comprimi queat; 4. quantam corpora dissolvendi vim habeat, cum in vase accuratè occlusa vehementer calefit; 5. quandonam in vapores abeat; 6. quantum amplificetur volumen aquæ in vapores resolutæ; 7. quid valeant vapores, quando spatium non habent, in quod sese expandere possint; 8. utrum quedam sit aqua purissima; 9. quenam ex omnibus aquis sit maxime sincera; 10. quomodo purgari possit aqua quam in potum adhibemus. ibid.
- ART. II. De Æstu maritimo. 209
- SENT. Cartesianorum. 210
- SENT. Newtonianorum. 212
- ART. III. De maris Salsedine. 217
- Q. I. Quenam sit marinæ salsedinis causa. ib.
- Q. II. Quibusdam causis tribuenda sint varia illius salsedinis discrimina. 218
- Q. III. cur in fundo maris reperiantur aquæ dulces; 4. an repertum fuerit quoddam artificium, quo maris aqua distillata suam omnem exuat sal-



<i>falsedinem; §. cur aqua pluvialis quæ vaporibus e mari solis calore sublatis constat, sit dulcis, dum aqua maris arte distillata suam omnem falsuginem non deponit.</i>	219
<b>ART. IV. De Fontium &amp; Fluminum origine.</b>	222
<b>PROP. I. Fontes immediate non oriuntur ab aquis marinis.</b>	223
<i>Solvuntur objecta.</i>	225
<b>PROP. II. Fontes a pluviis solutisque nivibus oriuntur.</b>	227
<i>Solvuntur objecta.</i>	228
<b>QUÆST. variæ circa Fontes.</b>	230
<b>CAPUT III. De phænomenis aeris, quæ meteo- ra dicuntur.</b>	232
<b>ART. I. De Meteoris humidis, sive aqueis.</b>	235
<i>De Aura serotina ( le serain. )</i>	ibid.
<i>De Rore matutino.</i>	237
<i>De Nebula.</i>	240
<i>De Pruina.</i>	241
<i>De Nubibus.</i>	ibid.
<i>De Pluvia.</i>	243
<i>De Vorticibus turbineis ( trombes )</i>	250
<i>De Nive.</i>	256
<i>De Grandine.</i>	259
<b>ART. II. De Meteoris volatilibus, seu de Ven- tis.</b>	261
<b>ART. III. De Meteoris ignitis &amp; lucidis.</b>	265
<b>§. I. De Tonitru.</b>	266
<b>SECT. I. De modo quo nubes fieri potest electri- ca, &amp; de analogia quæ inter tonitruum, fulmi- nis &amp; electricitatis effectus intercedit.</b>	267
<b>SECT. II. Quanam loca plus minusve sint ful- mini obnoxia, &amp; quæ adversus illius ictum cautiones adhibendæ.</b>	273
<b>OBSERVAT. quæ probant nullum esse adversus fulmen remedium efficacius, quam veilem fer- ream quæ in apicem desinat.</b>	275
<b>QUÆST. variæ circa dotes conductori necessa- rias, ut fulminis materiam tutius transmit- tat.</b>	279
<b>A 5</b>	<b>§. II.</b>

§. II. De Globis ignitis.	283
§. III. De Stellis cadentibus & Ignibus fatuis.	286.
§. IV. De Halonibus, Pareliis & Paraseleniis.	287
§. V. De Iride.	289
§. VI. De Aurora boreali.	290

## DISSERTATIO III.

De Variis Corporum terrestrium speciebus.	295
---	-----

CAPUT I. De Fossilibus.	ibid.
ART. I. De Oleis.	ibid.
De Sulphure.	296
De Bituminibus solidis, nempe electo, succino, gagate, carbone fossili & asphaltio.	297
De Bitumine liquido.	304
ART. II. De Salibus.	305
ART. III. De Lapidibus.	312
ART. IV. De Metallis.	317
Aurum.	318
Argentum.	319
Caprum.	322
Ferrum.	325
Stannum.	327
Plumbum & Hydrargirum.	328
CAPUT II. De Vegetalibus, sive Plantis.	329
QUÆST. diversæ circa Plantas,	330



INSTITUTIONES  
PHILOSOPHICÆ.

PARS TERTIA.

PHYSICÆ SPECIALIS,

*Seu de Terra & Corporibus terrestribus.*

**H**ANC Physicæ specialis partem triplici  
dissertatione complectimur. Prima erit  
de qualitatibus corporum terrestrium sen-  
sibilibus; secunda de phœnomenis terre-  
stribus; tertia de variis corporum terrestrium  
speciebus.

DISSERTATIO PRIMA.

*De qualitatibus Corporum terrestrium  
sensibilibus.*

**S**uas habent singula corpora proprietates, sive  
qualitates quibus hæc, vel illa sensuum no-  
strorum organa modo quodam speciali afficiant.  
Idcirco sensibiles vocitantur. Aliæ autem ad

tactum, aliæ ad gustum & olfactum, aliæ ad auditum, aliæ ad visum pertinent. Obvium & dilucidum hunc ordinem quintuplici in capite sectabimur.

## CAPUT PRIMUM.

*De Corporum qualitatibus ad tactus  
organum pertinentibus.*

**Q**ualitates corporum quæ in tactus organum agunt, sunt calor, frigus, durities, liquiditas, & corporum gravitas. De postrema, quæ omnibus communis est corporibus, jam diximus in Physica generali; superest igitur ut de aliis differamus: ut autem ea quæ ad calorem & frigus spectant, facilius intelligantur, quamdam ignis notionem præmittere necesse est. Itaque quinque erunt hujus capitis sectiones.

## SECTIO PRIMA.

*De Igne.*

**N**ihil sensus nostros ferit vividius, quam ignis, qui primo aspectu videtur notissimus; ipsius tamen natura abscondita est, explicatuque difficilis. In eo quippe naturam luisse dicas, ut quæ sensus humanos vehementius impellunt, intellectus aciem maxime fugiant. Cum intima ignis constitutio non lateat, non tam ipsius definitionem, quam descriptionem tradere nobis animus est.

## PROPOSITIO.

*Ignis est fluidum, ubique diffusum, cui partes sunt tenuissimæ, elasticæ, rigidæ, motuque perniciosissimo agitatæ.*

Prob. 1. **I**gnis quoddam est fluidum; namque corpus illud fluidum est, cujus partes ad motum ita sunt expeditæ, ut vel minimæ impressioni facile cedant: atqui hujusmodi est ignis, ut patet ex mobili flamma. Præterea illud fluidi cujusvis proprium est, ut sese quaquaversus æquabiliter diffundat; atqui ita se habet ignis; si enim corpori calidiori alterum admoveatur, calor in corpus contiguum sese transmittere non desinet, donec in utroque corpore æqualis sit caloris gradus.

2. Ignis fluidum est ubique diffusum, nullum quippe in natura corpus, nulla materiæ pars cognoscitur, sive fluida sit, sive solida, in qua ignis non contineatur. Corpora dura, etiam frigidissima, quovis in loco & tempore, ubi attritu fortiter concutiuntur, ignem suppeditant.

3. Partes ignis sunt tenuissimæ, cum vel angustissimas corporum rimulas, & meatus vel minimos subeant.

4. Elasticæ; reflectuntur enim ubi in solidas corporum partes incurrunt, ut liquet, tum ex flamma, tum ex radiis luminis.

5. Rigidæ sunt & motu agitatæ perniciosissimo. Ignis enim corpora vel durissima liquefacit & dissolvit; quod sane non efficeret, si molles essent ipsius particulæ, & nisi motu vehementi agitarentur; ergo, &c.

Nunc proponendæ sunt variæ quæstiones ad ignem pertinentes.

Quæres 1. quanam sint ignis proprietates.

Resp. Eæ sunt ignis proprietates, ut comburat, rarefiat, calcinationem vel ebullitionem procreet.

1. *Ustia*

1. *Ustio* est proprietas quam habet ignis, partes corporum durorum divellendi. In eo tamen a ceteris dissolventibus discrepat, quod partes corporum simul absumat & dissolvat. Isinc lignum, ubi in ignem projicitur, abit partim in fumum, partim in cineres. Ustioni accidit dolor vehementissimus, quia corporis nostri partes, nervi præsertim & fibræ, particularum igneorum incurfu divulsæ, interdumque dilaceratæ, vividum & ingratum in mente, sensum excitant.

2. Ignis corpora omnia rarefacit & dilatat, ut innumera testantur experimenta. Ignitæ enim particulæ in corporum meatus turmatim irumpentes, ipsorum partes, cuneorum instar, disjungunt, & a se invicem removent, unde augeatur corporum volumen necesse est. Ex iis autem alia magis, alia minus, dilatantur. Generatim autem dici potest eo minus rareferi corpora, quo tenacius eorum partes secum invicem cohærent. Hinc corpora solida minus quam fluida, & duriora minus quam mollia igne rarefiunt. Nonnulla ita dilatant, ut liquefiant: ubi enim partes vehementius sese explicant, tunc rumpuntur vincula quibus devinctæ erant, simul cohærere desinunt, in fluidoque igneo innatant, ut plumbo, stanno evenit.

3. *Calcinatio* fit quando corpora quædam lapidea vel metallica, igni vehementiori supponuntur. Tunc enim particulæ ignitæ corporum meatus magna copia subeuntes, illorum partes motu violento concutiunt, dividunt, attenuant. Ubi autem hæc divisio & imminutio ad certum perducta est gradum, tunc corpus in pulverem calci similem redigitur.

**EXPERIMENTUM.** In lapce terrea ponantur 20. libræ plumbi; hanc igni violento exponas; plumbum in ea inclusum cum spatula (*espatula*) moveas, donec in pulverem, sive calcem abierit. Hujus pulveris aut calcis pondus erit 25. librarum. Quo pacto fieri potest, ut ignis qui corporum

porum partes dissipat, plumbi, stanni & aliorum quorundam metallorum pondus augeat?

Ea de re triplex est Physicorum opinio. Putant nonnulli materiam igneam in plumbi foraminibus congestam & densatam, metalli pondus augere, illud in calcem redigendo. Cujus conjecturæ auctor est clarissimus Boyle. Hæc autem refellitur a clarissimo Boerhaave in eximio de igne tractatu. Ferri massula 8. librarum in intima etiam sui parte plurimum incensa, nullum ponderis incrementum acquisivit, etiam dum incandesceret; atqui tamen tunc igneis particulis foeta erat. 2. Omnia corpora in calcem conversa, pondere non augentur, id non substantiis metallicis proprium est: atqui tamen omnia tunc corpusculis igneis maxime abundant; ergo materia ignea vim non habet corporum gravitatem augendi. 3. Longe minor est ponderis accessio, cum metalla in vasis clausis calcinantur, quam ubi in aere aperto; ergo illud gravitatis incrementum particulis igneis perperam adscribitur.

Existimant alii effectum illum esse aeri tribuendum, qui intra plumbum sese insinuat. Plurimum est aeris, inquiunt, in vasis (*creusets*) ubi liquantur metalla; in calcem non abeunt, nisi perpetuo motu agitentur, ac proinde nisi intra metallorum particulas plurimos aer intromittatur; quo magis movetur materia liquescent, & quod uberius est aeris introducti copia, eo perfectior est in calcem conversio, eoque major ponderis accessio. Quis autem concipiat in materia tantopere calefacta satis inesse aeris, eumque sat comprimi, ut tantum ponderis incrementum afferat? Hæc tamen sententia recentiores apud Chymicos, & quidem clarissimos, nunc principatum tenet.

Denique censent multi metalla in calcem versa ideo pondere augeri, quod ipsis adjungantur graves quædam particulae, quæ in aere fluctuant: scilicet, inquiunt, aer non tantum gravis est, sed etiam plurimis admiscetur particulis

lis aqueis, oleosis salinis, sulphureis, quæ suam habent gravitatem. Quando in calcem rediguntur 20. plumbi libræ, ignis fervor aerem calefacit, qui proximus est vasi, in quo liquatur metallum, eum rarefacit, sicque imparem efficit sustinendis, quibus permiscetur, extraneis corpusculis; unde fit ut istorum pars maxima in plumbi superficiem decidat, cum eoque societetur. Primum illud aeris rarefacti volumen eo fit levius qui superior est; ascendit igitur, suumque locum novo cedit aeri, qui alias & ipse in plumbum liquatum particulas demittet; sicque deinceps, donec perfecta fuerit *calcinatio*. Et vero, pergunt iidem Physici, experientia constat aerem intra breve tempus 20. aquæ libras suppeditare 20. salis *tartari* libris ipsi expositis; quidni igitur valeat 20. plumbi libris addere 5. libras particularum gravium, quas sustinere non potuerit?

*Calcinatio* ad corpora solida, *ebullitio* ad fluida pertinet. Observandum est autem 1. fluidum magis ac magis ad ebullitionem usque incallescere, qua peracta, jam calor non augetur; 2. eo difficilius liquorem ebullire, quo majori pondere premitur, quia fluidi particule difficilius ignis actione sursum attolluntur: hinc aqua citius in montis vertice, quam in radice ebullit; 3. liquorum ebullientium calorem generatim eo vegetiorem esse, quo major est eorum viscositas, quia tardius & difficilius ebulliunt. Sic oleum vehementius incalescit quam aqua.

Quæres 2. undenam pendeant ignis inflammatio & propagatio.

Resp. 1. Utrumque illum effectum per motus communicationem explicare tentarunt plurimi; sed parum feliciter. Non equidem negaverint ignis inflammationem & propagationem sine motu non fieri; sed aliquid præterea accedat necesse est; alioquin effectus sua causa major esset: ignis enim ad magnam usque distantiam, & quidem celerrime propagatur; ingens in-



incendium aliquando excitat scintilla ; magnum pulveris pyrii acervum vi subita inflammatur scintilla e filice exiliens : quantulus vero est scintillæ motus , si cum eo comparetur quem postulat ignis propagatio & subita inflammatio , in quam statim erumpit ingens pulveris pyrii acervus !

Resp. 2. Ex variis opinionibus nulla est quæ ad verum magis accedere videatur , quam hypothesis D. Euler e regia Berolinensi Academia , cujus opinionem amplexus est , illustravitque D. Nollet. Juxta clarissimum hunc Philosophum , qualibet ignis particula spectari potest ut folliculus , qui vim habet sese quaquaverfum expandendi , statim atque desinit actio causæ comprimantis ; sic partes aeris circumquaque sese explicant , quando per causam comprimentem licet . Itaque si illi folliculi intra corporum meatus , ut ita dicam , incarcerationentur , manifestum est , prout facilius aut difficilius percurruntur hæc claustra , magis etiam aut minus celeriter , igneos folliculos esse distendendos , flammamque propagandam . Quamobrem si ignem ad pulveris pyrii granum admoveas , carcerem illico confringet , in quo detinetur ignis folliculus ; ille pariter vi subita sese explicans , & in grana sibi vicina irruens , claustra statim porrumpet ; in quibus latent ignea corpuscula ; ista vicissim in grana sibi contigua vim suam exerent , ignitasque particulas in iis inclusas suis e vinculis eximent , idque tam celeriter , ut subito incendatur ingens pulveris pyrii acervus . Rem illustrabit sequens comparatio : globulos vitreos concipiamus aere densato plenos , & qui sese contingant . Ex iis unus si comminatur , aer vi subita sese dilatans , & fragmentis vitreis armatus , in globulos vicinos irruet ; quibus similiter confractis , frangentur & alii contigui , sicque deinceps .

Si corporum poros pervadere difficile sit , aut  
si i.

si ignei folliculi partibus, ut ajunt, *heterogeneis*, quasi totidem impedimentis, obvolvantur, lentior erit ignis propagatio. Eam ob causam lignum non statim comburitur, sed gradatim tantum. Quo magis erit in *poros* irrumpendi difficultas vel quo pluribus extraneis partibus involventur ignei folliculi, eo lentius & ope-rosius corpus inflammabitur. Contra vero quo majori numero erunt *pori*, quo frequentiores erunt rimulae per quas ab uno ad alterum fiat transitus, quo uberiori copia igneae particulae intra corporum meatus delitescunt, eo facilior & promptior erit inflammatio. Pro hujusmodi circumstantiarum varietate diversi sunt gradus inflammationis.

Resp. 3. Ex affricu potissimum & percussione excitatur inflammatio. Hinc omnia corpora ex frictione calefiunt, nullumque est metallum, quod sub mallei ictibus calorem non concipiat. Affricu scilicet & percussione, ignei folliculi intra corporum meatus inclusi magis comprimuntur, vi ergo majori sese resistentes, suis e carceribus exsiliunt, quorum parietes ipso attritu partim scinduntur, vel etiam fraguntur, sicque ignis excitatur. Eandem ob causam ex manuum affricu, ex celeri membrorum agitatione, vel ambulatione velociori aut diuturniori calor nascitur: tunc enim in corporis partibus quidam fit attritus, quo suscitatur ignis actio.

Quaeres 3. cur funes ex quibus gravissima suspenduntur pondera, ita saepe incalescant, ut inflammantur.

Resp. Quando ingens pondus ex fune suspenditur, vis qua moles illa funis fibras distendit, aliquando tanta est, ut rumpantur; quibus disruptis, aperiuntur veluti carceres, in quibus ignis captivus retinebatur. Hoc effugium natus, qua data porta ruit, subitoque impetu vicina frangit claustra, e quibus aliae igni particulae pariter erumpunt. Sic propagatur ignis

gnis eruptio, qua funis inflammatur & confla-  
grat.

Quæres 4. cur ferræ, limæ, axes rotarum  
ita usu inardescant, ut ignem aliquando susci-  
tent.

Resp. Ferræ, limæ, axes rotarum vehemen-  
ti affricu atteruntur, quo paulatim franguntur  
capsule ignem continentes; ignis igitur suis a  
vinculis expeditus erumpit.

Quæres 5. cur corpora densiora magis incale-  
scant & urant potentius.

Resp. Id contingere, quia quo densiora sunt  
corpora, eo plures habent partes quibus com-  
municandus est calor & motus, ac fortius com-  
primuntur folliculi ignei in iis partibus inclusi,  
ideoque vehementius, utpote elastici, sese re-  
stituere nituntur. Hinc ferri candentis partes  
magis solidæ & confertæ, corporis nostri par-  
ticulas validius concutiunt, uruntque effica-  
cius, quam flamma ligni, palæ, stupæ ac-  
censæ. Pariter aurum calefactum organa no-  
stra vividius commovet, quam plumbum fu-  
sum.

Quæres 6. cur ferrum potius calefiat, quam  
lima qua corroditur.

Resp. Id ita fieri, quia una limæ pars, post-  
quam ferrum tetigit, aliquod in aere spatium  
describit, priusquam ferro iterum applicetur.  
Hinc motus in aliqua parte limæ excitatus fer-  
ri contactu, prius interit, quam ea ad ferrum  
redeat. Contra vero ferri partes a lima com-  
moveri non desinunt, donec abradantur. Cum  
vero partes illæ, utpote rigidæ & contumaces,  
per aliquod tempus a lima exagitantur, an-  
tequam a ceteris avulsæ sint, incalescunt. Eam-  
dem ob causam fervescit lignum quod a ferra  
scinditur, ubi durissimum est. Tunc enim e-  
jus partes non facile cedunt, ideoque prius-  
quam ab aliis divellantur, necesse est ut per ali-  
quod tempus a ferra agitentur cum igneis quas  
continent particulis. Si vero lignum sit mollius,  
non

non incallescit; quia partes illius non satis diu ferræ resistunt, sed levi attritu distrahuntur. Serra ipsa calorem non concipit; ubi tanta est illius longitudo, ut sensibile temporis spatium fluat, antequam eadem partes lignum rursus contingant. Si vero brevis sit, tunc calefit, quia eadem ejus partes a lateribus rimæ in quam inserta est, fere indefinenter affricantur.

Quæres 7. cur ubi tubus igni objicitur, liquor primo descendat, & deinde attollatur.

Resp. Ignis tubum sibi obvium prius dilatat, quam liquorem in eo contentum. Dilatari autem tubus non potest, quin augeatur ipsius capacitas; debet ergo liquor descendere; at vero cum liquor in tubo inclusus incalescit, tum rarefit, majus proinde spatium occupat, attollatur ergo necesse est.

Quæres 8. cur vas spissius & vacuum findatur, si igni vehementiori subito exponatur.

Resp. Superficies vasis exterior prius dilatur, quam interior; inæqualis autem partium rarefactio debet earum cohesionem & contiguitatem solvere. Id non evenit, quando ex tenui materia vas constat, quia ex illa tenuitate fit, ut ignis æqualiter agat in externam & internam simul vasis superficiem, & omnes illius partes eodem fere instanti dilatat. Scinditur etiam vel frangitur vas terreum aut vitreum spissius, cum in illud aqua ebulliens subito infunditur. Ignis enim fortius agit in superficiem cui applicatur, quam in oppositam; partes igitur non eundem inter se servant ordinem: quæ magis sunt rarefactæ, hinc; quæ vero minus rarefiunt, illinc trahuntur; scissuram ergo vas patietur. Ut autem vim aquæ ebullientis sustineat, prius calefaciendum est, quam in ipsum aqua fervida infundatur.

Quæres 9. utrum aer ad ignem excitandum quidquam conferat.

Resp. Aer ignem fovet, corroborat, ita ut, eo sublato, ignis extinguatur. Scilicet ignis, ut.

utpote vehementer agitatus, circumquaque sese diffundere nititur, brevi dissipandus, nisi a fluido quodam ambiente retineretur. Fluidum autem illud circumfusum est aer ipse, qui ab igne compressus, per suam vim elasticam brevi sese restituit, ignemque vicissim premens, eum in corpora inflammata repellit, ac proinde vim ipsius adauget.

Ex mutua illa ignis & aeris in se invicem actione nascitur in utroque fluido motus reciprocus, itus & reditus, qui in facis accensæ flamma facile animadvertitur; ignis ergo quaquaversum dilaberetur evanidus, nisi eum aer intra certum spatium coerceret. Quamobrem ut extinguantur, quæ caminis accidunt incendia, ipsi linteo madido clauduntur ad impediendam aeris circulationem. Inde fit ut aer in camin inclusus, & calore maxime rarefactus, jam ne queat ignem ut antea cohibere, qui idcirco brevi dissipatur; fuliginis accensæ partes proprium pondere, quia per aerem camini jam debiliorem sustineri non possunt.

Quæres 10. cur ignis vividior sit per hiemem quam per æstatem, sævientē gelu, quam cælimboso & pluvio.

Resp. Dum sævit hiems & frigus, aer magis condensatur, ideoque majori pollet vi elastica; fortius igitur ignem repellit in lignum, cujus partes vehementius concutiuntur, faciliusque dividuntur; vividior proinde ignis esse debet.

Quæres 11. cur aqua modica in ignem effusum excitet, extinguat verò si copiosius injea fuerit.

Resp. Cum parcius affunditur aqua, ipsæ partes non possunt omnes ignis particulas invadere, nec omnem ipsarum motum cohibere; quinimo ab igne in vapores resolvuntur, quibus armatus ignis fortius in objecta corpora impingit, ideoque majus incendium excitat. Præterea aquæ guttæ igneas particulas vers

ali

alimentum suum repellunt in eoque colligunt, & impediunt ne plurimæ dissipentur; unde fit ut ignis vehementius accendatur. Contra vero quando uberius affunditur aqua, ipsius partes ignea corpuscula omnino involvunt, eorumque motum in se recipiendo extinguunt. Præterea copiosior aqua, cum nequeat tota in vapores avolare, corporibus accensis adhæret, eorumque poros occludit, per quos novus ignis erumperet. Quæres 12. quam ob causam, ubi exploditur ferrea fistula (*un fusil*) intra caminum, extinguatur incendium.

Resp. Fistula ferrea, dum exploditur, magnam excitat in aere commotionem, qua vehementer succussus aer undique removetur; cum igneæ particule ab aere sustentari & comprimi desinant, quaquaversum dissipantur, & fuligo accensa huc illuc dispersa, in focum præceps decidit. Hinc explicari potest usus celeberrimæ machinæ, ad incendium subito extinguendum in Germania excogitata. Scilicet in locum ubi sævit ignis infertur dolium aqua plenum, cujus in centro est capsula pulvere pyrio foeta. Deinde ope funis incendiarii (*meche*) ad capsulam usque continuati immittitur ignis in pulverem pyrium, qui magno impetu exardescens, & capsulam & dolium diffringit, aquam huc illuc dispergit, sicque incendium subito extinguit. Ex dictis facile est illius machinæ vim intelligere. Quando scilicet violenta pulveris pyrii eruptione dolium effringitur, vehemens in aere excitatur concussio, quæ ignem ab alieno suo dispellit. Deinde aqua huc & illuc instar pluvie dissipata, partes igneas a pabulo suo junctas involvit & absorbet, corporumque neatus occludit.

Quæres 13. cur lignum quod aquis fuit immersum, gallice, *le bois flotté*, facilius inflammetur.

Resp. Ignis & flamma difficilius in corpora solida vim suam exerunt; eorum quippe partes,

tes, utpote magis densæ, operosius dividuntur & agitantur. Porro ligni aquis immerfi plurimum imminuta fuit soliditas. Crassiores enim ejus partes aquis solutæ fuerunt, meatus latiores facti, & particule ligneæ minus inter se coherentes. Præterea, cum aeri libero expositum fuerit ut siccaretur, aquæ partes quæ illius poros subierant, avolarunt, earumque loco succedit aer. Hujusmodi ergo lignum non parum soliditatis amisit; facilius igitur inflammari debet, quam lignum quod in aquis non fluctuavit.

Quæres 14. cur ferrum candens, in aqua immersum brevi frigescat.

Resp. Aquæ partes, cum nullam aut fere nullam inter se cohesionem habeant, motum facilius accipiunt, quam corpus solidum. Eam ob causam ferrum candens in aqua, etiam tepida, motum suum, & proinde calorem, debet citius amittere, quam si duro cuilibet corpori applicaretur.

Quæres 15. cur candela accensa in medio excavetur.

Resp. In centro vehementior est calor, quam prope circumferentiam candelæ, in centro igitur versus ellychnium sebum vel cera prius & majori copia liquefieri debet. Hinc excavatur in hac parte candela.

Quæres 16. quid sebum liquefactum cogat in flammam ascendere.

Resp. Diversis sebi liquidi partibus variæ respondent aeris columnæ, eo magis sebum comprimentes, quò sunt ab ellychnio remotiores, utpote minus rarefactæ. Sebum ergo liquefactum magis premitur prope circumferentiam candelæ, quam versus centrum, sive ellychnium. Ea est autem fluidorum natura, ut eo tendant, ubi minor est pressio; debet igitur sebum liquefactum ad ellychnii flammam assurgere.

Quæres 17. cur candela inversa extinguatur.

Resp. Extinguitur, quia nimia sebi liquefacti

Si copia ad ellychnium affluit, quam ut possit ab eo calefieri, quantum opus est ad inflammationem.

Quæres 18. quam ob causam ellychnium procreet fumum, quando longius est aut brevius.

Resp. Ubi longius est ellychnium, majorem suppeditat materiæ copiam, quam possit ignis consumere. Pars superflua non accenditur, sed nigrum in fumum convertitur. Quando brevius est ellychnium, tunc sebum ad flammam usque evehitur, priusquam eum affecutum fuerit caloris gradum, qui ad inflammationem requiritur, ideoque in fumum abit.

Quæres 19. cur flamma desinat in apicem.

Resp. Ascendit flamma intra aerem ambientem, qui eo minus est calidus, ac proinde minus rarefactus, quo remotior est ab ellychnio. Vehementius igitur summam flammam comprimit & coercet, quæ ideo in apicem decrescit.

Quæres 20. cur candela recens extincta iterum accendatur, ubi fomis ex ea erumpentibus admovetur flamma.

Resp. Id contingit, tum quia fumus plurimas partes continet ad inflammationem expeditas, modo vel minimum caloris incrementum iis accedat; novum autem caloris gradum ex admotâ flamma recipiunt; tum quia partes quedam flammæ incurrunt in particulas igneas a candela recens extincta erumpentes, easque versus ellychnium repellunt, & cum iis conjungunt, ignem iterum excitant.

Quæres 21. quid sit lacryma Batavica, & quæ illius phænomena.

Resp. Lacryma Batavica nihil aliud est, quam paululum vitri liquefacti, quod adhuc liquidum vitrarii in aquam frigidam demittunt, ut ita lacrymæ formam guttatim decidendo induat. (fig. 77.) Batavica dicitur a loco ubi primum ortum habuit. Lacryma sic confecta suas habet partes versus cuspidem uniformes, quia cuspis, utpote tenuissima, eodem tempore densatur.



satur intra & extra: sed versus basim ipsius partes textura a se invicem maxime discrepant. Alia sunt enim aliis densiores, & male coherentes, quia particulae exteriores citius & firmitus in aqua frigida concresecunt, quam interiores. Si lacrymam hanc repetitis mallei ictibus percutias, non confringetur; si vero ipsius cuspidem ruperis, statim cum strepitu in pulverem tenuissimum tota comminuetur.

Existimant quidem Physici ideo, resecta cuspidem, statim dissilire lacrymam Batavicam, quia tunc aer exterior vi sobita in interiores lacrymae partes irrumpit, easque, utpote male coherentes, hinc & inde disjicit. Cum enim aer interior ferventi calore expulsus fuerit, aer externus liberum intra lacrymam aditum reperit.

Sed opinionem hanc improbat D. Nollet. Ad illud phaenomenon, inquit, nihil confert aer externus; siquidem lacryma vitrea sub vacuo machinae pneumaticae excipulo non minus confringitur, quam in aere libero; neque ad effectum de quo agitur necesse est, utrum lacryma formam habeat. Aliquid enim simile contingit in phialis vitreis, quae pirum cavum referunt, & quarum fundus reliquo corpore densior est. Vocari solent *bouteilles de Boulogne*, (fig. 78.) Hae vascula non semel sponte sua franguntur, antequam penitus refrigescant. Cum vero integra remanent, non sine strepitu dissiliunt, si in eorum capacitatem demiseris fragmentum silicis exiguum; quod tamen non efficiet glans plumbea, licet gravior.

Maxime probabile est vitrum non ita disrumpi, nisi quia variae superficies ex quibus constat, diversis temporibus densatae fuerunt. Cum enim externae prius indurescant quam internae, illae posteriores, dum refrigescendo densantur, alias instar arcuum inflectunt, & versus seipsas incurvant. Ubi vero vel corporis acuti & angulosi percussio, vel abruptio quaedam la-

mellas interiores a se invicem disjungit, tunc exteriores quas inflexas & incurvatas retinebant, subito impetu sese restitunt, utpote elastice, resiliendo sese collidunt, ex mutuo illo collisu fit, ut minuta in fragmenta diffiliant.

Confirmatur hæc explicatio ex eo quod lacryma vitrea, etiam resecta ipsius cuspidē, non confringatur, quando in aere, non vero in aquis confecta fuit. Ubi enim medio in aere concrefcit, partes ipsius frigore minus subito corripuntur, ideoque lacryma textura magis est aquabilis, majorque partium cohesio. Lacryma pars crassior mallei ictibus ideo resistit, quod durissima sit, & partes illius exteriores in modum fornacis, dispositæ, sese mutuo sustineant.

## SECTIO SECUNDA.

### De Calore.

**C**ALORIS nomine hic intelligitur ea commulcorum corporum proprietas, quia tactus organum ita commovet, ut inde, tanquam occasione, nascatur in anima sensus ille qui calor dici solet.

Sectionem istam tres in Articulos dividimus.

In primo causam caloris exponemus, & varias quæstiones solvemus ad calorem spectantes; in secundo agemus de fermentatione, quæ certam habet cum calore cognationem; in tertio, de calore subterraneo & centrali disputabitur.

## ARTICULUS PRIMUS.

In quo caloris causa exponitur, & varie solvuntur quæstiones ad calorem pertinentes.

**D**E caloris causa duæ sunt opiniones præcipuæ. Prima est Cartesiorum, qui caloris causam sitam esse putant in motu partium corporis vehementi & perturbato. Quo nomine

postremo eum intelligunt, quo partes corporis quaquaversus agitantur. Secunda opinio, quam defendunt plerique Physici recentiores, calorem oriri docet ex partibus igneis e calore calido erumpentibus.

## PROPOSITIO.

*Calor oritur ex particulis igneis e corpore calido erumpentibus.*

Prob. **V**el calor oritur ex particulis igneis e corpore calido exeuntibus, vel ex motu vehementi & perturbato, quo partes corporis calidi exagitantur: atqui id posterius dici non potest. Si enim calor ex praefato motu esset repetendus, quo iste vehementior esset, eo vividior foret calor: atqui tamen contrarium testatur experientia; sint quippe duo vasa quae aquam contineant aequae calidam, unum collocetur sub machinae pneumaticae excipulo; & aer exhauriatur; alterum autem in aere libero remaneat: porro aqua vasis sub machinae pneumaticae excipulo positi motu vehementi agitur, & tamen non magis calida percipitur, quam alterius vasis aqua.

Praeterea quaedam metalla repetitis mallei ictibus percussa, plurimum incalescunt: atqui tamen illorum partes ea percussione magis ac magis condensantur, nedum concipiant motum; ut ajunt, *perturbatam*. Denique calor corporis in aliud sic aequaliter distribuitur, ut in utroque par sit caloris gradus; quod intelligere facile est, si caloris causam constituas in particulis igneis e corpore calido manantibus. Ignis enim, utpote fluidus, liquidorum more agit, quae sese diffundere non desinunt, donec adsit aequilibrium. Rem veto quis concipiat, si calorem nasci putes ex motu *perturbato* partium corporis calidi? tunc enim motum suum communicare non poterit, nisi ex ea parte qua corpus calefa-

lesaciendum contingit; ergo caloris causa non sita est in motu partium corporis calidi *perturbato*, sed in particulis igneis e corpore calido erumpentibus.

Quæres 1. cur aliquando extinguatur carbo accensus, cum radiis solaribus objicitur.

Resp. Id oritur ex eo quod radii solares aerem circumstantem ita rarefaciant, ut vim non habeant ignem carboni eo modo applicandi, qui sufficiat ad eum comburendum.

Quæres 2. cur aqua promptius calefiat in vase clauso, quam in aperto.

Resp. rem ita contingere, quia partes igneæ per fundum irruentes, magis in vase clauso retinentur & colliguntur; plurimæ vero dissipantur & avolant, ubi vas apertum est.

Quæres 3. undenam oriatur liquorum ebullitio.

Respond. Oritur partim quidem ab aeris rarefactione, sed multo magis ex vaporibus in quos liquor resolvitur. 1. Enim liquor, aqua, v. g. aerem continet qui calefieri non potest quin rarefiat: partes autem aeris dilatari nequeunt, quin fiant aqua leviores, ac proinde nitantur ad superficiem aquæ assurgere; non possunt autem ad summas aquas sese efferre, quin sursum aquæ particulas attollant; ergo liquorum ebullitio partim oritur ab aeris rarefactione.

Maxima etiam ex parte tribuenda est vaporibus in quos convertitur liquor: fluida enim non admittunt nisi certum caloris gradum, qui si augeatur, abeunt in vapores: jam vero ubi infima liquoris lamella in vaporem resolvitur, debet, utpote aequali volumine fluidi levior, sursum ascendere, & aquæ particulas secum evehere. Illæ igitur bullæ quæ a fundo vasis in aquæ superficiem prosiliunt, partim quidem oriuntur ab aere dilatato, sed potissimum ex vaporibus in quos fluidum vertitur: aqua enim ebullire pergit, donec tota in vapores abierit, & in ea per totum illud tempus observantur ejusmodi bullæ: numquid autem verisimile est

in aqua eam contineri aeris copiam, quæ tan-  
 diu totque bullas sufficiat? Quæ de re sic habet  
 D. Nollot: *En vain diroit-on qu'une très-petite*  
*quantité d'air extrêmement dilaté peut suffire à*  
*cet effet? l'expérience nous apprend que ce fluide,*  
*sous le poids de l'atmosphère, ne se dilate*  
*qu'un tiers de son volume par la chaleur de l'*  
*eau bouillante. S'il étoit possible de mesurer toutes*  
*les bulles qui viennent se dissiper à la superficie*  
*d'une pinte d'eau que l'on fait bouillir*  
*jusqu'à siccité, & qu'on les additionnât pour en*  
*avoir le volume total, quand bien même on rab-*  
*battrait un tiers de la somme, on se persuadera*  
*sans peine que le reste représenteroit encore une*  
*quantité beaucoup au dessus de celle de l'air,*  
*qu'on peut raisonnablement attribuer à l'eau.*  
 (Tom. 4. pag. 440.)

Quæres 4. quas ob causas per æstatem major  
 sit calor, quam per hiemem.

Resp. duplicem ob causam id contingere. 1.  
 cum sol æstate vertici nostro magis imminet,  
 quam hieme, ipsius radii sunt minus obliqui,  
 ac proinde magis calefaciunt; tum quia minus  
 aeris spatium traiciunt, ideoque minus de suo  
 motu amittunt; tum quia vim majorem exe-  
 runt; eo quippe efficacior est cujuslibet corpo-  
 ris actio, quo magis ad lineam perpendicularem  
 accedit.

2. Quia radii solares diutius, & proinde ma-  
 jori numero in horizontem nostrum incidunt;  
 pars igitur terræ quam incolimus magis dilata-  
 tur; cum autem multa contineat corpora ad in-  
 flammationem proclivia, & quæ valde calefiunt,  
 idcirco e terræ sinu plures erumpunt particule  
 ignitæ, quæ ad calorem aeris magis conser-  
 runt, quam ipsi radii solares, juxta D. de  
 Mairan.

Quæres 5. cur in vallibus major sentiatur ca-  
 lor, quam in montium vertice.

Resp. id fieri 1. quia in montibus paucio-  
 res & minus calefactæ ignis particule e ter-

1. in sinu profiliunt, quam in vallibus; 2. quia in montibus nihil est quod ventorum vim cohibeat; aer igitur corpori nostrae circumfluus frequentius mutatur; majorem proinde sui caloris partem corpus nostrum aeri ambientis communit & amittit; 3. quia montium cacumina non excipiunt nisi radios solis directos, sive qui in ea immediate incidunt; in valle autem radiis solaribus directis accedunt innumerabiles alii, qui e montium proclivitate repelluntur versus loca depressiora; hinc spectari potest vallis tanquam focus, in quo radii tum directi, tum reflexi colliguntur; & simul permiscentur, ideoque calor in ea viget maximus.

Quæres 6. cur fundus lebetis calidior sit ante & post aquæ ebullitionem, quam ea durante.

Resp. 1. Paulo ante aquæ ebullitionem plures ignis particule in lebetis fundo retinentur, quia ejus meatus minus aperti sunt, quam ubi aqua ebullit.

2. Post ebullitionem partes aquæ propter caloris imminutionem magis densatæ, ad sese propius accedunt; pori arctiores facti; particulis ignitis exitum prohibent, quæ idcirco versus fundum reflectuntur, ubi collectæ majorem præcreant calorem.

Quæres 7. cur aer e pulmonibus ore patulo in manuum emissus sentiatur calidus, frigidus vero, cum pressis labris ejicitur.

Resp. Ubi aerem ore patulo expiramus, lentior est, quam ut possit aeris manum ambientis, ab eaque jam calefacti atmosphæram expellere; imo, cum e pulmonibus, in quibus major est calor, exeat, non mediocrem ignis copiam secum advehit, qua manus calor augetur: contra vero ubi aer pressis labris vibratur, multo celerius prorumpit, & aerem manus nostras involventem dissipat. Quo expulsa, alius frigidior succedit, cui manus proprium calorem communicant; frigidus ergo videatur necesse est.

Quæres 8. cur loca subterranea per æstatem fri-

frigida sentiantur, calida vero per hiemem.

Resp. Observatum quidem fuit in locis subterraneis calorem paulo majorem esse æstate, quam hieme: sed tantulum est illud discrimen, ut non sufficiat ad eam quam experimur mutationem in nobis procurandam; ex corporis igitur nostri statu repetenda est; scilicet per æstatem partes corporis nostri externæ longe calidiores sunt aere subterraneo, cui proinde magnam sui caloris partem communicant, ideoque amittunt: jam vero ex subita caloris nostri diminutione nascitur sensus frigoris. Contra per hiemem aer cavernosus multo calidior est aere externo, quo corpus nostrum obvolvitur; dum ergo in loca subterranea nos recipimus, aer in iis inclusus debet calidus percipi. Calor autem iis in locis parum augetur, quia radii solares in ea non incidunt.

Quæres 9. utrum calor corporibus contiguus pro ratione molium communicetur.

Resp. Quæstionem hanc ita solvit D. Nollet: (tom. 4. pag. 510.) On peut dire en general, que la chaleur se communique en raison des masses; c'est-à-dire, qu'un ponce cube de fer, par exemple, appliqué sur un morceau de bois qui auroit les mêmes dimensions avec moins de chaleur, se refroidirait moins par cet attouchement, que ne feroit le cube de bois, si, plus chaud que le fer, il s'appliquoit à lui pour l'échauffer. Aussi ressent-on plus de froid aux mains, quand on a touché du marbre ou du métal pendant l'hiver, que quand on a touché du bois ou des étoffes, quoique la température de sous ces corps soit véritablement la même: car le refroidissement de la main n'est autre chose que la perte qu'elle a faite d'une partie de sa chaleur, id est la communication; & cette communication est proportionnelle à la densité du corps touché.

## ARTICULUS II.

## De Fermentatione.

**F**ERMENTATIO intestinus est partium corporis motus, quo vel novam acquirunt texturam, vel alia ab aliis sejunguntur. Corpus quodlibet ad fermentationem non est comparatum, sed quædam requiritur proportio inter corpora quæ simul permixta fermentescunt. Ita sine disposita necesse est, ut alia intra aliorum meatus, sive poros, non sine aliqua tamen difficultate, sese insinuent. Duplicis generis corpora distinguuntur a Chymicis, alia nempe *acida*, & alia *alkalica*. *Acida* sunt ea quæ particulis constant acutis, rigidis ac penetrantibus, quæ aliorum corporum meatos subeunt, eorum partes exagitant & disjiciunt, sique in his fermentationem excitant. *Alkalica* dicuntur corpora quorum partes sunt texturæ rarioris, & plurimis intercipiuntur *poris*. Inde fit ut acidorum particula, gladiolis consimiles, in alkaliorum meatus sese intrudent, eorumque partes concutiant, disrumpant, diffocient. In illa acidorum & alkaliorum simul permixtorum veluti pugna sita est fermentatio. His præmissis exponenda sunt insigniora quædam experimenta, quæ ad fermentationem pertinent.

**EXPERIMENTUM I.** In uno scypho, cupri, in altero ferri frustula ponantur; in utroque aquam fortem infundas; paulo post excitatur ebullitio; in priori vase aqua fortis incatescit, suscitatur fumus, metallum agitur; ejus volumen minuitur, & penitus evanescit. In alio vase eadem sese produnt phænomena, cum eo tamen discrimine, quod ferrum vi majore & citius dissolvatur. Si in secundo vase includeretur ferri limatura, tunc fermentatio multo vehementior, fumus abundantior, limaturæ dissolutio promptior foret.

Ex



*Explicatur experimentum.* Aqua fortis est liquor acidus, cujus partes sunt tenuissimæ, valde penetrantes, & cuspidibus similes. Cum igitur hæc aqua supra cuprum aut ferrum affunditur, ejus partes intra cupri & ferri particulas sese insinuant, eas concutiunt & dividunt. Hæc autem divisio fieri non potest, quin commoveantur metallorum frustula: hinc agitatio, quæ in cupro & ferroprehenditur. Præterea dum aquæ fortis aculei particulas metallicas succutiunt & dissolvunt, rumpuntur veluti cellulae in quibus retinebantur corpuscula ignea, quæ a suis carceribus expedita, vim suam exerunt; inde calor in liquore excitatus. Aliunde aer intra metallorum meatus veluti captivus & compressus, fit liberior; ergo sese restituit & explicat, favente præsertim calore, acquirit igitur volumen specificè levius; debet proinde supra liquorem assurgere, ab eoque exilire; sed prorumpendo liquoris particulas secum asportat, quarum aliae sunt sensibiles & graviores, quæ ideo re-cidunt; aliae vero insensibiles, quas secum attollit; inde ebullitio & fumi qui sursum evahuntur.

Denique ferrum citius cupro, & limatura ferri promptius quam ejusdem massa dissolvitur. Eo quippe vehementior celeriorque esse debet dissolutio, quo plures in partes eodem tempore agunt acida, eoque plures in partes simul vim suam exerunt, quo major est in corpore pororum numerus, majoresque superficies; atqui ferrum pluribus patet meatibus quam cuprum, cum eo sit specificè levius. Limatura autem ferri majorem habet superficiem, quam ejusdem frustula; siquidem eo major est corporis superficies, quo plures in partes dividitur; ergo ferrum citius cupro, & limatura ferri promptius quam ejusdem frustula dissolvi debent.

*EXP. II.* Si in aurum aqua regali dissolutum affuderis oleum tartari, quod extrahitur a fece vini, quæ doliorum parietibus adhæret,

post ebullitionem aurum præcipitatur: si deinde liquorem qui pulveri aureo supernatat, eduxeris, & pulvis ille repetitis vicibus aqua tepida fuerit ablutus, & postea igne levissimo exsiccatus, tunc dicitur *aurum fulminans*. Ubi paululum hujus pulveris in cochleari (*cuiller*) positum, igni subjicitur, aurum vi subita detonat, cochlear perfoditur, & materia, haud fulmine lentius, hinc & inde dijjicitur.

*Explicatur experimentum.* 1. Ubi in aurum dissolutum infunditur oleum tartari, aurum in fundum vasis præceptis abit, quia acida aquæ regalis in poros olei tartari sibi magis affines & cognatos irruunt, & particulas aureas deferunt. 2. Partes ignitæ quæ pulverem aureum penetrant, aer ipse interior cujus partes omnes eodem tempore sese dilatant, solidas tum salis, tum auri particulas circumquaque disjiciunt. Illæ autem tanto impetu ejaculatæ aerem concutiunt & agitant, ipsique motum tremulum & reciprocum imprimunt, in quo sonus consistit, ut postea exposituri sumus; hinc subitus ille qui auditur fragor. Præterea cum materia sese vehementer expandenti resistat aer superior, nefatis velociter cedat, totus rarefactionis nisus deorsum repellitur, ideoque perfoditur cochlear.

**EXPERIMENT. III.** In scypho vitreo permisceantur quatuor uncias spiritus & terebinthina recens educti cum sex uncis aquæ fortis. Deinde scyphum operias, eumque identidem succute. si paulo post tollatur operculum, tunc ebullit liquor, densi erumpunt fumi, & micat flammæ circa scyphi parietes erratica.

*Explicatur experimentum.* Aquæ fortis acidum poros spiritus terebinthina penetrant, & aerem internum comprimunt; sed quia ab aere externo non adjuvantur, debent remissius agere. Ubi vero tollitur operculum, tunc acida viribus aucta, & aeris externi accessione excitata aerem internum fortius premunt. Cum a

tem aer ille compressus renitatur, acida repellit. Inde nascuntur itus & reditus, quorum occasione partes igneae majorem accipiunt motum, liquor magis incalescit, aer sese dilatat, sursum profilit, & secum rapit partes liquoris subtiliores. Hinc fumi. Cum spiritus terebinthinae partibus ignitis abundet, illae agitari non possunt, quin prodeat flammula.

*EXP. IV.* Ubi semiuncia aquae fortis, cum eadem quantitate olei e gayaco extracti commiscetur, vehemens exoritur fermentatio, densus exhalatur fumus, micat flamma, & peracta fermentatione, e scypho sese attollit corpus spongiosum, ad unius fere semipedis altitudinem.

*Explicatur experimentum.* Aquae fortis partes acuminatae poros olei subeant, & aerem interiore compressum, qui renitens ea repellit. Hinc excitatur motus reciprocus, qui partes igneas suscitatur, ac proinde calorem & flammam: dum autem liquor fervescit & inflammatur, aer interior rarefactus, sese evolvit; & quia in partibus olei ramosis implicatur, eas disjungere ab illisque sese expedire nititur; idcirco liquorem tumescit, unde nascitur corpus spongiosum.

*EXP. V.* ubi in oleum vitrioli affunditur semiuncia salis ammoniaci in pulverem redacti, vehemens excitatur fermentatio, densi avolant fumi. Si thermometrum in liquorem fermentescente immergas, spiritus vini descendit, dum sese attollit in altero thermometro, quod vaporibus sursum sublati obijcitur.

*Explicatur experimentum.* Olei vitrioli acida intra partes salis ammoniaci alkalicas sese influunt & impediunt, siquidem dum liquor fermentescit multae sunt coagulationes. Illae autem fieri nequeunt, quin partes ad se invicem magis accedant, ac proinde quin particulae igneae in iis inclusae erumpere cogantur; idcirco debent liquorem deserere; non possunt autem ab eo exire, quin frigeat; quamobrem descendit

spiritus vini in thermometro quod fuit in liquore immersum. Aliunde ignita corpuscula a liquore sese expedire nequeunt, & simul cum vaporibus avolare, quin illi calidiores fiant; ergo in thermometro quod illis vaporibus obicitur vini debet ascendere.

Quæres quænam sit genuina fermentationis causa, quæ scilicet corporis dissolventis particulas intra corporis dissolubilis meatus impellat & intrudat.

Resp. Causam hanc nondum bene exploratam habent Physici, ut sic fatetur qui inter Physicos nobiliores merito numeratur D. Nollet: Tous les Physiciens conviennent, que de deux matieres qui ferment ensemble, l'une pénétre l'autre, & que le mélange s'échauffe, parce que les parties s'entrechoquent, & se frottent en se pénétrant: mais ils ne s'accordent pas de même sur la cause de cette pénétration. Il faut cependant qu'il y en ait une. Car quand on se représenteroit les parties pointues du dissolvant en présence & directement vis-à-vis des petites massés poreuses de la matiere dissoluble, comme des chevilles au bord de leurs trous, encore faut-il une puissance qui les y chasse, & qui anime leur effort.

Ceux qui regoivent & défendent l'attraction comme une cause physique, expliquent tout à leur aise ces mouvemens incessans des matieres qui fermentent. Il y a, disent-ils, une attraction réciproque entre le corps dissolvant & celui qui est dissoluble, entre l'acide & l'alkali; dès que l'un & l'autre sont à portée de se joindre, cette vertu qui réside en eux, tend à les unir de la manière la plus complète, par le contact immédiat de leurs moindres parties, ce qui ne peut se faire que par la division des molécules.

Il faut avouer que cela ne va pas mal au premier coup d'œil, & que la plupart des difficultés qui se présentent après, tombent également sur les autres, mais quand cela irait encore mieux,

mieux, l'esprit n'est point satisfait de cette explication, lorsqu'il vient à sentir qu'elle est fondée sur un principe que bien des gens supposent par goût ou autrement, mais dont personne n'a jamais donné de preuves, qu'on ne puisse légitimement contester.

Un homme littéralement attaché à la doctrine de Descartes, vous dira que le monde est rempli d'une matière subtile, qui se meut en toutes sortes de sens, & qui pénètre ainsi les corps les plus compacts; que dans le cas de la fermentation, ce sont les impulsions redoublées de ce fluide par excellence, qui font entrer les pointes des acides dans les pores des alkalis.

Cette explication au moins nous offre un mécanisme intelligible. Elle n'exige pas que l'esprit se prête gratuitement à des notions nouvelles, auxquelles il n'est conduit par aucun exemple... mais elle suppose des faits qui, selon moi, ne sont pas assez prouvés: car comment au milieu de tant d'impulsions de cette matière, qui se feroient souvent en sens contraires, les pointes des acides frappées en même temps par les deux bouts, seront-elles chassées dans les pores de l'alkali? car un clou n'avance ni ne recule entre deux coups de marteau d'égale force. Avouons de bonne foi notre ignorance, en attendant les lumières qui nous manquent. (Tom. 4. pag. 256. & suiv.)

## ARTICULUS III.

## De Calore subterraneo &amp; centrali.

DE calore centrali nostris temporibus gravis est controversia. Utrique dimicant nobis les athletæ. Contendunt alii in intimis terræ visceribus ignem & calorem delitescere; alii vero eam opinionem, tanquam imaginationis plus aquo incalescentis figmentum rejiciunt. Præcipua quæ utrinque afferuntur argumenta, breviter exponemus.

AR-

*ARGUMENTA Physicorum qui globo terrestri  
centralem vindicant calorem.*

1. Inquiunt, terram altius effodere minime necesse est, ut intra ipsam detegatur calor constans & æquabilis, quæcumque sit aeris supra terræ superficiem temperies. Liquor enim thermometri per totum annum ad eandem altitudinem pensilis manet in cellis *Observatorii Parisiensis*, quarum tamen profunditas non est nisi 84. pedum, sive 14. Sexpedarum. Idem fere remanet hic calor, a 14. sexpedis ad 100. usque, ut patet ex fodinis. Si ultra progrediaris, augetur calor, & tantus aliquando fit, ut eum sustinere non possent qui fodinis operam dant, nisi arte aliqua & industria temperaretur.

D. de Genfanne *Accademix Scientiarum Parisiensis*, ut ajunt, *correspondens*, expertus est in fodinis quibusdam (*de Giromaghy, à trois lieues de Belfort*) liquorem thermometri, qui extra fodinam ad duos supra congelationem gradus erat suspensus, ad 10. pervenisse, quando thermometram intra 30. sexpedarum profunditatem delatum fuit, ubi perventum est ad 100. sexpedas, liquorem thermometri 10. gradus cum  $\frac{2}{3}$ ; ad 158. sexpedas, 15. gradus cum  $\frac{1}{3}$ ; ad 222. sexpedas, 18. gradus cum  $\frac{1}{6}$  attigisse. (*Dissertation sur la glace par M. de Mairan, page 66. & suiv. edit. de Paris in 12. de l'année 1749.*)

Quo profundius in terræ viscera descenditur, inquit D. de Genfanne, eo major percipitur calor; ita ut ad 1800. pedum altitudinem infra solum Rheni, prope Huningam in Alsacia (*Huningue en Alsace*) eum deprehenderim calorem, qui vaporationem aquæ suscitaret. (*Histoire naturelle de Languedoc, tom. 1. pag. 24.*)

2. Probare facile est, inquit D. de Buffon, aquarum marinarum liquiditatem generatim radiis

diis solaribus non esse tribuendam; eorum quippe calorem aquas ultra 150. pedes non permeare, testatur experientia; aquæ igitur infra hanc altitudinem subjectæ, gelu adstringerentur, nisi eas a coagelatione defenderet calor centralis. Experientia non minus certum est, pergit auctor clarissimus, radioꝝ solarium calorem intra terram non propagari ad 15. usque aut 20. pedes; siquidem in ea profunditate servatur glacies per æstatem vel calidissimam; apertum est igitur, infra maris alveum perpetuam esse caloris centralis manationem, quæ aquarum liquiditati consulat, & terræ temperiem procreet. (*Supplément de l'histoire naturelle, contenant les époques de la Nature, tom. IX. pag. 14. & 15.*)

3. Neminem fugit, tempore pruinoso (dant le temps des frimats) nivem in omnibus his locis liquefcere, in quibus vapores e terræ sinu prodeuntes, liberum habent exitum, ex. g. supra puteos & aquæductus contextos, supra fornices & cisternas; dum ceteris in locis, ubi terra gelu adstricta illos vapores intercipit, nix permanet & congelatur, nedum liquefiat. Quo facto liquet hujusmodi exhalationes e terræ penetralibus avolantes, vero calore esse præditas (*Ibid.*)

4. Aliud argumentum adhibet D. Bailly in opere cui titulus: *Lettres sur l'origine des Sciences, à Paris, in 8. an. 1777., pag. 299.,* ubi sic habet: *Sans cette chaleur intérieure comment dans les climats les plus froids, la terre ne seroit-elle pas getée au-delà de 5. à 6. pieds; (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1749. pag. 14.) Par-tout où l'eau pénètre, elle devoit se convertir en glace par la rencontre des molécules terreuses, qui n'ont jamais vu le soleil. D'où viennent donc les sources de cette fontaine, que les Académiciens François trouverent à Pello dans la Laponie; fontaine dont les eaux n'étoient jamais glacées? (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1737., pag.*

pag. 401.) D' où viennent ces eaux chaudes qui coulent dans le Spitzberg à 80. degrés de latitude de l' (Hist. génér. des Voyages, tom. 15. in 4. pag. 141.) La fermentation ne peut expliquer ces phénomènes, puisqu'il n'y point de fermentation, où il n'y a pas de chaleur.

Quem globo terrestri inesse calorem centralem docent DD. de Buffon & Bailly, eundem volunt esse saltem quinquies & vices illo majorem, quem generant radii solares.

### ARGUMENTA Physicorum qui calorem centralem rejiciunt.

1. Ad quacumque altitudinem effodiatur terra, quovis anni tempore, & quavis in regione, ubique eadem occurrit temperies; ubique liquor thermometri ad 10. gradus manet pensilis, nisi obstitit specialis quædam circumstantia. In plurimis probant experimentis, quæ tentarunt viri in rebus physicis versatissimi. Sic, teste D. Guettard, ad 250. sexpedas in fodinis salis (de Wieliczka in Polonia,) mercurius in thermometro D. de Réaumur, ad 10. gradus constanter stetit suspensus; sic etiam, asserit D. Monnet idem contigisse pari thermometro, quod delatum fuerat ad 180. sexpedas in fodinis (de Jaachimthal in Bohemia.) Ad majorem altitudinem nullibi huc usque pervenerunt fossorës. (Journal de Physique de Mr. l'Abbé Rozier, mois de Sept. 1777. pag. 234.) Atqui si in terra sine existeret calor quinquies & vices illo vegetior, quem procreant solis radii per æstatem calidissimi, numquid inter prædictas fodinas mercurius thermometri in decimo gradu supra congelationis punctum ita contumaciter hæreret? Nonne semper eo major foret ipsius altitudo, quo profundius in interiora terræ penetralia descenderetur?

Frustra, inquit, nobis objiceretur quod a D. de Gensanne observatum fuit in fodinis de



*Giromagny*; factum enim illud, etiam si verum sit, nihil probat: cum aliis quippe experimentis pugnat, quæ in ceteris fodinis, etiam profundioribus, tentata sunt.

2. Si in ipsis terræ visceribus ignis resideret, cujus calor e centro in alias globi terrestres partes diffunderetur, tunc versus lacuum & maris fundum, n̄pote foco propiorem, plus caloris deprehenderetur, quam in superficie: atque contrarium, sive per æstatem, sive per hiemem declarat experientia. D. enim de Saussure die 13. mensis Augusti an. 1767. thermometrum D. de Reaumur in fundum lacus Genevensis, ad 82. pedum & 6. pollicum altitudinem demisit: quo post 5. horas extracto, liquor ad 10. gradus &  $\frac{1}{2}$  erat suspensus; alterius vero & similis thermometri infra superficiem uno tantum pede immersi liquor, post idem tempus 20. gradus &  $\frac{1}{2}$  attigerat. Narrat idem Physicus DD. Mallet & Pictet, die 6. mensis Augusti an. 1774. in lacum Genevensem demersisse ad 312. pedum altitudinem thermometrum D. de Reaumur, in tubo vitreo hermetice inclusum. Postquam ex aqua eductum fuit, mercurium viderunt ad 8. gradus &  $\frac{1}{2}$  supra zero pensilem, quamvis superficiæ temperies esset 15. graduum. Vide eximium opus D. de Saussure, cui titulus, *Voyage dans les Alpes*.

Variis etiam constat experimentis in maris inferioribus aquis longe minus inesse caloris, quam in superioribus. Qua de re consule opus inscriptum, *Voyage du Capitaine Phipps au pôle boreal*, pag. 25.

3. Comprobat experientia vulgaris, glacies in ima tellure per hiemem depositas, per æstatem servari, nec liquecere, quantumvis profunda sit sedes in qua reconditæ fuerunt: atque in opinione quæ calorem centralem admittit, & qui-

& quidem quinquies & vices illo intensiorem quem gignunt radii solares æstivi, nonne brevius resolveretur & liquefieret glacies ista subterranea.

4. Ea est, inquit, ignis natura, ut diu subsistere nequeat sine aeris liberi & elastici auxilio, qui perpetuo renovetur; sine alimentis quod semper consumat: atqui nihil horum reperias in fabulosis illis cavernis, in quibus reconditus fingitur ignis centralis. Et vero vel ignis ille aliam quam cum aere externo communicationem habet, vel nullam. Si prius, brevi extinguitur necesse est; si posterius, cur suis e carceribus horribili cum fragore non erumpit, ut contingit ignibus vulcaniis, (*feux des volucans*) qui statim atque in aerem externum viam sibi moliti sunt, subito impetu suis ex antris prosiliunt & obvia quæque subruunt?

5. Denique argumenta quæ in ignis centralis gratiam afferuntur sic diluunt, imo suos in adversarios retorquent.

**ARGUMENTUM I.** a D. Bailly ita propositum: *Comment la masse énorme des mers ne seroit-elle pas glacée dans sa profondeur? on sait que les rayons du soleil n'y pénètrent pas fort loin; la température égale & modérée des eaux le prouve assez; mais à des profondeurs plus grandes, entièrement inaccessibles aux traits de la lumière, les eaux de la mer devroient être toujours glacées, si des feux encore plus profonds ne les entretenoient dans leur état de liquidité.* (Lettres à Mr. de Voltaire, pag. 298. Idem argumentum adhibet D. de Buffon. (*Époques de la nature*, pag. 9. & 10. edit. in 4.)

**Responsum.** Quia solis radii ad maris fundum non perveniunt, inde inferre non licet inferiores maris aquas sine ignis centralis beneficio congelandas esse. Nonne propter sales quibus abundant, suam retinent fluiditatem, etiam infra congelationis punctum? Præterea quis concipiat maris fluiditatem ab eo igne pendere qui

qui maris fundo nequidem potest caloris gradum impertire, quem in ejus superficie deprehendimus? Si existeret calor ille centralis, nonne inferiores aquas prius calefaceret, quam superiores. Denique nonne obstarēt sola ventorum æstusque maritimi agitatio, ne mare congelasceret in iis etiam partibus, quæ radiis solaribus sunt impervix? Id ultro sequitur ex istis recentiores Plinii verbis:

*Lorsq' une partie d' un fluide se meut, toute la masse du fluide se meut aussi. Or, dans les mouvemens des mers, il y a une tres-grande partie de l'Océan qui se meut sensiblement; toute la masse des mers se meut donc en même temps, & les mers sont agitées par ce mouvement dans toute leur profondeur. (Hist. Nat. 1. vol. pag. 430.) La force qui produit le flux & le reflux est une force pénétrante qui agit sur toutes les parties proportionnellement à leur masses. (Ibid. 87.)*

ARG. II. Undenam, ait D. Bailly (*ibid.*) oriuntur aquæ calidæ, quæ ad 80 latitudinis gradus in Spitzberga (*Spitzberg*) fluunt, nisi ab igne centrali?

*Responsum*: Si aquæ illæ, reponunt alii, suum ab igne quodam centrali calorem mutuarentur, omnes globi terrestris fontes incalescerent: ignis enim hujus, sicut & alterius cujusvis, virtus a centro versus circumferentiam sese expanderet. Si ergo vim habeat aquas Spitzbergæ calefaciendi, cur idem efficere non valeat in ceteris orbis universi fontibus? Undenam quorundam fontium calor repetendus sit quaeritur. In promptu causa est: scilicet aqua e superficie terrestri infra tellurem per obvias rimas illabens, incidit in pyritas & substantias bituminosas, quibus sese permiscet; ex illa vero permissione nascitur fermentatio, vel etiam inflammatio.

ARG. III. *Lorsqu' il tombe de la neige après des gelées, cette neige s' amasse sur les camps refroidis.*

post ebullitionem aurum præcipitatur: si deinde liquorem qui pulveri aureo supernatat, eduxeris, & pulvis ille repetitis vicibus aqua tepida fuerit ablutus, & postea igne levissimo exsiccatus, tunc dicitur *aurum fulminans*. Ubi paululum hujus pulveris in cochleari (*cuißer*) positum, igni subjicitur, aurum vi subita detonat, cochlear perfoditur, & materia, haud fulmine lentius, hinc & inde dijicitur.

*Explicatur experimentum.* 1. Ubi in aurum dissolutum infunditur oleum *tartari*, aurum in fundum vasis præceps abit, quia acida aquæ regalis in poros olei *tartari* sibi magis affines & cognatos irruunt, & particulas aureas deferunt. 2. Partes ignitæ quæ pulverem aureum penetrant, aer ipse interior cujus partes omnes eodem tempore sese dilatant, solidas tum salis, tum auri particulas circumquaque disjiciunt. Illæ autem tanto impetu ejaculatæ aerem concutiunt & agitant, ipsique motum tremulum & reciprocum imprimunt, in quo sonus consistit, ut postea exposituri sumus; hinc subitus ille qui auditur fragor. Præterea cum materiæ sese vehementer expandenti resistat aer superior, nec satis velociter cedat, totus rarefactionis nifus deorsum repellitur, ideoque perfoditur cochlear.

**EXPERIMENT. III.** In scypho vitreo permisceantur quatuor uncias spiritus e terebinthina recens educti cum sex uncis aquæ fortis. Deinde scyphum operias, eumque identidem succute; si paulo post tollatur operculum, tunc ebullit liquor, densi erumpunt fumi, & micat flamma circa scyphi parietes erratica.

*Explicatur experimentum.* Aquæ fortis acida poros spiritus terebinthinæ penetrant, & aerem interiorem comprimunt; sed quia ab aere externo non adjuvantur, debent remissius agere. Ubi vero tollitur operculum, tunc acida viribus aucta, & aeris externi accessione excitata, aerem interiorem fortius premunt. Cum autem

tem

tem aer ille compressus renitatur; acida repellit. Inde nascuntur itus & reditus, quorum occasione partes igneae majorem accipiunt motum, liquor magis incalcescit, aer sese dilatat, sursum profilit, & secum rapit partes liquoris subtiliores. Hinc fumi. Cum spiritus terebinthinæ partibus ignitis abundet, illæ agitari non possunt, quin prodeat flammula.

*EXP. IV.* Ubi semiuncia aquæ fortis, cum eadem quantitate olei e gayaco extracti commiscetur, vehemens exoritur fermentatio, densus exhalatur fumus, micat flamma, & peracta fermentatione, e scypho sese attollit corpus spongiosum, ad unius fere semipedis altitudinem.

*Explicatur experimentum.* Aquæ fortis partes acuminatæ poros olei subeunt, & aerem interiorum comprimunt, qui renitens ea repellit. Hinc excitatur motus reciprocus, qui partes igneas suscitatur, ac proinde calorem & flammam: dum autem liquor fervescit & inflammatur, aer interior rarefactus, sese evolvit; & quia in partibus olei ramosis implicatur, eas disjungere ab illisque sese expedire nititur; idcirco liquorem tumescit, unde nascitur corpus spongiosum.

*EXP. V.* ubi in oleum vitrioli affunditur semiuncia salis ammoniaci in pulverem redacti, vehemens excitatur fermentatio, densi avolant fumi. Si thermometer in liquore fermentescente immergas, spiritus vini descendit, dum sese attollit in altero thermometro, quod vaporibus sursum sublati obijcitur.

*Explicatur experimentum.* Olei vitrioli acida intra partes salis ammoniaci alkalicas sese influunt & impediunt, siquidem dum liquor fermentescit multæ fiunt coagulationes. Illæ autem fieri nequeunt, quin partes ad se invicem magis accedant, ac proinde quin particula igneæ in iis inclusæ erumpere cogantur; idcirco debent liquorem deferere; non possunt autem ab eo exire, quin frigescat; quomobrem descendit

spiritus vini in thermometro quod fuit in liquore immersum. Aliunde ignita corpuscula a liquore sese expedire nequeunt, & simul cum vaporibus avolare, quin illi calidiores fiant; ergo in thermometro quod illis vaporibus obicitur vini debet ascendere.

Quæres quam sit genuina fermentationis causa, quæ scilicet corporis dissolventis particulas intra corporis dissolubilis meatus impellat & intrudat.

Resp. Causam hanc nondum bene exploratam habent Physici, ut sic fateatur qui inter Physicos nobiliores merito numeratur D. Nollet: Tous les Physiciens conviennent, que de deux matieres qui ferment ensemble, l'une pénétre l'autre, & que le mélange s'échauffe, parce que les parties s'entrechoquent, & se frottent en se pénétrant: mais ils ne s'accordent pas de même sur la cause de cette pénétration. Il faut cependant qu'il y en ait une. Car quand on se représenteroit les parties pointues du dissolvant en présence & directement vis-à-vis des petites masses poreuses de la matiere dissoluble, comme des chevilles au bord de leurs trous, encore faut-il une puissance qui les y chasse, & qui anime leur effort.

Ceux qui recoivent & défendent l'attraction comme une cause physique, expliquent tout à leur aise ces mouvemens intestins des matieres qui fermentent. Il y a, disent-ils, une attraction réciproque entre le corps dissolvant & celui qui est dissoluble, entre l'acide & l'alcali; dès que l'un & l'autre sont à portée de se joindre, cette vertu qui réside en eux, tend à les unir de la manière la plus complete, par le contact immédiat de leurs moindres parties, ce qui ne peut se faire que par la division des molécules.

Il faut avouer que cela ne va pas mal au premier coup d'œil, & que la plupart des difficultés qui se présentent après, tombent également sur les autres; mais quand cela irait encore mieux,

mieux, l'esprit n'est point satisfait de cette explication, lorsqu'il vient à sentir qu'elle est fondée sur un principe que bien des gens supposent par goût ou autrement, mais dont personne n'a jamais donné de preuves, qu'on ne puisse légitimement contester.

Un homme littéralement attaché à la doctrine de Descartes, vous dira que le monde est rempli d'une matière subtile, qui se meut en toutes sortes de sens, & qui pénètre ainsi les corps les plus compacts; que dans le cas de la fermentation, ce sont les impulsions redoublées de ce fluide par excellence, qui font entrer les pointes des acides dans les pores des alkalis.

Cette explication au moins nous offre un mécanisme intelligible. Elle n'exige pas que l'esprit se prête gratuitement à des notions nouvelles, auxquelles il n'est conduit par aucun exemple; mais elle suppose des faits qui, selon moi, ne sont pas assez prouvés: car comment au milieu de tant d'impulsions de cette matière, qui se feroient souvent en sens contraires, les pointes des acides frappées en même temps par les deux bouts, seront-elles chassées dans les pores de l'alkali? car un clou n'avance ni ne recule entre deux coups de marteau d'égale force. Avouons de bonne foi notre ignorance, en attendant les lumières qui nous manquent. (Tom. 4. pag. 256. & suiv.)

### ARTICULUS III.

De Calore subterraneo & centrali.

**D**E calore centrali nostris temporibus gravis est controversia. Utrunque dimicant nobis athletæ. Contendunt alii in intimis terræ visceribus ignem & calorem delitescere; alii vero eam opinionem, tanquam imaginationis plus quo incalcentis figmentum rejiciunt. Præcisa quæ utrinque afferuntur argumenta, breviter exponemus.

AR-

*ARGUMENTA Physicorum qui globo terrestri  
centralem vindicant calorem.*

1. Inquiunt, terram altius effodere minime necesse est, ut intra ipsam detegatur calor constans & æquabilis, quæcumque sit aeris supra terræ superficiem temperies. Liquor enim thermometri per totum annum ad eandem altitudinem pensilis manet in cellis *Observatorii Parisiensis*, quarum tamen profunditas non est nisi 84. pedum, sive 14. Sexpedarum. Idem fere remanet hic calor, a 14. sexpedis ad 100. usque, ut patet ex fodinis. Si ultra progrediaris, augetur calor, & tantus aliquando fit, ut eum sustinere non possent qui fodinis operam dant, nisi arte aliqua & industria temperaretur.

D. de Genfanne Accademiæ Scientiarum Parisiensis, ut ajunt, *correspondens*, expertus est in fodinis quibusdam (*de Giromaghy, à trois lieues de Belfort*) liquorem thermometri, qui extra fodinam ad duos supra congelationem gradus erat suspensus, ad 10. pervenisse, quando thermometrum intra 30. sexpedarum profunditatem delatum fuit, ubi perventum est ad 106. sexpedas, liquorem thermometri 10. gradus cum  $\frac{1}{2}$ ; ad 158. sexpedas, 15. gradus cum  $\frac{1}{3}$ ; ad 222. sexpedas, 18. gradus cum  $\frac{1}{6}$  attigisse. (*Dissertation sur la glace par M. de Mairan, page 66. & suiv. edit. de Paris in 12. de l'année 1749.*)

Quo profundius in terræ viscera descenditur, inquit D. de Genfanne, eo major percipitur calor; ita ut ad 1800. pedum altitudinem infra solum Rheni, prope Huningam in Alsacia (*Huningue en Alsace*) eum deprehenderim calorem, qui vaporatorem aquæ suscitaret. (*Histoire naturelle de Languedoc, tom. 1. pag. 24.*)

2. Probare facile est, inquit D. de Buffon, aquarum marinarum liquiditatem generatim radiis



diis solaribus non esse tribuendam; eorum quippe calorem aquas ultra 150. pedes non permeare, testatur experientia; aquæ igitur infra hanc altitudinem subjectæ, gelu adstringerentur, nisi eas a coagelatione defenderet calor centralis. Experientia non minus certum est, pergit auctor clarissimus, radiorum solarium calorem intra terram non propagari ad 15. usque aut 20. pedes; siquidem in ea profunditate servatur glacies per æstatem vel calidissimam; apertum est igitur, infra maris alveum perpetuam esse caloris centralis manationem, quæ aquarum liquiditati consulat, & terræ temperiem procreet. (*Supplément de l'histoire naturelle, contenant les époques de la Nature, tom. IX. pag. 14.*)

3. Neminem fugit, tempore pruinoso (*dans le temps des frimats*) nivem in omnibus his locis liquefcere, in quibus vapores e terræ sinu prodeuntes, liberum habent exitum, ex. g. supra puteos & aquæductus contextos, supra fornice & cisternas; dum ceteris in locis, ubi terra gelu adstricta illos vapores intercipit, nix permanet & congelatur, nedum liquefiat. Quo facto liquet hujusmodi exhalationes e terræ penetralibus avolantes, vero calore esse præditas (*Ibid.*)

4. Aliud argumentum adhibet D. Bailly in opere cui titulus: *Lettres sur l'origine des Sciences, à Paris, in 8. an. 1777., pag. 299.,* ubi sic habet: *Sans cette chaleur intérieure comment dans les climats les plus froids, la terre ne se- roit-elle pas gelée au-delà de 5. à 6. pieds; (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1749. pag. 14.) Par-tout où l'eau pénètre, elle devoit se convertir en glace par la rencontre des molécules terreuses, qui n'ont jamais vu le soleil. D'où viennent donc les sources de cette fontaine, que les Académiciens François trouverent à Pello dans la Lapo- nie; fontaine dont les eaux n'étoient jamais glacées? (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1737., pag.*

pag. 401.) D<sup>o</sup> où viennent ces eaux chaudes qui coulent dans le Spitzberg à 80. degrés de l'atitk-  
del (Hist. génér. des Voyages, tom. 15. in 4. pag.  
141.) La fermentation ne peut expliquer ces phé-  
nomènes, puisqu'il n'y point de fermentation,  
où il n'y a pas de chaleur.

Quem globo terrestri inesse calorem centralem  
docent DD. de Buffon & Bailly; eundem vo-  
lunt esse saltem quinquies & vicies illo majo-  
rem, quem generant radii solares.

**ARGUMENTA Physicorum qui calorem  
centralem rejiciunt.**

1. Ad quacumque altitudinem effodiatur ter-  
ra, quovis anni tempore, & quavis in regio-  
ne, ubique eadem occurrit temperies; ubique  
liquor thermometri ad 10. gradus manet pensil-  
lis, nisi obstitit specialis quædam circumstan-  
tia. In plurimis probant experimentis, quæ ten-  
tarunt viri de rebus physicis versatissimi. Sic,  
teste D. Guettard, ad 250. sexpedas in fodinis  
salis (de Wieliszba in Pologne,) mercurius in  
thermometro D. de Réaumur, ad 10. gradus  
constanter stetit suspensus; sic etiam, asserit D.  
Monnet idem contigisse pari thermometro, quod  
delatum fuerat ad 280. sexpedas in fodinis (de  
Jaachimsthal in Bohemia.) Ad majorem altitu-  
dinem nullibi huc usque pervenerunt fossores.  
(Journal de Physique de Mr. l'Abbé Rozier, mois  
de Sept. 1777., pag. 234.) Atqui si in terra sinu  
existeret calor quinquies & vicies illo vegetior,  
quem procreant solis radii per æstatem calidif-  
simi, numquid inter prædictas fodinas mercu-  
rius thermometri in decimo gradu supra conge-  
lationis punctum ita contumaciter hæreret? Non-  
ne semper eo major foret ipsius altitudo, quo  
profundius in interiora terræ penetralia descen-  
deretur?

Frustra, inquiunt, nobis objiceretur quod a  
D. de Gensanne observatum fuit in fodinis de

*Giromagny*; factum enim illud, etiam si verum sit, nihil probat: cum alijs quippe experimentis pugnat, quæ in ceteris fodinis, etiam profundioribus, tentata sunt.

2. Si in ipsis terræ visceribus ignis resideret, cujus calor e centro in alias globi terrestres partes diffunderetur, tunc versus lacuum & maris fundum, utpote foco propiorem, plus caloris deprehenderetur, quam in superficie: atqui contrarium, sive per æstatem, sive per hiemem declarat experientia. D. enim de Saussure die 13. mensis Augusti an. 1767. thermometrum D. de Reaumur in fundum lacus Genevensis, ad 82. pedum & 6. pollicum altitudinem demisit: quo post 5. horas extracto, liquor ad 10. gradus &  $\frac{1}{2}$  erat suspensus; alterius vero &

similis thermometri infra superficiem uno tantum pede immersi liquor post idem tempus 20. gradus &  $\frac{1}{2}$  attigerat. Narrat idem Physicus DD. Mallet & Pictet, die 6. mensis Augusti an. 1774. in lacum Genevensis demersisse ad 312. pedum altitudinem thermometrum D. de Reaumur, in tubo vitreo hermetice inclusum. Postquam ex aquis eductum fuit, mercurium viderunt ad 8. gradus &  $\frac{1}{2}$  supra zero pensilem, quamvis superficiem temperies esset 15. graduum. Vide eximium opus D. de Saussure, cui titulus, *Voyage dans les Alpes*.

Variis etiam constat experimentis in maris inferioribus aquis longe minus inesse caloris, quam in superioribus. Qua de re consule opus inscriptum, *Voyage du Capitaine Phipps au pôle boréal*, pag. 25.

3. Comprobat experientia vulgaris, glacies in ima tellure per hiemem depositas, per æstatem servari, nec liquecere, quantumvis profunda sit sedes in qua reconditæ fuerunt: atqui in opinione quæ calorem centralem admittit, & qui-

& quidem quinquies & vicies illo intensiorem, quem gignunt radii solares æstivi, nonne brevi resolveretur & liquefieret glacies ista subterranea?

4. Ea est, inquiunt, ignis natura, ut diu subsistere nequeat sine aeris liberi & elastici auxilio, qui perpetuo renovetur; sine alimentis quæ semper consumat: atqui nihil horum reperias in fabulosis illis cavernis, in quibus reconditus fingitur ignis centralis. Et vero vel ignis ille aliquam cum aere externo communicationem habet, vel nullam. Si prius, brevi extinguatur necesse est; si posterius, cur suis e carceribus horribili cum fragore non erumpit, ut contingit ignibus vulcaniis, (*feux des volcans*) qui statim atque in aerem externum viam sibi moliti sunt, subito impetu suis ex antris prosiliunt, & obvia quæque subruunt?

5. Denique argumenta quæ in ignis centralis gratiam afferuntur sic diluunt, imo suos in adversarios retorquent.

**ARGUMENTUM I.** a D. Bailly ita propositum: *Comment la masse énorme des mers ne seroit-elle pas glacée dans sa profondeur? on sait que les rayons du soleil n'y pénètrent pas fort loin; la température égale & modérée des eaux le prouve assez; mais à des profondeurs plus grandes, entièrement inaccessibles aux traits de la lumière, les eaux de la mer devroient être toujours glacées, si des feux encore plus profonds ne les entretiennent dans leur état de liquidité.* (*Lettres à Mr. de Voltaire, pag. 298. Idem argumentum adhibet D. de Buffon. (Époques de la nature, pag. 9. & 10. edit. in 4.)*

*Responsum.* Quia solis radii ad maris fundum non perveniunt, inde inferre non licet inferiores maris aquas sine ignis centralis beneficio congelandas esse. Nonne propter sales quibus abundant, suam retinent *fluiditatem*, etiam infra congelationis punctum? Præterea quis concipiat maris *fluiditatem* ab eo igne pendere, qui

qui maris fundo nequidem potest caloris gradum impertire, quem in ejus superficie deprehendimus? Si existeret calor ille centralis, nonne inferiores aquas prius calefaceret, quam superiores. Denique nonne obstarēt sola ventorum æstusque maritimi agitatio, ne mare congelasceret in iis etiam partibus, quæ radiis solaribus sunt imperviæ? Id ultro sequitur ex istis recentiores Plinii verbis:

*Lorsq' une partie d' un fluide se meut, toute la masse du fluide se meut aussi. Or, dans les mouvemens des marées, il y a une tres-grande partie de l'Océan qui se meut sensiblement; toute la masse des mers se meut donc en même temps, & les mers sont agitées par ce mouvement dans toute leur profondeur. (Hist. Nat. 1. vol. pag. 430.) La force qui produit le flux & le reflux est une force pénétrante qui agit sur toutes les parties proportionnellement à leur masses. (Ibid. 87.)*

ARG. II. Undenam, ait D. Bailly (*ibid.*) oriuntur aquæ calidæ, quæ ad 80 latitudinis gradus in Spitzberga (*Spitzberg*) fluunt, nisi ab igne centrali?

*Responsum*: Si aquæ illæ, reponunt alii, suum ab igne quodam centrali calorem mutuarentur, omnes globi terrestri fontes incalescerent: ignis enim hujus, sicut & alterius cujusvis, virtus a centro versus circumferentiam sese expanderet. Si ergo vim habeat aquas Spitzbergæ calefaciendi, cur idem efficere non valeat in ceteris orbis universi fontibus? Undenam quorundam fontium calor repetendus sit quaritur. In promptu causa est: scilicet aqua e superficie terrestri infra tellurem per obvias rimas illabens, incidit in pyritas & substantias bituminosas, quibus sese permiscet; ex illa vero permissione nascitur fermentatio, vel etiam inflammatio.

ARG. III. *Lorsqu' il tombe de la neige après des gelées, cette neige s' amasse sur les camps refroidi.*

refroidis ; tout est glace autour d'elle ; cependant elle s'affaïsse, elle se fond par dessous. Comment la croûte extérieure & durcie résiste-t-elle à la chaleur du soleil ; tandis que la surface intérieure, qui touche la terre, défendue par la couche entière, éprouve assez de chaleur pour se résoudre en eau ? Souvent la végétation subsiste sous la neige glacée. Il est même, dit-on, des plantes qui y fleurissent. La cause de cette chaleur, la cause de cette végétation, est donc inhérente à la terre ; elle est donc l'effet des émanations centrales. (Ibid. pag. 306.)

*Responsum.* Mirum sane est velle ignis centralis defensor, ut ignis illius fictitiæ manationes nivem liquefaciant quæ supra terræ superficiem posita est, dum nequeunt glacies resolvere, quæ ad 15. aut 10. pedes subter humum reconditur. Illud ratiocinium prorsus evertitur observatione D. Messier. Ipsam audiamus : Le 2. Février 1776. le dégel commença à se manifester ..... le 4. après midi, je passai aux Thuilleries ; le jardin ne présentait qu'une nappe d'eau sur la neige qui était devenue dure & compacte, ayant été foulée aux pieds & durcie pendant tout le temps de la gelée. C'étoit la surface qui se dégelait ; la terre encore trop froide conservait la neige (Mém. de l'Académie 1776. pag. 62.) Cum ergo tantopere manationes centrales venditant adversarii, quæ in factis mœx memorato prorsus deficient.

*Alteram,* inquit, subjungamus D. Gerhard ex Academia Berolinensi observationem quæ calorem centrale non minus extinguit. Dum excelsum Silesia montem, cui nomen le Weissenstein, lustraret, hic, illic, quosdam nivis acervos deprehendit, tempore bene calido, colloque sereno. In primam nivis superficiem immisit thermometrum & mercurius ad punctum congelationis descendit ; 1. autem infra illud punctum gradibus substitit, postquam idem thermometrum in secundam & tertiam

su-

superficiem inferiorem demersum fuit. (*Journal de Phys.* Janvier 1774. pag. 40.) Porro si cujus caloris centralis manatio nivem liquefaceret, nonne in superficie superiori, potiusquam in inferiori major frigoris gradus deprehenderetur?

Nequicquam igitur in fabulosa ignis centralis manatione quaeritur causa, cur in agris partes nivis inferiores ipsius liquefiant, quam superiores. Res ita contingere potest, vel propter finum, qui paucis ante mensibus in agros investus fuit, suumque diu calorem retinet; vel propter aeris subterranei actionem, qui aere externo minus est frigidus, & qui e tellure sese expediens, nivem sibi obviam impellit & percutit.

ARG. IV. a D. de Buffon sic expositum: *Tout le monde a remarqué dans le temps des frimats, que la neige se fond dans tous les endroits où les vapeurs de l'intérieur de la terre ont une libre issue, comme sur les puits, les aqueducs, reconverts, les voûtes, les citernes, &c. Tandis que sur tout le reste de l'espace où la terre resserrée par la gelée, intercepte ces vapeurs, la neige subsiste & se gèle au lieu de se fondre. Cela seul suffiroit pour démontrer que ces émanations de l'intérieur de la terre ont un degré de chaleur très-réel & sensible.* (*Epoques de la nat.* pag. 10.)

Responsum: Si effectus ille ab ignis centralis emanationibus procrearetur, ut placet clarissimo D. de Buffon, idem ille ignis, iidem illi vapores glaciem in tellure ad 25 aut 20. pedes effossa repositam, per aestatem liquefacerent: atqui tamen res aliter se habet. Præterea, inquit, illi vapores ab igne centrali prodeuntes, puteorum aquas ita calefacerent, ut nunquam congelascerent: atqui contrarium non semel accidit. Testatur enim D. Messier, saviente frigore anni 1776., multis in puteis aquam gelu fuisse adstringam. (*Mém. de l'Acad.* 1776., pag. 59.)

Ex iis omnibus compertum est, quam immerito

tito illustres Physici DD. de Buffon & Bailly ignem centralem, veluti rem demonstratam, adeo confidenter defendent.

## SECTIO TERTIA.

### *De Frigore.*

**H**ujus sectionis duplex erit articulus: in priori de frigoris natura & causis; in posteriori de glacie differemus.

### ARTICULUS PRIMUS.

#### *De Frigoris natura & causis.*

**D**E frigoris natura non levis est inter Physicos disputatio. Si Cartesianos audias, frigus nihil aliud est, quam cessatio vel imminutio motus in partibus corporum insensibilibus. Inter recentiores plerique frigus situm esse volunt in ignis vel absentia vel motu debiliore. Sententia Cartesiana refellitur tum ex iis quæ de calore jam diximus; tum ex eo quod corpora quædam sint frigida, quorum particule non minus agitantur, quam corporum calidorum partes. Ex. gr. si oleum vitrioli cum sale ammoniaco vel spiritu nitri commisceas, vehemens excitabitur motus, & tamen liquor valide frigidus sentietur. Præterea glacies in aquam sale ammoniaco resoluta, frigidior est ipsa glacie solida: atqui profecto aqua limpida non minus agitur, quam congelata; re quidem vera corpora pleraque frigida, aut nullum aut pene nullum habent motum; sed inde concludere non licet frigus in motus cessatione vel imminutione consistere.



## PROPOSITIO.

*Frigus ex parte corporis frigidi consistit in partium ignearum vel absentia vel quiete.*

Prob. **C**Um frigus & calor ex adversa fronte secum pugnent, ea in quibus consistunt debent esse opposita: atqui calor situs est in partium ignearum præsentia & agitatione; ergo in earumdem absentia vel quiete frigus debet consistere. Et vero corpus tunc a nobis frigidum dicitur, quando corpus nostrum ei motum & calorem suum communicat: atqui ubi in corpore aliquo partes igneæ vel nullæ sunt, vel consopitæ, tunc corpus nostrum ipsi applicatum, ejus partibus motum & calorem suum impertit; ergo corpus illud debet frigidum sentiri, ac proinde, &c.

Dices: Si frigus in partium ignearum absentia vel quiete consisteret, ferrum candens suum calorem promptius amitteret, cum ligno applicatur, quam ubi aquæ in perpetuo motu positæ immergitur; atqui tamen contrarium testatur experientia; ergo, &c.

Resp. neg. maj. Ferrum enim candens longe minorem sui ignis partem communicat, cum ligno applicatur, quam ubi aquæ immergitur. Ratio est quia ab iisdem ligni partibus tangitur; contra vero novis & sibi invicem continuo succedentibus aquæ particulis ambitur, quibus singulis ignem suum impertit.

Quæres 1. quanam sint frigoris causæ.

Resp. Variæ sunt. Prima est solis a vertice nostro distantia. Omnes enim tempestatum vicissitudines inde oriuntur, quod a nostro zenith sol magis aut minus removeatur. Secunda, sunt spiritus salini & nitrosi, quos ad frigus plurimum conferre innumera probant experimenta. Ex. gr. Si ante follis orificium collocentur sal & glacies contusa, aer e folle prorumpens, mul-

multo frigidior est. Idcirco in locis quæ nitro & sale abundant, frigus esse solet vehementius. Tertia causa sunt venti septentrionales. Secum enim advehere solent nitri & salis particulas, quæ frigori excitando sunt maxime idoneæ. Referunt Scriptores in Ukraina Poloniæ provincia frigus esse acerrimum, longeque intensius quam in Normandia, quamvis in globo terrestri idem sit utriusque situs. Fluvius qui regiam Sinarum urbem alluit, circa mensem novembrem intra unum diem ita frigore concrevit & induratur, ut quatuor mensium spatio, currus & ingentia pondera sustineat, quamvis aquæ & aeris frigus non ita intensum videatur; ille tamen fluvius eandem in globo terrestri positionem habet, ac Tiberis in quo tantum frigus non deprehenditur. Idcirco maxime probabile est, id quibusdam ventis tribuendum esse, qui salinos nitrosque spiritus secum deferant, & ipsis permisti, corporum poros subeant.

Quæres 2. cur majus percipiatur frigus, flante, quam silente vento?

Resp. Quia ventus atmosphæram aeris corpus nostrum ambientis perpetuo dissipat. Hac autem mutari non potest, quin frigus sentiat. Novus quippe aer minus est calidus, quam corpus nostrum, & aliquam caloris nostri: partem continuo suffurat.

Quæres 3. cur in montibus altissimis, quales sunt montes Peruviani sub ipsa Zona torrida positi, viatores, nedum æstu immodico laborarent, tanto frigore corripiantur, ut nisi diligenter sibi provideant, toti subito rigescant, & gelu torpescant, quamvis tamen nullibi lumen vividius sol emittat.

Resp. Hujus effectus causa est multiplex. 1. In montibus altissimis aer, cum sit rarissimus, facilem radiis solaribus præbet transitum; & proinde minus calefieri debet. Contra vero ubi aer densior est, solis radios diutius retinet, quorum calor prope terræ superficiem colligitur.

2. Non-

14, mT atq. 2

2. Nonnisi brevissimo tempore eandem illorum montium partem collustrat, ideoque levissimum duntaxat ipsi calorem impertit. 3. Sub Zona torrida dies fere omnes sunt noctibus æquales; quo longiores autem sunt noctes, eo magis aer frigescit.

Quæres 4. cur nonnullis in locis, vel media æstate, maximum sæviat frigus, & aqua in glaciem concresecat.

Resp. Id contingit ex eo quod solum plurimas salis nitri partes contineat. Prope Vefuntionem est caverna, in qua, vel ipsa æstate, reperiuntur ingentes, glaciei pyramides, eo majores, quo vividior est solis calor. Ratio est, quia in terris vicinis, & maxime in ea quæ supra hujus cavernæ fornicem jacet, uberior est salium copia. Ex iis vero salibus calores æstivi quædam expediunt corpuscula aquæ congelandæ, ut modo exponetur, idonea. Hæc autem aquis per cæcos telluris meatus, & rupis scissuras cavernam subeuntibus permixta, eas in glaciem convertunt.

## ARTICULUS II.

### De Glaciæ.

ARTICULUM istum in tres paragraphos distribuimus; in primo, inquiremus quid sit glacies & quomodo concresecat; quæ ipsius firmitas, & utrum dilatetur aqua congelata; secundo expendemus quædam sit congelationis causa; in tertio, variæ proponentur quæstiones ad gelu pertinentes.

## PARAGRAPHUS I.

*Quid sit glacies & quomodo concresecat; quanta sit ipsius firmitas; utrum dilatetur aqua congelata.*

**Q**UÆRES igitur 1. quid sit glacies & quomodo concresecat.

Resp. Glacies est corpus perlucidum, fragile, durum, quod ex liquido in solidum fuit conversum. Sic autem formatur: cum aqua in vase contenta aeri frigidiori exponitur, tunc incipit in glaciem converti versus circumferentiam vasis interiorem. Ex ea scilicet proficiscitur multiplex filum tenue quod versus mediam vasis partem hinc & inde protenditur. Exigua hæc stamina sese expandunt & jungunt, adeo ut ex illis confietur veluti membrana tenuissima: infra hanc membranam alia similis formatur, quæ priori sese adjungit; sicque deinceps, ita ut glaciis quamdam acquirat crassitiem. Dum autem hæc omnia peraguntur, aeris particulae quæ intra partes aquæ erant inclusæ, ab iis sese expediunt. Hinc apparent aeris bullulae, quæ postea fiunt majores. Plures etiam ex iis prius disjunctæ ita coeunt & crescent, ut earum diameter sit unius fere pollicis. Dum augentur, opacior fit glacies, & quidem eo magis, quo bullæ amplius volumen acquirunt.

Quæres 2. quænam sit glaciei firmitas.

Resp. Glacies quandoque ita firma est, ut malleo vix rumpatur, & curribus vehendis par evadat. Cujus firmitatis exemplum sic commemorat D. de Mairan in sua de glacie dissertatione: *Pendant l'hiver de 1740. qui fut très-rigoureux, sur tout en Russie, on le froid surpassa celui de 1709, on construisit à Petersbourg un palais de glace de 52. pieds & demi de longueur, sur 16. & demi de largeur, & sur 20. de hau-*

buteur, sans que le poid des parties supérieures, & du comble qui étoit aussi de glace, parût endommager le pied de l'édifice. La Neva qui étoit tout proche, & où la glace avoit deux ou trois pieds d'épaisseur, en avoit fourni les matériaux. Les blocs de glace qu'on en tiroit, étoient d'abord taillés avec soin, embellis d'ornemens, & posés ensuite selon toutes les règles de la plus élégante architecture.

Il y avoit au devant du bâtiment six canons de glace, faits sur le tour, avec leur affût, & leurs roues de même matière, & deux mortiers à bombe dans les mêmes proportions que ceux de fonte. Ces canons étoient de ceux de trois livres de poudre de charge, ce qui répond tout au moins à six livres de balles. Mais on ne les chargeoit que d'un quarteron de poudre, qu'on mettoit dans l'ame de ces pièces d'artillerie. Après quoi on y faisoit rouler un boulet d'étoupes, & même quelquefois un boulet de fonte. L'épreuve d'un de ces canons fut faite en présence de toute la cour. Il fut chargé, comme nous venons de l'expliquer. Le boulet perça une planche de deux pouces d'épaisseur, à 60. pas d'éloignement.

Quæres 3. an dilatetur aqua congelata.

Resp. Aquam, dum in glacies concrefcit, dilatari certum est experientia quam tentarunt Physici Academiæ Florentinæ. Aqua scilicet impleverunt spheram auream & concavam; aptarunt etiam circulum metallicum per quem hæc sphaera transire poterat. Deinde aeri frigido exposita fuit, ita ut congelaretur quam continebat aqua. Sphaera inde tantum voluminis acquisivit, ut circulum metallicum jam trajicere non potuerit: atqui ideo volumen ejus accrevit, quia dilatata fuit aqua, dum in glaciem conversa est. Quinimo tantopere rarefit glacies, ut vasa in quibus includitur disrumpat. Hinc mirum videri non debet, quod aqua congelata aqua liquidæ supernatet; sic enim sese expanden-

dendo, volumen acquirit aqua fluida *specifico*  
*levius.*

## PARAGRAPHUS II.

*De Congelationis causa.*

Varia sunt ea de re opiniones.

OPINIO I. QUIDAM congelationis causam ex  
 eo repetunt, quod liquoris, v. g.  
 aquæ, partes quiescant. Scili-  
 cet, inquit, aer & frigus partes aquæ ita com-  
 primunt, ut ad sese accedentes, sese mutuo tan-  
 gant, & juxta se invicem inertes conquiescant.

Defendi autem non potest hæc opinio: multa  
 quippe sunt phænomena quæ probant glaciæ par-  
 tes non esse motu prorsus destitutas. Durante  
 enim frigore, aeris bullæ intra glaciem inclu-  
 sæ, quotidie crescunt; debent igitur aquæ partes  
 agitare, easque e loco quam occupant continuo  
 expellere. Præterea, faviente hieme, glacies  
 crepitat, in ea fiunt rimæ, ejus partes evapo-  
 rantur; ita etiam rarefit, ut vasa quibus conti-  
 netur, cum strepitu frangat. Quæ omnia intra  
 glaciæ partes motum & agitationem prodeunt;  
 ergo falsum est congelationis causam in quiete  
 partium aquæ esse constitutam.

OPINIO II. Gassendistæ congelationem attri-  
 buunt particulis quibusdam frigorificis, quæ in  
 fluidum turmatim irruentes, in spatia vel mi-  
 nima inter aquæ partes interjecta sese intru-  
 dunt, earum cohibent motum, & aquam in cor-  
 pus durum ac solidum compingunt, quod voca-  
 tur *glacies*.

Cui sententiæ maxime affinis est D. Musschen-  
 broek opinio. Juxta clarissimum hunc Physi-  
 cum, corpuscula quædam per aerem dispersa,  
 quæ *frigorifica* etiam appellat, r. aquæ mobili-  
 tatem fiunt, dum ipsius poros subeundo, illius  
 particulas quodam veluti glutine constringunt;  
 2. gla-

2. glaciei volumen amplificant, qui intra ipsius partes illapsa, eas a se invicem remouent.

Quam opinionem impugnat nobilis Physicus D. Briffon ex regia Scientiarum Academia Parisiensi. 1. Opponit experimentum quod a se factum narrat: ad dimidium, inquit, aqua implevi vas cupreum, unde, quantum fieri potuit, aerem extraxi ope machinæ pneumaticæ. Deinde clausum acerrimo frigori expositum fuit. Aqua in eo vase inclusa non minus prompte congelata est, quam alterius vasis omnino similis, sed aperti, quam eidem frigori exposita. Prioris vasis glacies durior & densior ea fuit, quæ aeris contactu formata erat: nullus tamen aer, nullum corpus frigorificum, potuit in aquam illabi.

2. Per æstatem, fit glacies artificialis; numquid tunc in aere continentur corpuscula frigorifica? nec dixeris ea delitescere in salis & glaciei, quæ adhibentur permissione: si enim res ita se habeat, cur mixtum istud non congelascit?

3. Non facile concipitur quo pacto corpuscula frigorifica in aquam immissa, illiusque partes compingendo, hujus volumen sic augeant, ut aqua fiat levior quam antea. Hujusmodi corpuscula, dum in aqua affluunt, nonne illius gravitatem augere, potius quam minueret deberent?

OPINIO III. Alii, rejectis corpusculis frigorificis, congelationis causam in sola ignis absentia sitam volunt. Ita sentiunt Illustres Physici *Bæerhaave*, *s<sup>r</sup> Gravesande*, *Mairan*, &c. Quam opinionem aliis anteponendam censet D. Briffon, sicque eam exponit: aqua non est fluida nisi quia eam continet materiæ igneæ copiam, quæ ipsius partium continuitatem interrumpat, & alias seorsim ab aliis mobiles efficiat. Ex ignis ad liquiditatem necessariæ imminutione contingit, ut partes aquæ sese propius contingant, sibi invicem adhereant, in corpusque durum

Cap. 3.

coeant.

coeant, quod glacies dicitur. Cum verò ignis, instar cujuslibet alterius fluidi, circumquaque æqualibilibiter sese diffundere nitatur, si aqua exposita sit aeri qui minorem, quam ipsa, ignis quantitatem contineat, ut per hiemem fieri solet; tunc aqua ignis portionem suæ liquiditati necessariam aeri contiguo communicat, & proinde amittit. Cur alia congelentur fluida, eadem affertur potest ratio. (*Diff. de Phys. ad verba Congelation & Glace.*)

Quod autem aqua congelata volumen augeatur, unde sit ut glacies sit *specifico* levior aqua, dum esset fluida, id aeri tribuendum esse statuunt. Scilicet per congelationem aquæ partes ad sese invicem propius accedunt; unde contingit ut aer intra *poros* aquæ captivus, suis e carceribus exeat, in bullas sese agglomeret, & liberius in massam sese expandat, ex qua egredi non potest: obstat enim aquæ superficies, quæ prima semper congelatur. Huic opinioni non parum favet experientia: glacies nimirum aquæ, aere, quantum fieri potest, expurgatæ, longe minus aeris globulis interrumpitur, & *specifico* gravior est quam glacies aquæ, unde aer non fuit extractus.

Ex illa voluminis accessione, cujus causa est aeris elaterium, nascitur stupenda illa vis qua pollet glacies. Tanta est, ut incredibilis videretur, nisi omnem dubitationem amoverent experimenta certissima: clarissimum illud est quod tentavit D. Huyghens. Fistulam scilicet ferream (*canon de fer*) cujus crassitudo erat unius digiti, aqua implevit & accurate clausit. Deinde acerrimo frigori exposita, post 12. horas disrupta est; tantus est glaciei impetus! D. Muschenbroek calculis vim subjiciens, quam in simili casu glacies exerit, eam deprehendit æqualem viribus quæ pondus 27720. librarum attollerent. (*Tentam. pag. 135.*)

OPINIO IV. Sunt qui duas opiniones postremas simul concilient. Non diffitemur, inquit, inter



inter præcipuas glaciæ causas locum sibi vindicare ignis privationem; sed aliam sibi adjunctam habeat necesse est. Plurima enim sunt phænomena quæ demonstrant, non fieri glaciæ, sine extraneæ cujusdam materiæ interventum quæ sese inter aquæ particulas intrudens, eas rarefacit.

1. Quædam sunt regiones in quibus per noctem dierum vel calidissimorum congelascit; qualis est Persiæ & Armeniæ pars septentrionalis. D. de Tournesort, dum in urbe Erzeron Armeniæ principe commoraretur, die 19 Junii scripsit ad D. de Pontchartrain, in ea civitate frequentem esse glaciem, seque ibi frigus acerrimum tunc experiri. Idem accidit in Italia, in Germania, in Helvetia: quin etiam in Episcopatu Basileensi (*de Bâle*) fluvius est qui, teste Scheuchzer, æstate tantum congelatur. In speluncis Vesuntinis (*grottes de Besançon*) quas accurate descripsit D. Bosc, per æstatem videntur moles glaciata, & quo major est calor, eo plus densitatis acquirunt illæ glaciæ. In mediis etiam his speluncis adest rivulus, qui nonnisi per æstatem gelu adstringitur, per hiemem vero liberum habet fluxum.

2. Si sola ignis absentia in glaciem aquam converteret, aqua desineret esse liquida, quoties multis infra congelationis terminum gradibus refrigeraret: atqui tamen contrarium non semel accidit. Vidi, inquit D. Sigaud de la Fond, aquam ad septimum usque infra zero gradum refrigeratam, suam retinere liquiditatem. Unde concludit ad formandam glaciem non sufficere ignis absentiam, sed ipsi aliam causam sociari. Hæc autem quædam esse potest, nisi tenuissima quædam corpuscula, quæ inter aquæ particulas sese insinuando, ex iis materiam igneam depellunt, easque secum invicem veluti conglutinant?

Quænam sit hujusmodi corpusculorum natura, inquirunt, indicare difficillimum esset. Tanta

quippe est horum subtilitas, ut oculos prorsus fugiant, nullaque arte hactenus potuerint vel segregari, vel colligi, Physicorumque examini subijci. Illud vero cognoscimus, ea scilicet a nitri, & alterius cujuslibet salis particulis distincta, inter earum substantiarum partes copiose disseminari; iisdem etiam abundare novimus ea loca, quæ plurimum nitri continent. Ab iis etiam corpusculis sibi conjunctis, eam sales mutantur quam habent proprietatem, aquas refrigerandi in quibus solvantur.

3. Si glacies, inquiunt, nullum contineret corpus extraneum, si ad solam ignis privationem referenda esset, aqua quæ oritur ex glacie per novam materiæ igneæ accessionem soluta, eadem prorsus esset, quæ ante congelationem fuerat: atqui tamen contrarium demonstrat experientia: omnibus quippe notum est hujusmodi aquam, quemadmodum & eam quæ nivium resolutione gignitur, esse insalubrem & coquendis leguminibus parum idoneam; quamdam igitur alienam substantiam sibi adjunctam habet. Quænam autem esse potest hæc substantia, nisi ea quæ in congelatione aquæ particulis sese intime copulavit, id est, corpuscula quæ *partes frigorificas* D. Musschenbroek eo tantum consilio vocavit, ut ipsorum effectus designaret.

4. Aquæ congelatæ novam quamdam accedere jungique substantiam, id maxime demonstrat, quod aqua, licet sufficienti frigori exposita, congelascere non possit, suamque liquiditatem retineat, cum aliquid huic substantiæ aditum in aquam præcludit. Id compertum est experimento quod ita describit idem Physicus:

In vasis omnino similibus parem includas ejusdem aquæ quantitatem, & in singulis demergatur thermometer, ut observari possit aquæ temperies. Ex iis vasis quædam vitrea, quædam metallica lamina contegantur. Nonnulla relinques aperta, quo tempore satis acre frigus erit ad formandam glaciem. Omnia eodem in loco

loco septentrioni exposto ponantur, & ita ut ne repercussos quidem solis radios excipiant. Singulis in locis ubi posita erunt vasa collocetur thermometerum. Observabis aquam in omnibus vasis coopertis liquidam fore, dum ea quæ in vase aperto continetur, glacie erit constricta, & quidem eo tempore, quo thermometeri liquor in ipso congelationis gradu erit constitutus.

Denique expectes donec frigus invaluerit, & liquor thermometeri quibusdam intra congelationis terminum gradibus descenderit; nihil novi deprehendes: aqua in vasis operculatis suam constanter fluiditatem retinebit. Tandem uni ex vasis operculum detrahe, statim aer externus prædicta corpuscula in aquæ superficiem deferens, eam congelabit; licet aqua frigidior non evadat: quinimo minus erit frigida. Quo enim tempore congelari incipiet, thermometeri in aqua demersi liquor nonnullis ascendet gradibus, in ipsoque congelationis termino consistet. Ergo, inquiunt, a solo frigore non pendet congelatio; sed frigori accedant necesse est extranea quædam corpuscula, quæ in aquam illapsa, ex ea materiam igneam exire cogant, & instar glutinis aquæ particulas constringant. Ita D. Sigaud de la Fond. (*Diſſ. de Physiq.*)

Experimentum illud cum eo conciliare non facile est, quod a D. Brisson tentatum retulimus. (*pag. 60.*)

Ultimam tamen hanc opinionem, si non certam, aliis saltem probabiliorem crediderim.

### PARAGRAPHUS III.

*Varie proponuntur quæstiones ad gelu & glaciem pertinentes.*

**Q**UÆRES I. cur tota fluminum superficies gelu non concreſcat, quando statim ab initio frigus est maximum.

C 5

Resp.

Resp. Fluvii ad medium usque profluentem ( *au milieu de leur courant* ) congelari non solent, nisi propter glaciei moles, vel ab eorum ripis avulsas, vel a rivulis minoribus advectas. Illæ vero circumstantiæ locum non habent, quando frigus statim est acerbissimum. Tunc enim tota rivulorum superficies subito gelu ita corripitur, ut glaciei frusta in fluvios deferre nequeant. Aliunde glacies in ipsis fluminum ripis concreta, iis adeo tenaciter adhærescit, tantæque densitatis est, ut inde distrahi non possint glaciei fragmenta; ipsa igitur frigoris acerbitas causa est, cur tota fluviorum superficies non congeletur. Eam ob causam, Sequana anno 1709., gelu totus non fuit adstrictus, quamvis per hiemes multo minus frigidas omnino glaciari soleat.

Quæres 2. unde nascantur variæ figuræ, quas in vitris glacies adhibet.

Resp. In vitris plurima sunt vestigia, plurimæ cavernulæ, in quibus colliguntur vapores, & vigente frigore congelascunt. Pro diversa igitur impressorum vestigiorum dispositione, glacies diversas induit formas. Vestigia illa in vitris exarata oriuntur ex affricu arenularum, quas adhibent artifices, ut laminas vitreas efficiant nitidiores; quo propter eo plures in vitris figuræ delineantur a glacie, quo recentius fuerunt, a sordibus expurgata.

Quæres 3. cur nimio frigore pereant arbores & plantæ.

Resp. Arborum succi & humores congelati, plurimum dilatantur, sicut & aqua dum glaciatur. Succi nimium rarefacti fibras dilacerant, & interiorem arborum structuram evertunt. Qua de causa anno 1709. interiire tot arbores.

Quæres 4. quid remedii adhibendum sit, cum aliquæ corporis nostri partes externæ, ut nasus, aures, manus, nimio frigore rigescunt.

Resp. Incaute prorsus & temere agunt, qui partes corporis frigore aut gelu rigescentes, igni citius

citius admovent. Inde fit ut sales nitrosi subito impetu expulsi, utque sanguis & humores promptius rarefacti, fibrarum ordinem subvertant, & partium texturam dirumpant, unde maximum imminet corruptionis periculum. Cui malo ut occurratur, maxime utile est partes frigore & gelu constrictas nive obducere, priusquam aeri calidiori exponantur. Tunc enim sales nitrosi, qui sanguinis & humorum cursum sistebant, nivi adherent cujus poros subeunt; vel particulae nivis, quae sensim liquefiunt, partibus congelatis levem paulatim agitationem communicant, quae illas expedit, suumque sanguini & humoribus fluxum restituit, sicque corporis partes amissum recuperant ordinem. Et vero, si fructus, carnes, aliaque corpora gelu correpta, calori exponantur, constat eas statim tabescere & corrumpi. Ubi autem in aqua frigida deponuntur, ita ut conglaciata desuper crustula protegantur, ea sensim ablata, prorsus integra deprehendes illa corpora, cum fuerint ex aquis extracta. Ita pomum quod in aqua frigida servatum fuit, eundem retinet saporem quem ante congelationem habuerat.

Quæres 5. cur pavimenta sustollantur, arbores scindantur, lapidesque teneriores frangantur, quando pluviae succedit gelu.

Resp. Tum guttae pluviales per varias rimulas subter pavimenta illapsae, in lapidumque molliorum meatus ingressae, tum succi arborum nutritii, sæviante gelu, congelantur. Porro dum aqua & humores in glaciem concreverunt, vi maxima dilatantur, & majus spatium sibi vindicant, ergo debent pavimenta sustolli, arbores dirumpi, lapidesque teneriores dissilire.

Quæres 6. cur, desinente gelu, interni domorum parietes glacie, instar nivis, cooperti videantur.

Resp. Cessante gelu, calor aeri, utpote rariori, promptius communicatur, quam parietibus. Idcirco glaciei lamellae parietibus inhaerent.

tes, in iis aliquandiu retineri debent. Imo vapores qui ab aere rarefacto sustineri jam nequeunt, in parietes frigidiores incidunt, ideoque in glaciem vel nivem debent coalescere. Idcirco cum marmora, vel saxa quasi sudare videris, ne existimes humidas illas partes ex iis corporibus prodixisse; nihil quippe aliud sunt, quam glaciei particulae nondum calore prorsus dissolutae.

Quæres 7. cur glaciei fragmentum in argentea lance (*assiette*) collocatum, citius liquefiat quam aliud ejusdem voluminis fragmentum lance lignæ impositum, quamvis argentum sit ligno frigidius.

Resp. Illius phænomeni causam hanc afferunt Physici: glacies, inquiunt, non dissolvitur nisi quia corpus ipsa minus frigidum contingit. Argentum quidem ligno frigidius est, sed multo levius (*plus lisse*.) Unde fit ut glacies longe pluribus in punctis argentum contingat, quam lignum. Illico promptior est glaciei dissolutio in argentea lance, quam in lignea. Propter eandem rationem glacies celerius solvitur super argentum, quam supra manus volam (*la paume de la main*.)

Quæres 8. cur, ubi duo glaciei fragmenta æqualia exponuntur aeri, alterum quo tempore silent venti, alterum dum spirat ventus; cur, inquam, prius e suo pondere nihil perdat, posterius vero eo majorem sui ponderis partem amittat, quo vehementior fuerit ventus. Illud experimentum fieri supponitur, quo tempore aer glaciem solvere nequeat.

Resp. Glaciei fragmentum aeri placido expositum nullam facit sui ponderis jacturam, quia nullum habet vaporisationis principium; sive internum, cum pauculas tantum ignis particulas, & quidem inertes, contineat; sive externum: supponitur enim in aere tranquillo collocatum. Longe autem diversa est alterius fragmenti ratio: venti enim quibus obnoxium est, per varios itus & reditus ex ipsius superficie tenues divellunt particulas, secumque abripiunt; quibus avul-

avulsis, glaciei pondus minuatur necesse est.

Quæres 9. quomodo fiat glacies artificialis.

Resp. 1. Aquam affundas in lagenam cujus-  
sat tenue sit vitrum. Eam deinde lagenam in  
vase capaciiori positam, glacie & sale simul per-  
mistis & contritis circumcingas: aqua brevi con-  
gelabitur vel media æstate, vel etiam prope i-  
gnem. Materia scilicet ignea quæ in lagenæ  
aqua continetur, ut æquilibrii legibus pareat,  
per occultos vitri meatus exiens in glaciei &  
salis permissionem sese conjiciet. Hæc materia  
igneæ absentia, juxta quosdam Physicos, causa  
est cur lagenæ aqua in glaciem convertatur;  
alii vero huic causæ, ut jam diximus, aliam  
adjungunt, nempe corpuscula quædam frigori-  
fica, quæ ex glacie & sale se expediunt, lague-  
næ poros subeunt, & aquæ in ea inclusæ parti-  
culas quodam veluti glutine constringunt.

Resp. 2. Id salibus proprium est, ut dissoluti in  
aqua frigus excitent ipso glaciei frigore acrius.  
Eam vim habent omnes sales, sed præsertim ma-  
rinus, nitrum, & multo etiam magis sal ammonia-  
cus. Hæc salium proprietas adhiberi potest, ut  
aqua sine glaciei vel nivis subsidio congeletur.  
Methodum satis facilem, & a clarissimo Boer-  
haave propositam sic exponit D. Sigaud de la  
Fond:

*Prenez de l'eau dont la température approche  
de celle de la congélation. Jetez-y un tiers de  
son poids de sel ammoniac, elle deviendra plus  
froide, & elle servira à refroidir une autre mas-  
se d'eau renfermée dans un vaisseau très-min-  
ce que vous plongerez dedans. Celle-ci étant refroi-  
dir, jetez-y pareillement du sel ammoniac pour  
la refroidir encore, & plongez dedans un autre  
vaisseau rempli d'eau, prise toujours à la tem-  
pérature la plus approchante qu'il sera possible  
de la glace. Vous parviendrez par ce moyen à  
vous procurer de l'eau plus froide que la gla-  
ce, & non glacée toutefois, par l'opposition  
que le sel mettra à sa congélation, & elle ser-  
vira*

vira à faire geler de l'eau ordinaire dont la température approchera aussi de celle de la glace, & renfermée comme précédemment dans un vaisseau mince, que vous plongerez dans l'eau plus froide que la glace. (*Dict. de Phys. tom. II. pag. 372.*)

Resp. 3. Ex quo D. Baumé Chymia peritissimus variis experimentis compertum habuit, quantum refrigerationis afferret liquorum vaporatio, promptius fieri potest glacies artificialis. Hanc metodum indicaverat consuetudo, quæ jam dudum apud navicularios (*les marins*) obtinuit. Ubi lagenam refrigerare volunt, eam pannis madidis circumfusam, ex malo (*mât*) navis suspendunt, ut celerius vaporetur pannorum humor. Mirum est quantum refrigerationis inde accipiat lagena. Hanc artem perfecit D. Baumé majusque frigus excitavit, liquorem adhibendo, qui facilius in vapores solvitur. Scilicet thermometri ampullam (*la boule*) panno qui æthere (*d'èther*) imbutus erat circumdedit; hujus vaporationem accelerando, frigus procreavit 40. graduum infra congelationis punctum. Si aqua substituatur liquori quo impleri solent thermometra, hæc facile in glaciem convertetur.

## SECTIO QUARTA.

### De Corporum duritie.

**E**A corpora dicuntur dura, quæ tactui nostro resistunt, & quorum partes difficile a se invicem disjunguntur. Undenam repetenda sit corporum durities statuere, magis arduum est, quam primo intuitu videtur. Dux potissimum sunt ea de re Philosophorum opiniones. Cum hujusmodi sint, quæ non omnino persuadeant, eas satis erit breviter exponere.

1. Newtoniani corporum duritiem ortam volunt ex mutua partium elementarium attractione, quæ in ipso contactu est efficacissima. Cum enim



enim varias, prout sibi opus est, attractionis leges affingant, eam dicunt ultra contactum sequi rationem inversam quadratorum distantiarum; (*les quarrés des distances*) in ipso autem contactu, vel in maxima ejus propinquitate, sequitur rationem inversam cuborum distantiarum; (*cubes des distances*) sed hujusmodi attractio, propter rationes jam expositas, non paucis displicet, & ab iis inter occultas qualitates rejicitur, quæ veterem Philosophiam deturparunt.

2. Physici non pauci corporum duritiem oriri putant a fluido subtilissimo, elementares corporum partes comprimente. Rem vero sic probant: Ad stabiliendam, inquiunt, nostram opinionem, tria requirantur & sufficiunt; primum, ut existat fluidum quoddam subtilissimum terrenis corporibus circumfusum; secundum, ut fluidum illud possit partes corporum elementares comprimere, & sibi invicem applicare; tertium, ut posita illa compressione, facile explicentur varia duritiei discrimina: atqui 1. existit fluidum subtilissimum corporibus terrenis circumfusum: ignis enim, magnetis, electricitatis phenomena, & varii effectus, qui post exhaustum aerem in machina pneumatica deprehenduntur, aliunde oriri nequeunt, quam a fluido quod aere longe sit subtilius.

2. Fluidum illud partes corporum elementares comprimere, sibi invicem applicare potest. Ita enim sibi contiguæ esse possunt, ut fluidum eas inter permeare nequeat: atqui hoc posito, secum invicem arcte compingentur a materia subtilissima, sicut duo marmora aeris ambientis compressione ita sibi mutuo junguntur, ut non nisi difficile possint dissociari. Si enim diametrum habeant trium circiter pollicum, adeo tenaciter sibi adherent, ut a se invicem non divellantur, etiamsi marmori inferiori appendatur pondus 84. librarum.

3. Posita materiæ subtilis compressione, facile explicantur varia duritiei discrimina, quæ  
in

in eo sita sunt, quod corpora sint alia aliis duriora. Ea scilicet quorum major erit densitas, quorum partes in latiori superficie sese tangent, ad figuramque planam magis accedent, iis, eorumque corporibus, quorum minor est densitas, quorum particulae in minori superficie sese contingunt, & a figura plana magis recedunt: quia scilicet quantitas contactus in prioribus major erit, ac proinde fluidi ambientis pressio efficacior; ergo, &c.

Si objicias materiam subtilem omnia pervadere corpora, ideoque non posse ipsis duritiem conferre, ita respondent: corporis duri particulae non concipiendae sunt veluti totidem insulae, quas undequaque circumcingat fluidum subtile. Plurimae enim ipsarum superficies ita sibi contingunt, ut inter eas aer subtilis interfluere nequeat. Quas autem superficies permeare non potest, vi sua comprimit, & secum invicem compingit, fere veluti si aquae objicias asserem (un-  
ais) multis foraminibus pertusum, partes inter quas non posset aqua interlabi, alias in alias impelleret. Eandem difficultatem ita solvit D. Nollet: *On répond d'une manière satisfaisante à cette objection, en disant que l'air subtil n'est admis qu'en partie dans les vuides des corps à la surface desquel il est appliqué, & qu'il agit du reste sur les parties solides, qui s'opposent à son passage, & qui deviennent autant de points d'appui. Tout ce qui en peut arriver, c'est que les corps les plus poreux échappent davantage à son action; & qu'il en résulte une moindre adhésion, ce qui est assez conforme à l'expérience: car des deux plaques de métal que j'avois préparées pour être jointes ensemble dans le vuide, j'en ai percé une de plusieurs trous, & à plusieurs fois, & j'ai remarqué que l'adhésion diminuoit à mesure que j'interrompois davantage la continuité de la surface.* (Tom. 2. page 461.)

Si ejusdem sententiae defensores sic urgeas: effectuum plane oppositorum eadem esse non potest.

est causa: porro, juxta vos, materia subtilis est fluiditatis causa; ergo non potest duritiem fluiditati oppositam efficere.

Ab ea difficultate ut sese expediant, ad distinctionem confugunt. Effectuum oppositorum, inquirunt, eadem non potest esse causa, si agat eodem modo, & in subjectum eadem ratione dispositum, id ultro concedimus; secus vero, pernegamus.

Porro, inquit, dum materia subtilis duritiem & fluiditatem procreat, neque eodem agit modo, neque in subjectum eadem ratione comparatum. Quando enim partes corporis exteriores magis premit, quam interiores concutit, tunc firmitatem aut duritiem gignit. Ubi vero intima pervadit corpora, eorumque particulas seorsim impellit, & quoquoersum exagitat, tunc liquiditatem generat. Quod ita exponit D. Nollet: *La solidité & la fluidité dépendent de la même cause. C'est l'air subtil qui fixe les parties d'une matière, lorsque sa pression extérieure excède la réaction qu'il fait au dedans; & c'est ce même fluide qui rend & entretient mobiles les parties d'un corps, en s'introduisant en elles en suffisante quantité. Plus il y a d'air subtil dans l'intérieur d'un corps, moins ce corps est dur; parce qu'alors les parties solides qui le composent, se touchent par moins de surface, & que la pression du dehors est plus soutenue par celle que le fluide transmet au dedans. Quand la cire, par exemple, s'ammollit sensiblement, c'est que l'air subtil dont elle est pénétrée, dilaté par la chaleur, dilate de même les espaces qu'il occupe; & comme ces espaces ne peuvent s'augmenter, que par l'écartement des parties solides qui les entourent, le contact de celles-ci devient plus rare, leurs jonctions moins exactes, leur cohérence moins forte.* (Tom. 2. pag. 465.)

## SCHOLIUM.

Ingeniosa quidem est hæc opinio, sed persuadendi vim non habet. Quis enim concipiat aurum, v. g. liquefactum, sub aureo machinæ pneumaticæ excipulo positum, unde extractus fuit aer, pristinam duritiem suam recuperare, quia elementares ipsius partes fluidi aere subtilioris pressione simul coalescunt? Cur scilicet, aere educto, non ejicitur alterum illud fluidum tenuissimum? Nonne quia aurei excipuli *poros* facile permeat? Quis vero intelligat auri duritiem oriri posse a fluidi pressione, intimos auri poros libere prævadentis? Ejusmodi enim fluidum auro internum cum externo communicaret, & in æquilibrio sese constitueret; non magis igitur elementares auri partes premeret, quam aere comprimerentur duo hemisphæria concava, si aer ipis interior cum exteriori communicaret.

## SECTIO QUINTA.

*De Fluiditate.*

**E**A corpora vocantur fluida, quorum partes a se invicem facile disjunguntur, tactui statim cedunt, & veluti sponte disfluunt, nisi ab aliqua vi externa retineantur. Quænam sit fluiditatis causa divinare student Physici, variisque indulgent conjecturis.

1. Eam repetunt quidam Newtoniani ex virtute quadam repellente (*répulsive*) quam variis fluidorum particulis inesse comminiscuntur. Quando hæc virtus, inquiunt, attractioni prævalet, tunc mollia fieri corpora intelliguntur; imo & liquida, si virtus repulsans longe superet vim attrahentem, qua indurescunt corpora. Hinc igitur attrahendi facultatem, illinc repellendi virtutem materiæ partibus affingunt.

Quis

Quis autem adeo sit acutus, ut facultates ita oppositas in iisdem corporis particulis conciliet?

2. Alii corporum fluiditatem in eo sitam putant, quod eorum particulae sint sphaericae, vel ad figuram sphaericam accedentes. Ea est inquit, fluidorum natura, ut circumquaque diffluant, nisi a corporibus circumstantibus retineantur: atqui ex hypothese quod fluidorum partes sint sphaericae, facile est intelligere, cur quoquoaversum dilabantur, ubi nihil impedimenti occurrit: tunc enim inter eorum particulas minima erit cohesio, quia nonnisi in paucioribus punctis sese contingent. Quo posito, materia subtilis corporum fluidorum partes minus efficaciter comprimit, sive quia defunt fulcra quibus innitatur pressio exterior, sive quia tunc aer subtilis interior, externae pressioni resistit eamque elidit; liquidorum igitur partes non possunt esse sphaericae, quin minus inter se cohaereant, ideoque debent quaquoaversum effluere, nisi vi quadam externa coerceantur. Illorum enim particulae supra se invicem facile volvi possunt, & proprio pondere huc & illuc dilabi; eodem fere modo, ac si vas globulis eburneis repletum subito frangeretur, illi statim globuli circumquaque dispergerentur; ergo eo ipso quod liquidorum particulae sint sphaericae, facile intelligitur, cur quaquoaversum diffluant, ubi sibi permittuntur.

Sphaericas esse fluidorum particulas inde colligi potest, quod liquidi crassioris partes, quae ope microscopii conspici queunt, figuram habeant sphaericam, ut observari potest in lacte, sanguine, oleis & mercurio. D. Derham expendens quam formam induant vapores, iuvante microscopio deprehendit, eos nihil aliud esse, quam tenues globulos, sphaericos, qui guttulas efficere potuissent, cum ergo exploratum sit, fluida crassiora ex globulis constare, nonne per analogiam concludere licet, eandem particulis fluidorum vel subtiliorum figuram inesse?

Ita

Ita D. Briffon. (*Diſt. de Phyſ. tom. 1. pag. 619.*)

2. Multi Cartefiani fluiditatem in particularum infenſibilium continuo & inteſtino motu præſertim conſtitutam volunt. Hanc autem opinionem cum experientia conciliare non facile eſt. Corpufcula enim quæ in aqua ſtagnante ſuſpenduntur, eundem conſtanter locum retinent, quamdiu vas externa quadam cauſa non movetur. Si vero fluidi particulæ irrequieto interiorique motu ſemper agitantur, nonne motus ille in iſta corpufcula transmitteretur? Numquid in eodem loco conquieſcerent?

Quæres 1. cur corpora quædam nonnullis in fluidis diſſolvantur, non vero in aliis.

Reſp. Id oritur ex particularum fluidi figura, mole, rigiditate, comparate ad partes corporis duri: ipſiusque poros. Hinc 1. ſaccharum in ſpiritu vini vix diſſolvitur, dum illud facile diſſolvit aqua communis, præſertim ſi calida ſit. Aqua ſcilicet partes habet craſſiores quam ſpiritus vini, ideoque ſacchari poros ſubeundo, illius partes facilius diſſociat. Hinc 2. aqua fortis aurum non diſſolvit, bene vero cetera metalla, vel quia ipſius particulæ ea rigiditate carent, qua valeat partes auri inter ſe tenaciter cohærentes ſuccutere, earumque nexum diſrumpere; vel quia tenuiores ſunt aquæ fortis partes, quam ut auri meatus accurate repleant, & proinde cuneorum vices gerere nequeunt. Quamobrem, ſi cum aqua forti permisceantur ſalis ammoniaci particulæ, tunc iis, veluti cuſpidibus, armata, aurum diſſolvere poteſt, & dicitur *aqua regalis*. Quæ in eo tantum ab aqua forti diſcrepat, quod admixtas ſibi habeat partes ſalinas.

Quæres 2. cur aqua poſt diſſolutam quamdam ſalis copiam, aliud diſſolvere non poſſit, quamvis eadem certam ſacchari quantitatem adhuc diſſolvat.

Reſp. Aqua partes in ſalis particulas incurrendo, & cum iis luſtando hebeſcunt. Obtufiores

res factæ, intra salium poros jam nequeunt viam sibi aperire. Quapropter eadem aqua nonnisi certam salium quantitatem valet dissolvere. Quamvis autem ipsius partes in solvendis salibus hebetatæ fuerint, possunt tamen latiores sacchari meatus prevadere, hujus particulas dividere, ideoque saccharum dissolvere.

## CAPUT II.

*De qualitate Corporum sensibili qua  
gustum afficit.*

**G**ustus est veluti explorator quidam, in ea corporis parte collocatus, qua iter cibis patet, ut quæ salubria sunt aut perniciofa discernat. Quæ jucunde sapiunt admittit, quæ ingrate, rejicit. Quæ in re divinam providentiam sic miratur Philosophus christianus: *La maniere dont Dieu nous a disposés, pour nous rendre agréables les alimens, & la boisson, qui sont les deux soutiens de notre vie fragile, est admirable. Si nous n'eussions senti le besoin de manger, & trouvé du plaisir à le satisfaire, le soin de vivre eût été à charge. S'il n'étoit question que de remplir un devoir, lorsqu'on se met à table, les indigestions ne seroient pas communes; & on verroit peut-être bien des gens périr d'inanition. L'auteur de la nature a prévu ce désordre, & pour le prévenir, il a mis en nous des motifs plus puissans que notre paresse. L'estomac à jeun nous sollicite par la faim, & par la soif, & la bouche qui fournit à ces deux appétits, ce dédommagement par les saveurs qu'elle goûte, de la peine qu'elle prend pour préparer les alimens pour la digestion. Le goût consiste donc à sentir l'impression des matieres savoureuses, à les admettre; ou à les rejeter, suivant les idées qu'elles font naître, & les jugemens qui s'ensuivent.* (Nolles, tom. 1. pag. 159.)

Sapores ad gustus organum pertinent; in quo  
gene-

generatim consistant ex parte corporis sapidi ,  
aperiet sequens.

## PROPOSITIO.

*Sapor ex parte corporis sapidi consistit in illius  
particularum motu , figura , aliisque affectio-  
nibus mechanicis .*

Prob. 1. **S**apor consistit in particularum cor-  
poris sapidi motu , ut enim corpo-  
ra sapida in nobis sensum excitent , in gustus  
organum agant necesse est : atqui id efficere ne-  
queunt , quin moveantur ipsorum partes insen-  
sibiles . Sublato quippe motu , non poterunt gu-  
stus organi integumentum penetrare , ejusque  
fibras concutere , pungere , vellicare , radere ,  
ritillare ; quod tamen ab iis fieri manifeste per-  
cipimus . Hinc cibos dentibus atterere , & sali-  
va diluere solemus , ut vi solventis hujus liquo-  
ris sapida corpuscula e cibis extrahantur , &  
cum ipsa saliva ad organi fibras deferantur . Hinc  
etiam aegroti , quorum lingua febris usu exa-  
ruit , nullo sapore afficiuntur , quia deest saliva  
cujus opem agitari possint corporum saporum par-  
ticulae ; ergo 1. sapor ex parte corporis sapi-  
di pendet ex illius partium insensibilium agi-  
tatione .

2. Plurimum etiam pendet ex corpusculorum  
saporum figura , aliisque affectionibus mecha-  
nicis ; siquidem ; iis mutatis , novus excitatur  
sapor : ex. gr. carnes coctae aliam habent sapo-  
rem , quam incoctae , quia ignis agitatio in par-  
tium carnis dispositionem & figuram aliquid  
mutationis inducit . Sic pariter fructibus ma-  
turius alius inest sapor , quam ubi nondum ma-  
turerunt ; id vero ex eo contingit , quod solis  
calor novam illorum partibus figuram , vel  
texturam asserat . Fructus enim inter mature-  
scendum ex acidis fiunt dulce , quia ipsorum  
par-



particulæ nimium acuminatæ, per continuum solis ardorem atteruntur, obtusisque mucronibus desinunt linguam ingratis laceßere & pun- gere.

Eo spectat experimentum D. Rohault : vas scilicet in fundo perforetur, panno quodam foramen obducas, & tenuissimis arenulis vas impleatur. Si denique vinum insigniter rubrum infuderis, tunc arenulas trajiciens, & guttatim per foramen inferius decidens, suum colorem exuit, & saporem sic amittit, ut evadat liquor insipidus. Undenam vero tam subita nascitur mutatio. Nonne ex eo quod vini particulæ per sinuosos & angustos arenularum anfractus percolatæ, novam susceperint figuram, & dispositionem mechanicam? Fiunt nimium ita obtusæ, ut linguam, veluti antea, afficere non valeant; ergo 2. &c.

Hæc generatim de saporibus absque errandi periculo dici posse videntur; singulorum enim rationem specialem asserre, nulli adhuc mortali-um concessum est.

Quæres 1. cur eadem corpora diversos in di- versis hominibus saporibus excitent.

Resp. Quia linguæ & palati fibræ in iis ho- minibus eodem modo non sunt dispositæ. Quin- etiam idem homo varie affectus, diversos oc- casione ejusdem cibi saporibus experitur: sic ho- mini febre laboranti amarus videtur cibus, quem sanus dulcem percipiebat. Cui mutationi locum præbet bilis, vel alius humor viscosus, quo lingua est imbuta. Cum enim tunc alimen- ta, in illud gustus organum immediate non a- gant, sed per interpositos illos humores, pe- rinde se habent, ac si ingratis saporis liquores continerent.

Quæres 2. cur vinum vix gustari possit, cum aliquid pingue comestum fuit; secus vero, si quid salis prægustatum fuerit.

Resp. Illud inde fit, quod corpora viscosa membranarum linguæ poros occludant, quas i- cco

deo vix penetrant vini particulae; id vero non accidit cum aliquid salis comestum fuit, v. g. caseus.

Quæres 3. undenam oriatur congenitum erga nonnullas dapes odium.

Resp. Id oritur ex eo quod infantes in utero materno inclusi, injucundam sensationem, quorundam ciborum occasione, experti fuerint. Cum enim cibi illi maternam linguam sic afficerent, ut sensus ingratus in matre excitaretur, & cum similes sint in matre & foetu motus, debuit injucundus saporis sensus in ipsam foetum transmitti. Quamobrem quoties occurrit cibus, ejus particulae saporem similem excitant, tunc naturæ quodam instinctu, illum, tanquam ingratum, horremus & refugimus.

### C A P U T III.

*De sensibili Corporum qualitate quæ odoratus organum afficit.*

**Q**ualitas sensibilis quæ nunc agimus, odor dicitur; ille vero ex parte corporis odoriferi nihil aliud est, quam ipsius affectio quædam, qua idoneum sit adeo olfactus organum certo modo commovendum. Circa causam odorum mechanicam satis concordantes sunt Physici recentiores, cum quibus sit

### P R O P O S I T I O.

*Odores consistunt in effluvio partium sulphurearum & salinarum, quæ sunt tenuissima.*

Prob. 1. **C**orpus externum non potest sensum odoris excitare, quin olfactus organum, idest, nervosæ narium fibras commoveat: atqui id efficere non potest, nisi per quasdam particulas ex seipso effluentes; siquidem corpora odorifera, ut plurimum, a nostris naribus

ribus remota sunt; ergo 1. odores consistunt in quarundam corporis externi partium effluvio.

2. Partes a corpore odorifero emissæ sulphureæ sunt & salinæ. Experientia enim constat ea corpora uberius effundere odorem, in quibus major est sulphuris & salium copia, qualia sunt pulvis pyrius, thus, unguenta, &c.

3. Hujusmodi partes sunt tenuissimæ; siquidem per longum temporis spatium a corpore odorifero erumpunt, absque sensibili suæ molis suiue ponderis imminutione. Id patet ex grano molchi, quod suum odorem plurimos per annos circumquaque diffundit, citra conspicuum molis dispendium; ergo 3. &c.

Hinc satis feliciter explicantur præcipua odorum phænomena. 1. Corpora odorifera, v. g. flores mane vix olent, cum adhuc rore perfunduntur.

Propter occlusos enim ipsorum poros, spiritus odoriferi intra florum claustra captivi quiescunt, ideoque nullum pene flores spirant odorem: ubi vero radiis solaribus ros exsiccatur, tunc florum meatus aperiuntur, spiritus odoriferi intus delitescentes amico calore agitantur, sicque e floribus avulsi, longe lateque per aëra sparguntur, & odore plurimo nares demulcent.

2. Flores hortorum per æstatem, serotino tempore magis olent, quam dum fervet solis calor.

Partes florum odoriferæ, per atmosphæram sparsæ & fluitantes, organum eo vividius afficiunt, quo majori numero in illud agunt. Porro per æstatem, serotino tempore, & nocte adventante, aer paululum refrigerat, eoque frigore magis densatur; illius ergo partes ad sese invicem proprius accedunt, & proinde magis colliguntur exhalationes in eo dispersæ; ubi igitur tunc aer spiritu ducitur, particulas odoriferas majori numero ad organum defert.

3. Hieme minus olent corpora, quam aliis anni tempestatibus.

Ratio est, quod per hiemem corporum odoratorum meatus frigore nimio contrahantur, ac proinde omnes fere spiritus odoriferi maneat involuti & impediti, sicque rariores sint ipsorum exhalationes: Contrarium propter rationem oppositam contingere debet in aliis anni tempestatibus.

4. Corpora dura quæ ex se nullum afflant odorem, videntur tamen odorata post frictionem, unctionem aut fermentationem.

Illud oritur ex eo quod corpora illa, nisi veluti sollicitentur, nullum spargant odorem, quia nullæ particulae sponte sua ex iis effluunt propter ipsarum soliditatem & cohesionem: post vehementem vero frictionem fiunt odorata, quia ex iis corporibus per attritionem variae divelluntur particulae, quæ per aera diffusa nares subeunt, nervosque olfactorios commovent: Idem dicas de unctione & fermentatione, quibus partes corporum a se invicem disjungi manifestum est, hinc & inde avolare, & una cum halitu in nares adduci.

5. Nonnulla sunt corpora quæ, dum putrescunt, jucundius olent. Eorum scilicet putrefactione, spiritus crassiores, qui olfactus organum lædebant, magis & magis attenuantur; in partes autem tenuiores comminuti, narium fibras blandius & suavius titillant.

6. Quædam, ut plurimum, requiritur corporum ab olfactus organo distantia, ut gratius oleant. Flores, ex. g. suaviorem spirant odorem, si paululum a naribus nostris removeantur, quam ubi iis propius admoventur.

Illius discriminis causa est, quia ubi flores naribus sunt propiores, non subtiles tantum & magis volatiles eorum partes, at simul & crassiores in organum irruunt: Contra vero, ubi a corporibus odoriferis paululum distamus, non nisi tenuiores eorum particulas nares excipiunt, quia

quia crassiores, post decursum breve spatium, proprio pondere subsidunt; hoc igitur in situ suaviorem, quam in altero, sensum odoris experimur.

Objic. Si odores in partium effluvio consisterent, corpora odorifera brevi tota dissiparentur, ob continuam corpusculorum emissionem; atqui tamen res aliter evenit, ut patet in aromatibus; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. Ex corporibus enim odoriferis, alia per succum nutritium resarciunt partium avolantium jacturam, ut flores vundum excisi; alia vero imminuuntur quidem, quia non habent alimentum; at sensum sine sensu accidit istud decrementum, ut aromatibus contingit, Multæ enim corporis odoriferi partes effluere possunt, quamvis illius moles sensibili modo non decreseat. Innumeris quippe experimentis certum est dividi posse corpus in partes tenuissimas, & numero prope infinitas, quæ singulæ naturam totius retineant. Sic granum moschi distinctissime particulas graviter olentes emittit, licet ejus volumen ac pondus idem videantur.

Instab. Corpora odorifera, qualis est rosa, continuo eam particularum copiam emittunt, quæ spatium replent iis corporibus millies majus; ergo in nostra hypotesi deberent brevi tota dissipari.

Resp. Neg. ant. Quia non opus est ut corpuscula odorifera totum illud spatium accurate repleant. Ad explicandam enim odoris rosæ diffusionem, satis est ut quædam ipsius particule dicantur occurrere, ubicumque aer spirando ducitur, minimeque necesse est tota hæc spatia iis omnino repleri: jam vero credibile est corpuscula odorifera, quæ intra rosam exiguum locum occupant, eadem si dispergantur, in spatium millies amplius posse excurrere, sicut fumus e thuris frustulo erumpens, in spatium millies seipso majus diffunditur.

Quæres cur tantula corpuscula tantam vim habeant;

beant, ut cerebrum quandoque perturbent, vertiginem capitis & animi deliquium procreent.

Resp. Oritur phænomenum illud ex tenuitate fibrarum, quibus constant nervi olfactorii, quæ tantæ subtilitatis esse possunt, ut a corpore vel maxime exili vehementius commoveantur. Variis enim experimentis compertum est, particulam molis admodum exiguæ, aliquando corpus humanum ita conturbare, ut naturalem ipsius dispositionem prorsus subvertat, ideoque mortem afferat. Sunt quippe venena adeo efficacia, ut si quis horum vel minimam hauserit portiunculam, statim sit interiturus.

## C A P U T IV.

*De qualitate Corporum sensibili, quæ auditus organum afficit, sive de Sono.*

**Q**UATUOR articulis continetur quidquid de sono dicturi sumus. 1. Enim exponemus in quo consistat sonus ex parte corporum spectatus, & quo medio ad aures nostras perveniat; 2. quænam sint illius proprietates; 3. quænam effectus; 4. quomodo formetur vox humana.

### ARTICULUS PRIMUS.

*In quo consistat sonus ex parte corporum spectatus, & quo medio ad aures nostras perveniat.*

**C**UM sæpius recurrat mentio motus tremuli, reciproci, sive vibrationis, prænotandum est huiusmodi motum eum esse, quo corpus elasticum comprimitur, & deinde priorem in statum restituitur.

## PROPOSITIO I.

*Sonus ex parte corporis spectatus consistit in ejus partium insensibilium motu tremulo, reciproco, sive vibrationis.*

Prob. **S**ONUS ex parte corporis spectatus, in ejus partium insensibilium motu tremulo, seu vibrationis consistit, si nullus audiat sonus, nisi quando in corpore externo excitatur ejusmodi motus: atqui res ita se habet. Si enim duo forcipis brachia simul jungantur, & deinde sibi permittantur, in utroque frequentes erunt itus & reditus, variaeque vibrationes, & tamen nullus audietur sonus; pariter si campana jactetur tantum in aere, nec alio corpore solido feriatur, nullum edit sonum: atqui illud oritur ex eo quod neque in forcipis, neque in campanae particulis insensibilibus excitetur motus tremulus. Denique si plectrum materia quadam pingui illitum fuerit, necquicquam instrumenti musici fides sollicitabis, nullum ex his sonum elicies, quia partes chordarum insensibiles motu tremulo non agitantur.

Si vero tum forcipem, tum campanam malleo percutias, tunc sonum edent, quia scilicet partes forcipis & campanae insensibiles illa percussione comprimuntur; & compressae resiliunt per suam vim elasticam, ita ut in his varii sint itus & reditus, variaeque vibrationes, quarum frequentia sonum efficiat. Quod adeo verum est, ut si pulsatae campanae manus applicueris, in ea fremitum quemdam deprehendas.

Pariter ubi instrumenti musici fides plectro pice obducto exagitantur, tunc resonant; quia scilicet plectri asperitate, & quasi denticulis impeditae, hinc & inde commoventur, modo deprimuntur, modo attolluntur: atqui id fieri non potest, quin partes fidium insensibiles sic vellicatae, motum tremulum recipiant. Cum

igitur, posito illo partium insensibilium motu tremulo, fiat sonus; & sublato, tollatur, planum est naturam soni in illo particularum motu vel fremitu esse constitutam.

Eam ob causam subito desinet campanæ sonus, si ipsi manum, vel aliud corpus applicueris, quia tunc interrumpuntur ipsius partium vibrationes. Quam in rem sic notat D. Nollet: *C'est pour cela que les timbres des horloges, lorsqu'ils sont couverts de neige, ne sonnent que sourdement; ainsi que les tambours que l'on couvre d'étoffe dans des cérémonies lugubres. Par la même raison, une cloche fendue ne peut continuer ses vibrations, parce que les bords de la fente se heurtent réciproquement, & font, l'un à l'égard de l'autre, ce que pourroit faire un corps étranger qui toucheroit la cloche.... On peut remarquer encore que les Horlogers ont toujours soin que les marteaux des timbres soient relevés subitement après le coup par un ressort, afin que le même corps qui a excité le son, ne l'altère pas, en restant trop long-temps appliqué au corps sonore.* (Leçons de Phys. tom. 3. pag. 424.

Cum manifestum sit corpus sonorum, v. g. campanam, vel instrumentum musicum, per se & proxime auditus organum non afficere, sed per aliud corpus interjectum, iam statuendum est, quodnam sit illud corpus, cujus beneficio sonus ad aures nostras deferatur. Itaque sit

## PROPOSITIO II.

*Aer est vehiculum soni.*

Prob. **I**llud est sono vehiculum, quo posito, auditur, imminuto minuitur, & quo sublato tollitur sonus: atqui posito aere, &c. Si enim tintinnabulum in machinæ pneumaticæ excipulo ita collocetur, ut illud non tangat, ubi malleo percutitur, antequam eductus fuerit aer, auditur sonus; qua proportionem aer minuitur, ea-



eadem sonus fit debilior; ita ut si aer prorsus exhauriretur, tunc omnino desineret sonus.

PROPOSITIO III.

*Sonus ab aere non diffunditur per motum undulationis.*

Prob. **M**OTUS undulationis ille est qui in aqua stagnante excitatur, cum in eam lapis projicitur: atqui per huiusmodi motum sonus ab aere non diffunditur. 1. Quia ubi campana sine malleo liberatur & agitur, motum undulationis in aere excitat: atqui tamen nullus auditur sonus. 2. Quia unica corporis sonori percussione, unus efficitur sonus: atqui tamen plures alii post alios soni deberent audiri, quia multae sibi succederent undulationes, ut contingit in aqua ex unico lapidis ictu. 3. Quia quo major est lapidis in aquam projecti velocitas, eo celeriores sunt undulationes, sicque sonus modo promptius, modo lentius propagaretur: atqui illud experientiae adversatur; ergo, &c.

PROPOSITIO IV.

*Sonus ad aures nostras ab aere deferretur per motum ipsius tremulum seu vibrationis.*

Prob. **R**ES ita se habet si aer motum tremulum a corpore sonoro recipiat, eumque ad organum nostrum transmittat: atqui 1. aer recipit a corpore sonoro motum tremulum, seu vibrationis. Cum enim aer sit elasticus, & corpus sonorum proxime circumvolvatur, non potest ab ipso motum tremulum non accipere. Ubi scilicet corpus sonum edit, v. g. fides instrumenti musici, quid evenit? corporis illius partes nunc attolluntur, nunc deprimuntur, ubi attolluntur, aeris proxime ambientis particulas comprimunt;

ubi vero deprimuntur, aeris partes comprimere desinunt, quæ idcirco resiliunt, priorem in statum sese resituent: atqui motus ille quo partes aeris alternis vicibus comprimuntur, & sese resituant, nihil aliud est quam motus tremulus, reciprocos, seu vibrationis; ergo 1. aer corpori sonoro circumfus, ab ipso motum tremulum recipit.

2. Motum illum ad aures usque nostras transmittit, quia scilicet aeris partes a corpore sonoro immediate compressæ, aliis vicinis & istæ subsequentibus, dum sese resituant, motum a corpore sonoro acceptum communicant. Aeris enim particulæ inter corpus sonorum & aures nostras interpositæ, se habent ut longa globulorum eburneorum series, qui in linea recta disponuntur: atqui ubi unus globulus incurrit in primum hujus seriei globulum, totum ei motum suum imperat; motus ille a primo globulo in secundum, a secundo in tertium transmittitur, sicque deinceps usque ad ultimum; ergo similiter aeris partes a corpore sonoro immediate compressæ, motum ab eo receptum partibus vicinis communicant, istæ vero sequentibus, donec ad aures usque nostras traducatur: ergo 2. &c. aliunde, &c.; ergo, &c.

Aerem esse soni, seu vibrationum corporis sonori, quasi vectorem, hoc experimento confirmari potest. duo instrumenta musica ita collocentur, ut longiori non dissent intervallo. Tunc unius fides tendantur ad unisonum cum fidibus alterius respondentibus. Quo peracto, si una e prioris instrumenti fidibus pulsatur, statim chorda posterioris quæ chordæ pulsatæ est consona, commoveretur, fremit & immurmurat. Hoc phenomenon aliunde oriri non potest, nisi ex eo quod chorda prioris instrumenti motu tremulo agitata, suas aeri ambienti vibrationes communicet, quas aer vicissim transmittit in chordam alterius instrumenti consonam. Ceteræ vero utriusque instrumenti fides non resonant, sed omnino silens,

silent, quia cum chorda pulsata ad unisonum non tenduntur.

Eandem ob causam si duos scyphos vitreos efficias consonos, aliquem in iis liquorem effundendo, & alterutrus oras digito velociter in orbem circumacto premas, liquor in utroque crispabitur & subsiliet. Si aciculam inflexam unius scyphi margini aptaveris, dum alterius margines digito celeriter moto presseris, tunc aciculam priori scypho impositam conspicias veluti ad numeros saltitantem. Ratio est, quod in scyphi particulis repentina digiti pressio motum tremulum exciter, qui in aerem contiguum transmittitur; aer vero iste simili vibratione commovet alterum scyphum priori consonum.

Alterum ejusdem veritatis argumentum suppeditat *Grimaldi*. Aeris, inquit, quem ad magnam usque distantiam agitatur corpus sonorum, commotio in eum usum adhibetur interdum, ut ad hostium inopinato incursum præcaveatur. Digitale scilicet (*un dé à coudre*) supra tympani (*tambour*) pellem ponitur. Accedente autem hoste; equitatus præsertim strepitus in aere succussus excitat, qui sensim ad tympanum usque propagatur. Tunc digitale videas subsilire supra pellem, cujus in fibris quidam fremitus deprehenditur.

### *Solvuntur objecta.*

Obj. 1. Si sonus ex parte mediæ consisteret in motu aeris tremulo, necesse foret ut corpus sonorum totum aerem agitarer, qui continetur in locis in quibus auditur sonus: atqui illud repugnat: quis enim crediderit parvulum tintinnabulum partium suarum fremitu aerem in tota urbe expansum commovere? ergo, &c.

Resp. Dist. maj. Totum aerem agitarer, ubicumque auditur sonus, motu vibrationis, conc.; motu translationis, neg.

Partes corporis sonori non valent quidem aerem sibi contiguum ita commovere, ut eum ad

aures nostras transferant; sed possunt aerem sibi proximum comprimere, & iste sese restituendo eandem pressionem in aerem subsequenter traducere, sicque deinceps, ut contingere diximus pluribus globulis eburneis sibi contiguis, & in linea recta dispositis; quorum primas si percutiatur, motus tempore brevissimo a primo ad secundum, a secundo ad tertium, tandemque ad ultimum pervenit.

Obij. 2. Sonus non potest consistere ex parte medii in motu aeris tremulo, quin eo lentius propagetur, quo magis a corpore sonoro distat: atqui tamen experientia compertum est, visum eadem semper celeritate propagari; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. Sonus enim, licet a corpore sonoro remotior, eadem fertur celeritate, quia partes aeris a corpore sonoro immediate compressæ, totam suam velocitatem acceptam, partibus vicinis communicant, illæ vero subsequentibus. Sic globus eburneus in alium æqualem impingens, huic omnem suam velocitatem impertit; si vero secundus ille globulus in tertium æqualem incurrat, pariter in eum quidquid habet velocitatis transmittit. Id constat legibus quas sequuntur corpora elastica, dum sese collidunt. Ostendimus enim, si corpus elasticum in aliud quiescens, & æquale incidat, tunc corpus incurrens stare immotum, aliud vero cum tota prioris velocitate moveri.

Inst. 1. Si aeris partes a corpore sonoro compressæ, aliis vicinis, & illæ aliis suam velocitatem communicarent, eadem esset vis soni, sive prope corpus sonorum, sive procul ab eo: atqui eadem non est; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. Vis enim soni plurimum pendet a multitudine partium aeris, quæ motu tremulo agitantur; eo quippe vividius aures nostras afficiunt, quo majori sunt numero. Porro quo longius recedimus a corpore sonoro, eo debilior est vis soni; sed tunc partium aeris com-

commoti numerus decrefcit, id. eft, pauciores funt radii fonori, qui organum concutiant. Sonus quippe a centro verfus circumferentiam, five in orbem, diffunditur, radii autem eo funt a fe invicem difjunctiores, quo longius a centro protenduntur.

Instab. 2. Aeris partes totam suam velocitatem vicinis, & istis aliis sequentibus communicare non possunt, quin sonus in infinitum diffundatur: atqui tamen res aliter se habet; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. In aere enim multa fluctuant corpuscula mollia, v. g. vapores, exhalationes, quibus transmitti non potest motus tremulus. Aliunde variae sunt in aere agitationes illi motui oppositae. Hinc recte explicatur, cur multo remissior sit campanarum sonus, quando caelum est nimbofum, quam ubi serenum. Caelo enim sereno, vapores hinc & inde disperguntur; contra vero, cum caelum nubibus obducitur, vapores & exhalationes colliguntur, in molemque sensibilem coalescunt, quae corporis sonori impressionem minuit, & tandem extinguit.

Obj. 3. Si sonus consisteret in motu aeris tremulo; velocius propagaretur, cum vehementior esset, quam ubi debilior: atqui tamen sonus tam vehementior, tum debilior, eadem velocitate diffunditur; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. Aeris enim vibrationes, in quibus situs est sonus, ex parte medii, eodem tempore absolvuntur; five intensior, five remissior sit sonus. Testatur quippe experientia vibrationes ejusdem chordae eodem confici tempore, five parum, five multum deprimatur chorda, five parvae, five magnae sint ejus vibrationes: atqui partes aeris ante corporis sonori actionem, sunt aequaliter tensae; ergo intra idem tempus suas peragunt vibrationes.

Inst. Aeris vibrationes sunt vegetiores initio, quam in fine propagationis; ergo non possunt eodem tempore absolvi.

Resp. Neg. conseq. Vibrationis enim nomine intelligitur motus compressionis & restitutionis: atqui motus ille eodem sit tempore, sive fortior, sive debilior sit vibratio. Namque ubi vergitior est, aeris particulae magis comprimuntur, proindeque majus habent spatium percurrendum in compressione & restitutione; contra vero cum remissior est vibratio, aeris particulae minus comprimuntur, ideoque minus spatium describunt in compressione & restitutione; omnia igitur compensantur, & proinde intra idem tempus fieri debent aeris vibrationes, tum fortiores, tum debiliores.

Quæres 1. utrum aqua sit etiam soni vehiculum.

Resp. Sonum per aquam transmitti. Experimentis enim constat tinninabuli sub excipulo aquis immerso sonum audiri: certum est etiam ad aures hominis in aquis immersis pervenire tum sonos in aere libero editos, tum voces colloquentium. In Diario enim Doctorum (*Journal des Savans*) ad annum 1678, legitur, cum nautes quædam submersæ fuissent in portu (*du Cap d'Agues*), in eum locum descendisse urinatores (*des Plongeurs*) ut quidquid argenti ibi invenire possent colligerent; testati sunt a se auditum fuisse, quamvis confuse, eorum vocem qui in aere libero supra aquæ superficiem loquebantur. Id etiam D. Arderon similibus experimentis in Anglia confirmavit. Illius quippe jussu, tres homines in aquam se immerferunt ad duorum pedum altitudinem; ipse vero in littore constitutus eos contenta voce alloquitur; homines isti caput ex aquis afferentes, quidquid ipsis dixerat D. Arderon repetunt; sed contendebant eum depressa voce locutum fuisse. In aquam cum sese iterum demisissent ad duodecim pedum altitudinem, dispositum est tormentum bellicum, cujus fragorem ad suas aures pervenisse affirmarunt. (*N. 486. des Transact. philosoph.*)

Quæ omnia cum D. Nollet observationibus opti-

optime consentiunt. Sic enim narrat: Non semel in aquam placidam me plus minusve immergi, ibique distincte quoslibet, etiam vocis humanæ sonos audiebam: sed isti soni ad aures meas non deveniebant, nisi multum fracti & debilitati; quia scilicet aquæ partēs, utpote longe minus flexibiles quàm aeris particule, nec ita amplas, nec ita diuturnas vibrationes efficere possunt. Quod autem magis miraberis, hæc sonorum imminutio fere tota contingit in ipso aeris in aquam transitu: sive enim ad trium pedum, sive ad trium pollicum altitudinem demersus, eadem pene facilitate sonos percipiebam, (*Leçons de Phys. tom. 3.*)

Dices 1. Sonus intra aquam non transmittitur, nisi interventu aeris intra aquæ particulas disseminati; ergo nihil probant præfata experimenta.

Resp. difficultatem hanc penitus fuisse a D. Nollet dissolutam. Aquam enim adhibuit aere, quantum possibile est, expurgatam; nullum tamen discrimen deprehendit inter vim soni in ea aqua, & vim soni in simili aquæ communis massa excitati: atqui certe aliquid discriminis in illius soni efficacia animadvertisset, si ejus in aquam transmissio esset effectus aeris intra aquæ particulas disseminati: pauculus enim aer qui superest in aqua unde ope machinæ pneumaticæ exhaustus fuit, id totum præstare non potest, quod efficeret integra aeris quantitas quæ in aqua vulgo continetur.

Dices 2. Aquam vi elasticæ destitutam esse, nec comprimi, experimentis probarunt Academici Florentini; ergo soni vehiculum esse non potest.

Resp. Neg. ant. Aquam vis elasticæ expertem esse, nec posse comprimi ideo statunt quidam Physici, quia liquores, aquam, v. g. ad volumen, oculo judice, minus redigere non potuerunt Academici Florentini; id vero perperam concluditur. 1. Quia potest liquor comprimi, quamvis ipsius voluminis imminutio oculos effugiat. Fle-

si etiam potest ut aliqua sit comprimendi ratio, licet eam nondum assecuti fuerint Physici. 2. Quia particulæ ex quibus constant fluida, poris non omnino carent, nullum quippe est corpus prorsus densum; singulæ igitur fluidi particulæ possunt tantillum comprimi; ergo & totum, ex iis constatum.

Quæres 2. An corpora etiam solida possint sonum transmittere.

Resp. Rem ita esse experimentis probat D. Nollet. (Tom. 3. *Lectionum physicarum*, pag. 413. & 416.) Pourquoi l'expérience du timbre ou d'une sonnette dans le vuide, ne réussit-elle pas au gré de ceux qui la font, quand il n'ont pas soin d'isoler le corps sonore, ou d'empêcher qu'il ne touche immédiatement la platine, le récipient, ou quelqu'autre corps dur qui communique au dehors? c'est ce point parce que le son se transmet par les corps solides, qui ont communication d'une part avec le timbre, & de l'autre avec l'air extérieur.

Puisque le son se transmet par le corps solides, on ne doit plus être aussi surpris d'un fait qui amuse les enfans, & qui intéresse l'attention des personnes les plus sérieuses; c'est d'entendre distinctement le choc d'une épingle contre l'extrémité d'une longue poutre, lorsqu'on a l'oreille à l'autre bout. Car, à cause de la continuité des parties, ce choc est rendu à l'air qui touche le bout opposé de la pièce de bois; il est cependant toujours bien singulier que le bruit perde si peu de sa force pour parvenir à une si grande distance, tandis qu'à peine peut-il être entendu à travers l'épaisseur de la même poutre; c'est apparemment parce que les fibres longitudinales du bois sont moins interrompues par leur porosité, que ne l'est l'assemblage de ces mêmes fibres, qui fait l'épaisseur de la pièce.



## ARTICULUS II.

*De Soni proprietatibus.*

**D**UÆ sunt præcipuæ soni proprietates, illius nempe propagatio & reflexio, de quibus seorsim differendum.

## PARAGRAPHUS I.

*De Soni propagatione.*

**Q**UÆRES I. Quanta velocitate sonus propagatur.

Resp. Cum de soni velocitate discrepant Physicorum sententiæ, eam ut accurate definirent, DD. de Turi, Maraldi & de la Caille, hortatu regię Scientiarum Academiæ, multa tentarunt experimenta. Ex iis autem compertum fuit sonum, intra unum minutum secundum, 173. sexpedas seu 1038. pedes Parisienses percurrere, sive per diem, sive per noctem, sive sereno, sive pluvio tempore.

Hinc ope soni cognosci potest locorum vel inaccessorum distantia. Quod ut facilius intelligatur, observandum est lumen tanta celeritate diffundi, ut exiguis in distantis, aliquot scilicet leucarum, ejus propagatio quasi momentanea spectari queat; siquidem intra unum minutum 4000000. leucarum percurrit; ubi igitur lumen cum aliquo strepitu conjunctum est, tanquam initium soni haberi potest. Sonus autem multo lentius quam lumen propagatur. Si enim ad unius leucæ distantiam explodatur tormentum bellicum, multa inter lumen visum & sonum auditum momenta intercedunt.

His positis, facile erit locorum distantiam, lacus, ex. g. latitudinem, famulante sono, cognoscere. Si enim tormentum bellicum in parte lacus opposita explodatur, duplexque minu-

tum secundum a lumine conspecta ad sonum auditum effluxerit, tunc latitudinem lacus esse 346. sexpedarum constabit.

Quæres 2. utrum stante vento minuat, an augeatur soni velocitas.

Resp. Augetur soni velocitas, quando ventus cum eo conspirat. Itaque si ventus obsecundans intra unum minutum secundum centum sexpedas percurrat, sonus intra idem tempus describet 173. cum 100., id est, 273. sexpedas. Contra vero minuitur soni celeritas, cum ipsius directioni oppositus est ventus: eam ob causam, quando mutatur ventri directio, ex eodem loco auditur quarundam campanarum sonus, qui aliis temporibus ad aures pervenire non potest.

Quæres 3. quænam sit ratio juxta quam vis soni propagatione minuat.

Resp. Corpus sonorum circumquaque motum tremulum transmittit in aerem sibi circumfluum; ipsius igitur actio per radios propagatur, eo magis a se invicem disjunctos, quo longius protenduntur. Auris proinde sit basis aeris qui commovetur a corpore sonoro, in quo situs est apex (fig. 79.) Norunt vero qui in Mathematicis non sunt omnino peregrini, circulum qui duplo major est altero, sua in circumferentia includere spatium quadruplo majus. Quæ proportio generatim sic enuntiatur: *circuli sunt inter se, ut quadrata diametrorum.* Itaque coni *a b c* basis quadruplo spatiosior est, quam coni *a d e*, qui semel angustior est. Nam *d e* diameter posterioris, nonnisi dimidium est lineæ *b c* quæ prioris est diameter. Si igitur auris apertura diametrum habeat æqualem lineæ *d e*, quando ad primam distantiam constituta est, tunc numerum radiorum excipit quadruplo majorem, quam ad secundam distantiam. Eandem ob causam novies minus exciperet ad tertium intervallum, sedecies minus ad quartum: cum autem numerus 16. sit quadratum 4., 9. quadratum 3., 4. quadratum 2., genera-

tim

tim dici potest sonum decrefcere, ut quadratum distantiae quæ augetur. Ita D. Nollet. (Tom. 3. pag. 428.)

## PARAGRAPHUS II.

*De Soni reflexione.*

**A**ER non potest quoquo verſum diffundi, quin plura offendant corpora, quæ ejus propagationi obſtant. Cum igitur elafiicæ ſint aeris partes, reflecti debet ſonus, qui inde augetur vel minuitur pro corporum reflectentium diverſo ſitu, diverſa figura, & prout magis vel minus ſunt elafiica. Ubi corpus reflectens vegeto pollet elaterio, tunc eadem vi ſonus remittitur, & quando illius figura ad concavam accedit, tunc radii verſus eundem locum repelluntur. Hinc magis collecti ſonum efficiunt pleniorẽ. His poſitis, multa explicari poſſunt phænomena.

Quæres 1. cur ſonus facilius audiat in cubiculo cojæ nudati ſunt parietes, quam ubi tapetibus veſtiuntur.

Reſp. Aer in tapetes incurrens, quorum partes, utpote molliores, carent elaterio, viam ſuam amittit. Dum autem impingit in parietes nudatos, tunc eadem pene vi verſus organum noſtrum reflectitur, imo ſæpe illud vehementius commovet, unde vegetior eſt ſonus.

Quæres 2. quid ſit tuba vocalis, gallice dicta *trompette parlante*, ou porte-voix, & cur ſonum ita augeat & diffundat, ut ad mille paſſuum diſtantiã audiri poſſit.

Reſp. Inſtrumentum illud tubus eſt oblongus, materia valde elafiica confectus, qui ex oriſicio anguſto in latum ſic producit, ut in arctiori utrumque oris labium contineri poſſit. Ubi voces in hoc tubo proferuntur, ſonus qui ex ore emiſſus huc & illuc diſſipatus fuiſſet, intra anguſtiores tubi parietes coercetur & ab iis reflectitur.

fitur. Ideo juxta tubæ longitudinem percussus multum augetur. Deinde tuba paulatim fit latior, ut sonus per crebras reflexiones auctus, majorem aeris molem commoveat novumque suscipiat incrementum, ideoque initio sonus parvus, majorem in progressu vires acquirit, dum plures aeris partes in ejusdem motus tremuli societatem veniunt. In tuba bellica sonus ob gyros & sinuosos flexus intensior fit, & multo magis in cornu venatico, cujus majores sunt sinus, & tubus angustior.

Præterea generatim dici potest, sonum fieri intensiorem, quoties corpus sonorum suos motus tremulos impertit aeri qui sustinetur. Vox facilius auditur in vicis (*dans les rues*) quam in patenti campo, & facilius etiam in cubiculo clauso, quam in vico. Ratio est quod particule aeris, quæ magis compressæ fuerunt, vegetiores exercent vibrationes; aer autem, sicut quodlibet aliud corpus elasticum, eo vehementius comprimitur, quo minus e suo loco dimovetur, dum in eum agit vis comprimens: quam ob causam fragor tonitruï, tormenti bellici, aut fistulæ ferreæ (*fusil*) multo longius pervagatur in valle quam in plana regione; hinc etiam in aquaductibus, aliisque locis subterraneis & cameratis (*voutés*) vox, vel maxime remissa, ab uno extremo ad aliud ita propagatur, ut distincte percipi queat.

Denique cum aeris massa intra parietes continetur duras & præterea tennes & elasticos, ut contingit in tubis, non solum intus augetur sonus, quia aer interior iis parietibus solide innititur; verum etiam sonus ille auctus in aerem externum sese transmittit, quia corpus elasticum percutit & commovet.

Quæres 3. quanam sit parandæ tubæ vocalis ratio.

Resp. Varia est; istam vero commendat D. Savrie (*Cours de Phys. tom. 2. pag. 46.*) Instrumentum illud (*fig. 80.*) longitudinem g. a. habeat

4. pedum & 8. pollicum. Hanc ita divides, ut pars *g e* sit 22., pars *e e* 16., denique pars *c a* 8. pollicum. Deinde tubus ex lamina metallica, v. g. ferro candido, conficiatur, ita ut loquens os suum possit orificio *b k* sonum excipienti accurate applicare. Minima tubæ semidiameter sit unius pollicis, *f e* duorum, *e d* quatuor, & *a m* octo pollicum. Tubam versus eum dirigas a quo velis audiri. Singulas syllabas lente pronunties, ut magis distincta & explanata sit vocis impressio. Deinde eum vocis sonum adhibeas, quem edere tuba solet, quando percutitur.

Quæres 4. cur in cubiculo, cujus fornix (*voluta*) figuram habet ellipticam, homines duo in angulis oppositis collocati, sese submissa voce alloquantur, quamvis in spatio interposito nullam audias voculam.

Resp. Ratio est, quia vox a pariete repercutitur, angulum *reflexionis* efficiendo æqualem angulo *incidentiæ*. Eo modo transmittitur ad angulum usque oppositum, a quo repellitur versus aures hominis eo in loco constituti, qui alterius verba excipiet; qui autem in spatio interjecto versantur, nihil prorsus audiunt, quia positi sunt extra lineam, quam sonus describit.

Quæres 5. quænam sit causa, qui effectus echo. Resp. Echo nihil aliud est quam sonus reflexus. Alia dicitur *monosyllaba*, quæ ultimam tantum syllabam reddit; alia *polysyllaba*, quæ plures syllabas. Dividitur etiam in *monophonom*, quæ unam syllabam aut plures semel duntaxat repetit; & in *polyphonam*, quæ unam aut plures syllabas iteratis vicibus reddit.

Ut autem facilius intelligatur horum effectuum causa, observandum est sonum ita celeriter propagari, ut intra unum minutum secundum 173. sexpedas, ideoque plus quam 1000. pedes percurrat, quo tempore vix pronuntiantur quinque syllabæ. Itaque intra quintam minuti secundi partem sonus 200. pedes decurrit, dum vix una proferri potest syllaba; si ergo spatium quod  
sonus

sonus tum eundo, tum redeundo conficit, sit minus 200. pedibus; vix secunda syllaba pronuntiari incipiet cum prima reflexa jam auribus loquentis aderit. Tunc vero, quia inter impressiones per eandem syllabam sive directam, sive reflexam factas, non intercedit sensibile temporis discrimen; ideo non duplex, sed unica tantum soni perceptio excitabitur.

Ubi vero loquens a corpore sonum reflectente distat 100. pedibus & paulo amplius, & spatium a sono, tum ita, tum reditu, percursum, est majus 200. pedibus, tunc secunda syllaba pronuntiabitur, antequam sonus primæ ad loquentis organum recurrat, ac proinde distincte audietur primæ syllabæ repetitio; & sic deinceps.

Quando sonus in plura incidit corpora variis intervallis a se invicem distita, quæ sonum re-percutere valeant, tunc pluries reflecti poterit; si ergo reflexiones illæ in distantia requisita sibi succedant, tunc non unica echo, sed plures ad organum auditus pervenient, seu potius echo unam eandemque vocem, sæpius referet. Vox autem eadem multoties repetita, semper debiliior erit, quia sonus ultimo loco reflexus, spatium majus percurrit.

Ut corpus aliquod sono plenius remittendo idoneum sit, illud durum, elasticum & concavum esse oportet, ita ut aerem soni vectorem totum contineat, qui cum alio dilabi non possit, versus eandem, unde venerat, partem reflectitur. Sic docet experientia in templis, cum fenestræ omnes & januæ clauduntur, vocem facile repercuri, quia nempe aer motu tremulo agitatus, cum nequeat e templo elabi, ab illius parietibus necessario reflectitur. Illud eo plenius fit, quo pauciora sunt quæ aeris vibrationes extinguere possint: constat enim, in templo vacuo longe vegetiorem esse vocem quam ubi hominibus refertum est.

Muri, ædificia, rupes, montes, cavernæ, agri

grī proceris plantis confiti, ipsæ etiam nubes sonum remittere, & echo gignere queunt. Hinc terribiles & toties repetiti tonitruī fragores. Si tempore sereno explodatur tormentum bellicum, unicus vulgo sonus auditur; sed multoties iteratur, ubi cælum est nubibus obductum. Ex variis sylvæ arboribus nonnullæ semper reperiuntur ita respectu sui invicem dispositæ, ut formam efficiant concavam, & sonis versus eandem partem reflectendis idoneam. Non ergo mirum est, quod in nemoribus adeo frequentes sint echo.

Quæres 6. an suæ etiam mari sint echo.  
Resp. Sicut terrestres, ita & marinæ sunt echo. Multis enim observationibus constat, ubi fistula ferrea (*fusil*) adversus marinas volucres disspoditur, illius fragorem aliquando fuisse ab ingentibus undis (*grosses vagues*) reperitum. Verba quædam in tuba vocali fortiter pronuntiata, interdum repercussa & iterata fuerunt a convexo latere velorum ad alias naves pertinentium. Ut medio in mari echo locum habeat, ventus requiritur. Nisi enim spiraret, placidum erit mare, naves viam vela non erunt inflata, nec proinde sonum reflectere poterunt; nulla igitur tum esse potest echo marina.

## ARTICULUS III.

### De Soni effectibus.

**S**oni, pro variis modis quibus nervos concutunt, & spiritus animales impellunt, varios in anima affectus excitant. Modulationis Phrygiæ in Alexandri Magni animum tanta vis fuit, ut ea Timotheus musicus Principem nunc ad arma capessenda concitaret; nunc ipse iracundiam compesceret, nunc a tristitia sensu ad lætitiā eum revocaret. Narratur Henricum IV. Daniæ Regem cujusdam musici arte eo furoris adductum fuisse, ut quosdam aulicos interfecerit.

Mus

Musica beneficio sanati sunt quidam ægroti. Narrat enim Pater Regnault insignem musicum in furiosam insaniam incidisse post aliquot febris continuæ dies. Quodam veluti instincto ductus, concentum (*un concert*) apud se fieri postulat. Votis annuunt amici, & musicis modis canunt *les Cantates de M. Bernier*. Statim atque harmonia ægri auribus soaviter insonnit, ipsius oculi prius temere vagantes quieverunt, in vultum revocata est tranquillitas & serenitas, cessarunt violenti corporis motus, febris depulsa fuit, ægrotus præ lætitia plurimas effudit lacrymas. Cantu desinente, morbus recurrebat. Tandem singulare illud remedium per 10. dies continuatum, & venæ pedis incisio delirantem pristinae sanitati reddiderunt. (*Entretiens Physiques du P. Regnault.*)

Refert idem Physicus mirum aliud factum quod Aleisi (*Alais, ville du Languedoc.*) anno 1708. contigit. Quidam saltandi magister post febrim 5. aut 6. dierum, & diuturnum lethargum, in lecto decumbebat motus & furiosus. Amicus quidam assumpsit delirantis instrumentum musicum (*le violon*) & modulationes (*les airs*) cecinit, quas noverat ægroto esse familiares. Haud mora æger ad modos & numeros caput & brachia movere, & quanta delectatione afficiatur corporis motibus indicat. Post horæ quadrantem graviter dormivit, & somni tempore contigit rerum mutatio (*une crise*) quæ eum ad sanitatem reduxit.

Ut soni adversus nonnullos morbos efficaciam demonstrent multi Physici, etiam recentiores, quorundam hominum exempla proferunt, quos a *Tarentula* periculose morsos, sanitati, inquit, restituit instrumenti musici sonus. *Tarentula* vero crassior est aranea, quæ non solum prope Tarentum, unde nomen accepit, sed etiam in plurimis Italix locis reperitur. Ipsi morsus, inquit, maxime est virulentus. Hujus animalis morsum brevi subsequitur dolor acutissimus, cui succedunt



dont stupor & torpor, tristitia profundior, respi-  
 randi difficultas. Debilitatur arteriarum pulsus, oculi  
 turbantur, tandem omnis pene sensus extingui-  
 tur, & si defuerit auxilium, mors certa est.

Huic autem malo, inquiunt, adhiberi non pot-  
 est præsentius remedium, quam musici alicujus  
 instrumenti sonus quidam peculiaris. Plurima ten-  
 tantur modulationes. Ubi vero ea reperta est quæ  
 ægroto convenit, statim ex altissimo stupore e-  
 mergens, motu ad fidium modos composito digi-  
 tos primo movere incipit, deinde brachia & pe-  
 des; tandem e lecto surgit, totisque viribus ad  
 numerum per quatuor vel sex horas saltat, & su-  
 dore diffluit. Per aliquot dies iteratur hæc exer-  
 citatio, & convalescit ægrotus.

Mirabile autem illud factum inter fabulas sic  
 rejicit D. Valmont de Bomare: *Voilà de ces  
 faits qui résonnent continuellement aux oreilles  
 de tout le monde, & que l'on présente comme  
 vrais. Cependant plusieurs personnes très-curieu-  
 ses & très-instruites qui ont voyagé en Italie,  
 entr'autres M. l'Abbé Nollet, se sont assurées  
 que ce fait passoit pour être fabuleux, même dans  
 la Pouille, parmi des gens éclairés; & qu'il n'y  
 a que les gens de la lie du peuple & des va-  
 gabonds, qui se disant piqués de cet insecte, pa-  
 roissent guérir par la danse & la musique, at-  
 trapent quelque argent, & gagnent leur vie par  
 cette sorte de charlatanerie. On ne craint point  
 les tarentules à Rome, parce qu'il n'y a point  
 d'exemple qu'elles aient incommodé quelqu'un;  
 il paroît, quoi qu'on en dise, que le tarentis-  
 me n'est pas plus dangereux dans la Pouille.*  
 (Dict. univ. d'Hist. Nat. 3. édit. tom. 1. pag.  
 256.)

Quæres an ipsas belluas moveat harmonia.  
 Resp. Multis exemplis constat animalia vel  
 maxime stupida, plurimum harmonia delectari.  
 Unum seligemus singulare profecto, quod ita  
 narrat Pater Regnault: (*Entretiens Physiques.*)  
 Dum quidam tibia caneret, supra rivuli ripam

in prato sedens, asinus ad 20. passuum distantiam transiens, statim atque eum audit, caput erexit, ad ipsum appropinquavit, & aliquandiu constitit ad 8. vel 10. passus, arrectis auribus sonos excipiens: deinde ita proxime accessit, ut ipsius caput tibicinis capiti fere imbia sonos attentus audiret. Tandem ut Tibicini gratum animum suo modo significaret, ipsius petasum (*chapeau*) dentibus arripens e capite sustulit, eumque ad 8. vel 9. pedes transtulit subsiliens & ludibundus.

#### ARTICULUS IV.

*De modo quo formatur vox humana.*

**V**OX humana est sonus quem efficit homo dum aerem expiratione emittit. Quando pulmones ad procreandum hunc sonum contrahuntur, aer ex iis emissus, primum ex vasis tenuioribus in alia transit semper ampliora, a quibus in tracheam arteriam (*la trachée artère*) transmittitur. Hæc autem est canalis multo latior & capacior. Aer ex ea non potest exire, nisi per glottidem (*la glotte*) quæ rimula est ovata, & summam tracheam occupat. Cum vero exitus ille sit perexiguus comparate ad tracheæ latitudinem, maxime augetur aeris exeuntis velocitas. Quæ celeritate fortiter exagitat particulas ex quibus constat utrumque glottidis labrum. Ex ea vero commotione fit, ut alternis vicibus tendantur & remittantur, sicque motum tremulum concipiant, qui in aerem transmittitur. Ita formatur sonus vocis: glottis igitur præcipuum est vocis organum. Juxta clarissimum Doudart, aer plus minusve celeriter erumpens per glottidem, quæ eum ad usum facultatem habet sese dilatandi & contrahendi, efficit sonos magis minusve graves. Sonus hoc modo formatus, in oris & narium cavernulis resonat, & dein-

deinde per varios linguæ & dentium motus in vocem articulatam convertitur.

Ingeniosis experimentis comprobavit D. Ferrein, duo glottidis labra sese invicem non verberare, sed utrumque ab aere e pulmonibus exeunte perfricatum, resonare instar chordæ supra quam trahitur plectrum. Multis observationibus compertum habuit, utriusque illius labri oras esse funiculos tendineos (*des cordons tendineux*) utrinque illigatos cartilaginibus, quæ iis plus minusve contrahendis inserviunt. Per varios autem tensionis gradus, quibus partes illæ sese accommodant, feliciter diversos explicat tonos, in quos flecti potest vox humana. Nemo quippe nescit chordam, prout magis vel minus tenditur, sonos magis minusve graves efficere.

Sed inquires, quo pacto cognoscere potuit D. Ferrein, aerem e pulmonibus per tracheam immissum, excitare motum tremulum in iis funiculis tendineis, quos idcirco appellat *chordas vocales*? Ad illud promuntiandum nonne oportuit, ut illarum partium actionem ipsis oculis viderit? Quis vero potuit secretum illud artificium inspicere, quod oculis nostris natura subduxit?

Non potuit quidem auctor acutissimus, ut suas conjecturas faceret certas, experimento in hominibus viventibus tentare. Quam igitur in partem se vertit? Mortuis vocem restituit. Follem scilicet tracheis recentibus aptavit, & aer per glottidim celeriter transiens, sonos edidit.

Quando vox formata est, ne ingrata sit, necesse est eam per os & nasum exire. Non sine fastidio enim quempiam audias, qui naribus occlusis vel loqueretur, vel caneret. Huiusmodi hominem ex naso loqui vulgo dicitur; sed immerito prorsus. Ideo quippe vox illa displicet, quia per nasum non fuit transmissa.

Quæres an lingua præcipuum sit vocis humanæ organum.

Resp. Ad initium usque huius sæculi hæc fuit  
*Physica Tom. VI.* E *omnium*

omnium persuasio, linguam præcipuum esse vocis organum. Quo in capite erratum fuit: linguam enim nequidem ad clare distincteque pronuntiandum esse necessariam, singulari quodam facto constat. Scilicet in vico Lusitaniæ (*dans un village de Portugal*) anno 1702. nata est puellula sine lingua. Eam fore mutam omnes existimabant: sed aliter res evenit; non minus enim facile quam vulgus hominum locuta est. Anno 1717. D. Antonius de Jussieu ex Regia Scientiarum Academia Parisiensi, insignis medicus, rei herbariæ (*de Botanique*) professor in horto plantarum regio, & artis Anatomicæ peritissimus, ad Ulyssiponem (*Lisbonne*) iter fecit. Ibi Comes d' Ericeira ipsi de prædicta puellula sermonem fecit, quæ tunc annos 15. nata erat. E suo vico accersita sese D. de Jussieu obtulit, qui eam bis vidit, & summa cura inspexit, nimirum vespere, admoto candela lumine, & postridie interdiu (*en plein jour*). Eam pluries os aperire iussit, & visu tactuque comperitum habuit, ipsi nullum esse linguæ vestigium. Eo iubente, singulas litteras pronuntiavit, deinde plurimas seorsim syllabas, & continuam verborum seriem, tam vero distincte & expedite locuta est, ut eam lingua carere nunquam fuisset suspicaturus, nisi ea de re ipsum præmonuissent viri fide dignissimi. (*Mém. de l'Acad. an. 1718.*) Inde concludit doctissimus Anatomicus, linguam nequidem necessarium esse vocis instrumentum, nedum præcipuum sit illius organum.

## CAPUT V.

*De Corporum qualitate sensibili, quæ visus organum efficit, sive, de Lumine,*

**A**d septem articulos revocantur quæ de lumine dicendi sumus; primus erit de natura luminis; secundus de ipsius propagatione; tertius de lumine reflexo; quartus de lumine refracto;

fractus; quintus de visione; sextus de caloribus; septimus de phosphoribus.

## ARTICULUS PRIMUS.

*De natura Luminis.*

**L**UMINE, quo cetera omnia conspiciuntur, nihil est obscurius. Hinc circa illius naturam variae exortae sunt opiniones. Philosophi quidam motu luminis perniciosissimo, & ea quam habet corpora penetrandi facilitate attoniti, illud ab omni materia segregatum esse existimarunt. Quam in re quam turpiter erraverint, satis probant innumera lucis phaenomena. Constat enim illam in visus organum variis modis agere, prout vegetior est aut remissior. Constat eam offendere & laedere oculos, ubi ipsorum textura non est attemperata; illos vero demulcet & recreat, ubi horum organo est accommodata. Si solem splendido collucentem lumine, nudis oculis intueri tentaveris, eos pungentibus radiis exagitari senties, & iniussae fluent lacrymae. Qui vero posset lumen in oculos impingere, nisi aliquid esset corporei? Namque tritum est illud Lucretii effatum:

*Tangere enim & tangi, nisi corpus, nulla potest res.*

Præterea Physici diversis artificiis lumen ita perdomuerunt, ut ejus motum, licet reluctan-tem, calculis subjecerint. Nunc vagos illius radios in angustissimo foco speculorum ope colligunt; nunc densos & pressos in amplius spatium explicant. Uno verbo, lumen Philosophorum arbitrio augetur, minuitur, dividitur, detorquetur, reflectitur, refringitur. Quae omnia invictè probant, lumen inter corpora esse annumerandum; si enim foret partium omnium ex-pers, hominum oculos, manus, sensusque omnium eluderet ac effugeret.

Tres sunt insigniores circa luminis naturam

secentiorum opiniones, alia scilicet Cartesii, alia Malebranchii & Molierii, alia Newtonis. Eas seorsim ita exponemus, ut quibus laboret vitii, non finis dissimulaturi.

### SENTENTIA CARTESII.

Cartesius lumen situm esse putat in durissimis materiae aetherae globulis, quae per immensam orbis universi sphaeram diffunditur, nulloque disjungitur intervallo. Fluidum illud lucida sidera circumcingit, eaque ambiendo & comprimendo vetat, ne suos vortices transiliant errabunda. Quodlibet autem sidus, sol, ex. gr. flammeus, dum fervet & aestuat, vehementissimis exagitur motibus. Per circumfluam materiam caelestem coerceri impatiens, illam repetitis quatit ictibus, & victor paululum dimover. At brevis est victoria. Materia quippe aetherea crebris assultibus pulsa, in sese redit indignans, collectisque viribus irruit in solem, amissumque spatium sibi vindicat. Dum vero sol modo victor pellit, modo victus repellitur, materiae aetherae globuli tremulo quodam motu concutuntur, qui ad oculos usque transmittitur, luminisque sensum procreat.

Quod de sole, idem de ceteris corporibus lucidis pronuntiat Cartesius. Ideo enim lucent, quod illorum particulae intestinis agitatae motibus, circumjacentem materiam aetheream prius sopitam eo suscitant impulsu, qui per longas illius fluidi series ad oculum usque traducitur, ut ergo lumen percipiamus, minime necesse est globulos aethereos proxime impulsos, ad organum usque nostrum transferri: sed illos ita duros, inflexibiles, contiguos fingit Cartesius, & eos in lineas rectas sic disponit, ut dum commovetur una series extremitas, statim concutiat altera, quae contingit nervulos ex quibus organum visus contextitur.

Ingeniosa quidem est haec sententia, sed non pot-

potest cum certissimis quibusdam experimentis consociari. 1. Enim certum est momentaneam non esse luminis diffusionem, sed non nisi 7. aut 8. minutis ad oculos devenire. At juxta Cartesianam hypothese[m], lumen unico temporis puncto immensa trajiceret spatia. Lux quippe transmittitur per rectos materiae aethereae radios, qui globulis constat durissimis, flexi nesciis, & sese mutuo tangentibus. Cartesianam igitur fluidi caelestis linea supponatur solem inter & nostros oculos interjecta, non potest pars illius superior ab ebulliente sole pulsari, quin illico succutitur pars extrema inferior, visusque organum moveat; quemadmodum longissimus baculus ex una parte extrema premi non potest, quin eodem prorsus momento in partem oppositam traducatur hac pressio.

2. Certum est lumen per lineas rectas diffundi, quod vulgari hoc experimento compertum est: Tenebrosum adhibeas cubiculum, in quod nullus sit homini aditus, praeter foramen aliquod. Lucis radius per hanc aperturam illapsus, recto & indeflexo tramite partem parietis foramini oppositam collustrabit, dum reliquum cubiculum erit caliginosum: admissa vero Cartesii sententia, totum collucere deberet cubiculum. Cum enim refertum sit contiguis materiae aethereae partibus, impelli nequeunt globuli in ipso foramine positi, quin alios sibi proximos moveant, isti vero subsequentes alios hinc & inde sese tangentes pariter agitant. Uno verbo, impulsus ille in totum fluidum aethereum diffundetur; quemadmodum si in dolium aqua plenum nova guttula infundatur, illius pressio, juxta leges hydrostaticae, in singulas stagnantis aquae columnas distribuitur. Cum vero materia aetherea sit aqua multo levior & molior, illius globuli intra foramen positi premi nequeunt, quin eadem pressio per totam fluidi mole[m] dispergatur. Lux igitur per singula cubi spatia diffunderetur; quam autem aliter se res habeat, nemo nescit.

## SENTENTIA MALEBRANCHII.

Malebranchio non immerito displicuerunt durissimi & inflexibiles globuli a Cartesio confecti. Ille igitur substituit vorticulos elaterio præditos sibi contiguos, & juxta lineas rectas dispositos. Tenebrimus ille vorticulorum parens, patrio ductus more, eos per omnia spatia diffundit. Successivam luminis propagationem suæ opinioni sic accommodat: materiz æthereæ vorticuli se habent ut festus globulorum eburneorum tractus; si vero motum aliquod corpus in primum globulum impigerit, ille ita comprimitur, ut ovatam induat figuram; at brevi resiliens suæque formæ redditus, in secundum globulum incurret, eique suum omnem motum impertiet; secundus iste eodem modo aget in tertium. Uno verbo, motus integer in ultimum transmittetur globulum, qui suo e loco dimovebitur. Idem de vorticulis statuit Malebranchius: nam fingit aliquos vorticulorum radios, corpus lucidum proxime ambientes. Ab eo pulsati comprimuntur, ex rotundis fiunt ovati; mox vero resiliunt, priorem formam sibi vindicant, suum elaterium exerunt in vicinos, illi autem in alios subsequentes, ita ut lucidi corporis impulsio in ultimos transiliat vorticulos, qui intra visus organum continentur. Porro, inquit Malebranchius, propagatio luminis hoc modo expostata, siæ aliquo temporis intervallo fieri non potest. Hæc autem opinio gravissimis difficultatibus obnoxia est. Fingit Malebranchius vorticulos ex quibus coalescit luminis radius, ita comprimi, ut in ovatam abeant figuram. Quis autem adeo subtilis fuerit, ut concipiat vorticulos ex materia fluida & mobilissima confectos, ex sphericis fieri ovatos? nemo non videt quam absurde Malebranchius eos cum globulis eburneis contraherit. Quantum enim inter utrosque est descri-



scriminis! posteriores nempe globuli suas habent partes inter se coherentes, devinctas, & artissime colligatas. Quid autem simile reperias in fluidis vorticulis de quibus agitur?

At concedamus illos Malebranchio dociles, ex rotundis per compressionem fieri ovatos, quid inde eveniet; tunc lumen per lineas laterales diffunderetur. Illi quippe vorticuli non possunt ovam induere formam, quin comprimant vorticulos laterales. Ad effugiendos igitur luminis radios, nequicquam cubiculi fenestras clauderes, nequicquam multiplici velo eas obtegeres, tuos nihilominus oculos offenderent radii sequaces. Radius enim solis, iudice Malebranchio, nihil aliud est quam longa vorticulorum æthereorum series a sole agitata. Ilæ porro materia, utpote tenuissima, per exiguos quosdam cubiculi meatus facile sillaberetur, & cognatam consimilemque materiam in eo diffusam, hinc & inde, fluidorum more, impelleret; cum autem ab illo motu lumen pendeat, undique tuos oculos lacefferet, lux splendida, teque frustra sestantem tenebras, tuos inter parietes contumaciter persequeretur.

Eandem ob rationem viator solis ardore adustus, nequicquam parula sub arbore sese reciperet, frigus amoenum captaturus, tunc enim arbor ramos confociando, nullam præberet umbram hospitalem. Quemadmodum enim sonus, qui in tremulo aeris motu positus est, per opacas arbores, imo nec per ædificia, extinguitur, idem contingeret lumini, quod in motu fluidi aere multo subtilioris, a Malebranchio constituitur.

#### SENTENTIA NEWTONIS.

Clarissimus ille Philosophus Anglicus, Gallicæ Philosophiæ raro consonus, lumen consistere putat in tenuissimis particulis a corpore lucido profluentibus. Hæc opinio, inquit, Newtoni-

nanti, naturam magis deest, quæ simplicitatis amans, compendio agit, quantum potest, maximo, & nunquam per ambages operatur, quod paucis expedire potest. Quorsum enim procreandum lumen, innumeris globulis aut vorticulis orbem universum impedire, dum sufficit sola nonnullarum partium a corporibus lucidis emissio? Si quædam particulae a corporibus odoriferis & volantes, ita nares vellicent; ut variis animam odoribus afficiant, ad excitandum luminis sensum, cur non sufficeret celerissimus quorundam corpusculorum fluxus, quæ visus organum commoveant?

Id probat, inquit, modus quo lumen a nonnullis corporibus elicitur: cur fulgurat mare in statum tempestatibus? cur felium pellis coruscat, cum invergis pilis perfricatur? cur micat saccharum per noctem celeriter comminutum? cur scintillat flex calyce collisus? cur radiat linteum album bene calefactum, in obscurò loco unguibus citissime perfrictum? Illud nonne oritur ex eo quod lucida illorum corporum particulae, prius impeditae, per celerem affricus, attritus aut collisionis motum sese expediunt, in oculosque incurrant?

Hac opinio secus ac alia, in gravissimas incurrit difficultates, in quibus solvendis plus adhiberi solet subtilitatis quam soliditatis. Hac autem præcipua est: juxta Newtonianam hypothesein, sol tam immensos regionum tractus ab orbe conditio collustrare non potuit, quin per tanta hæc spatia, partes sui numero prope infinitas amiserit. Vastissimus igitur ille, ut ita dicam, luminis oceanus, aut penitus jam exaruisset, aut labentibus sæculis, suam omnem materiam est amissurus. Vel falsam igitur dixeris Newtonianam opinionem, vel deploranda est posteriorum conditio, qui inopem adeo & misellum solem sunt habituri.

Et vero si particulae solis ab eo tanta vi profluant, ut superata illius attractione, plus quam

4000000.

4000000. leucarum intra unum minutum percurrant, omnes solis superficies alia post alias diffuerent. Sol enim non habet eam vim attractionis, quæ superficiem extremam retinere possit; hæc igitur ab eo elabitur. Hac autem elapsa, superficies vicina fieret extrema, ac proinde etiam recederet. Ceteræ pariter omnes, alia post alias, fierent extrema; omnes ergo effluerent, & jam diu sol totus fuisset dissipatus, etiam si cum Kellio dicatur solis particulam minutissimæ arenulæ æqualem tot in partes posse dividi ut sufficiat ad illustrandam totam spatiorum cælestium amplitudinem. Corpora lucida quæ in usus nostros adhibentur, qualia sunt lucernæ & corpora inflammata, sensim minuuntur, eoque citius evanescunt, quo pluribus ex particulis sunt lucida; cur ergo sol pariter non dissiparetur?

Denique ubi corpus lucidum ex oculis nostris sese subduxit, illico cessat lumen: atqui in sententia Newtoniana res aliter contingere deberet: nam ubi primum e conspectu evanuit corpus lucidum, adhuc supersunt nosque ambiunt corpuscula ab ipso emissa, & maximam sui motus partem retinent; cur ergo desinit lumen, statim atque corpus lucidum oculis nostris subtractum fuit?

Cum igitur ex Philosophorum circa læminis naturam opinionibus, nulla sit quæ difficultates quasdam inextricabiles non habeat sibi adjungas, satius est ignorantiam nostram confiteri, quam de re nondum satis explorata temere pronuntiare.

## ARTICULUS II.

## De Luminis propagatione.

## PROPOSITIO I.

*Propagatio luminis fit per lineas rectas.*

Prob. 1. **Q**UA corpus quodlibet opacum lucido corpori oppositum umbram projicit: atque nisi lumen per lineas rectas diffunderetur, jam nulla fieret umbra. 2. Quia si per exiguum fenestraz foramen intra cubiculum obscurum excipiat luminis solaris radius, per semitam rectam progreditur, nec versus latera deflectit. 3. Quia objecta per tubum curvum & inflexum conspici nequeunt. 4. Quia contingit aliquando, ut luna solem & stellas fixas occultet: atque id fieri non posset, si lumen per lineas curvas propagaretur.

## PROPOSITIO II.

*Lumen a sole oculos nostros pervenit intra 7. circiter minuta.*

Prob. **L**UMEN a sole ad oculos nostros pervenit inter 7. circiter minuta, si diametrum orbitae terrestris circa solem descriptae non percurrat, nisi intra 14. circiter minuta: atque res ita se habet, sicque demonstratur: Quando Jupiter in inter suum vicinorem satelitem *P* & terram *s* interponitur, (fig. 81.) tunc satelles ille respectu nostri eclipsim patitur, ipsiusque lumen non excipimus, nisi cum ex Jovis umbra emerit. Ubi Jupiter est apogaeus, sive ubi terra versatur in *s*, lumen satellitis *P* ad nos devenit 14. minutis tardius, quam cum perigaeus est, cum scilicet terra in puncto *n* reperitur; atque hujus discriminis non alia esse potest.

est ratio, nisi quia Jupiter apogæus magis distat a terra, quam ubi est perigæus, nempe tota diametro  $n$  orbitæ terrestris circa solem  $S$ ; quæ diameter est 66000000 leucarum; ergo lumen a primo Jovis satellite ad nos transmissum, percurrit intra 14. minuta totam diametrum orbitæ terrestris, & proinde distantiam  $s$  solis a terra intra septem circiter minuta.

## PROPOSITIO III.

*Lumen diffunditur per radios, divaricantes (per des rayons divergens) qui conos lucidos efficiunt.*

**Prob. EXPERIMENTO** in foramini angusto per quod admissus fuerit in cubiculum radius solaris, cubitus aptetur cum lenticula vitrea: deinde radio per lenticulam transmissio obijciatur ad distantiam 5. aut 6. pollicum lamina metallica tenuissima, multique pertusa foraminibus. Si prope laminam istam opponatur charta candida, in ea descriptos conspices, tot circulos lucidos, quot sunt laminæ foramina; & quo magis removebitur charta, eo latius sese expandent circuli, & amplius spatium in charta occupabunt: atqui ex illo experimento compertum est lumen diffundi per radios divaricantes, qui conos lucidos efficiunt, quorum apex in laminæ foraminibus situs est.

## PROPOSITIO IV.

*Vis luminis rarior est, quam magis crescit spatium illud in quo.*

**Prob. EXPERIENTIA** constat minus illustrari obiectum, quod a pedibus a corpore lucido distat, quam aliud quod ab eo non removetur nisi 2. pedibus. Sic librum quem facile legimus lucerna distans a tantum pedibus, legere non

non poteris, si ab ea 4. pedibus recesseris. Quoniam majus est spatium in quod lumen diffunditur, eo magis sese expandit & explicat lumen, ut totum impleat spatium; sicque minus collectum, minusque densatum, vim habet remissionem.

### PROPOSITIO. V.

*Vis, seu densitas luminis, decrescit, prout crescit quadratum distantie; id est, vis luminis semper est in ratione inversa quadrati distantiarum a corpore lucido.*

Prob. **A**CCENSA candela ponatur in pyxide (basse) accurate clausa; in ejus latere fiat exiguum foramen, per quod radius luminis recta via exeat, ut in obscurum conclave per nocte sese diffundat. In apta distantia librum apertum colloces, ita ut vix legere possis. Ipsi folia sint parallela lateri pyxidis, in quo foramen reperitur. Deinde librum transferas ad distantiam a candela duplo majorem; tunc eum legere non poteris, & spatium illuminatum erit quadruplo majus. Itaque si concipiatur spatium illud quatuor in partes æquales divisum, unaquaque pars non excipiet, nisi quartam radiorum partem, qui in primum spatium incidebant; idcirco quadruplo minus illuminabitur, ideoque vis luminis in posteriori hoc spatio erit quadruplo minor, quam in priori: porro numerus 4. est quadratum numeri 2. Ergo ubi distantia sit duplo major, densitas luminis sit quadruplo minor.

Si librum colloces in distantia triplo majori, tunc observabis spatium illustratum novies amplius fore; sed lumen in eo spatio erit novies debilius: atqui numerus 9. est quadratum numeri 3., ac proinde ubi distantia triplo major est, vis luminis sit novies remissior; ergo vis luminis decrescit prout crescit quadratum distantie; sive, quod in idem recidit, vis luminis sequi-

sequitur rationem inversam quadrati distantiarum.

## ARTICULUS III.

## De Lumine reflexo.

**C**ATOPTICA dicitur ea Physica pars, quae de lumine reflexo differit. Luminis autem reflexio nihil aliud est, quam regressus radiorum, occasione alicujus corporis; quod traicere nequeunt, resilientium. Certissimis constat experimentis eos a superficie terfa & polita sic reflecti, ut angulum reflexionis efficiant angulo incidentiae aequalem.

Quaeres I. quanam causa luminis radios recedat.

Resp. In assignanda ea causa plurimum dissentiant Physici. 1. Luminis radios ab ipsis superficierum partibus reflecti, apud plerosque Cartesianos indubitata res est. Corpora enim, inquit, non conspiciamus, nisi per radios reflexos: atqui non viderentur, nisi radii a propriis corporum partibus ad oculos nostros remitterentur.

2. Post Newtonem plurimi contendunt radios prius reflecti, quam corporum superficiem contingant, vi scilicet quadam repellente, (*par une force répulsive*) quam nullibi definiunt, & quae corporum superficiem quasi circumvestit. Ea potissimum ratione ducuntur Newtoniani, quod superficies corporum, quantumvis perpolita fuerit, plurimum habeat asperitatis; ita ut trans microscopium conspecta, panno villis hirsuto similis videatur. Cum vero radiorum tenacitas sit veluti infinita, corporum superficies ad eos se habet, ut superficies innumeris hispida laevissimis se habet ad globulos eburneos in ipsam incidentes: porro si globuli illi in ejusmodi superficiem impingerent, vix unus ita reflecteretur, ut angulus reflexionis esset angulo incidentiae aequalis; idem ergo luminis radiis

ditis contingeret, sic ab ipsis superficierum partibus remitterentur.

In eam opinionem impetum faciunt Cartesiani. Quis concipiat, inquit, vim illam radios repellantem, & corporum superficieribus externam? nonne occultas Peripateticorum qualitatis redolet? Nisi ipsæ corporum superficies radios luminis regerant, quorsum in iis perpoliendis tantum curæ adhibetur, cum eas radii nequidem contingant? qui fieri potest, ut eas calefaciant? præterea quamvis corporum superficies, vel maxime politæ, plurimum habeant asperitatis & inæqualitatis, id non obstat, quominus magna radiorum copia ita resiliat, ut angulus reflexionis sit angulo incidentiæ æqualis. In corporum enim superficie multe sunt partes, juxta eamdem lineam rectam dispositæ.

3. D. Nollet, quamvis ab opinione Newtoniana remotissimus, luminis reflexionem non attribuit propriis superficierum in quas incidit partibus. Statuit fluidum cujus ope conspiciemus objecta, esse circumquaque diffusum, illudque tum intra, tum extra corpora existere; ab eo repleri singula spatia, quæ non occupat alia materia; adeo ut nihil in natura sit, quod eodem fluido non penetraret, sicut, & multo etiam magis, spongia madefacta particulis aqueis tota imbibitur; unde concludit partium cujusque corporis continuitatem, a globulis luminis qui ipsius poros subeunt, esse perpetuo interruptam; ita ut quælibet superficies sit veluti quoddam textile, cujus maculæ (*les mailles*) ab iisdem globulis implentur.

Cum vero in corporibus, vel densissimis, plus vacui sit quam pleni, sequitur in eorum superficie plures contineri luminis globulos, quam partes proprias. His ita constitutis, luminis reflexionem sic ingeniose exponit clarissimus ille Physicus: globuli luminis, dum in corporis superficiem incidunt, alios offendunt globulos sibi consimiles, qui in superficiei foraminibus, quasi



in totidem palis (*chabons*) inclusi sunt. Cum autem incarcerati illi globuli eodem polleant elastico, quo globuli incidentes, ipsos etiam eadem vi reperiunt, quæ compressi fuerunt. Unde fit ut angulus reflexionis angulo *incidentiæ* sit æqualis. Id autem efficere nequeunt partes corporis propriæ; quia non eam habent vim elasticam, qua donantur radii luminis.

At, inquires, si luminis globuli non ad ipsa corporum superficie, sed ab aliis globulis sibi cognatis reflectantur, tunc non ipsa corpora sunt oculis conspicua. Hanc difficultatem a præjudiciis ortam variis exemplis solvit D. Nollet. Cum oculos, inquit, conjiciis in pannum colore cæcineo tinctum, nonne juraveris videre te corpus ex lana contextum? Atqui tamen toto cælo erras. Si enim diligenter attendas, fatearis necesse est non aliud a te conspici, quam particulas coloratas quibus illita fuit propria panni materia; non aliud vides, quam panni magnitudinem, figuram, non vero proprias ipsius partes; sunt ergo casus in quibus corpora, non per materiam sibi propriam sunt conspicua, sed tantum per substantiam extraneam quæ ipsorum poros occupat. Porro si id efficere ars possit, varias adhibendo tincturas, quæ a luminis subtilitate longè recedunt; cur neges idem efficere posse luminis globulos, quibus imbutur tota corporum superficies? cur neges hanc esse veram solamque causam per quam visibilia fiant corpora?

Quæres 2. quanam corpora sint reflectendis radiis aptiora.

Resp. Sunt tersæ illæ & leves superficies, quæ *specula* ideo vocantur, quia in ipsis spectantur, quæcumque circumjecta sunt corpora. Tria vero sunt speculorum genera, plana scilicet, convexa & concava. Quæ singulis propria sunt, magisque obvia, seorsim exponemus.

## 6. 1. De Speculis planis,

1. Testatur experientia radios in speculum planum incidentes, eadem ratione reflecti, quam ad ipsum pervenerant. Si ergo vel *paralleli*, vel *convergentes*, vel *divergentes* sint ad speculum accedendo, post reflexionem eundem inter se ordinem, & situm constanter retinent. Id necessario sequitur ex eo quod hujusmodi speculorum superficies sit recta & uniformis, angulusque reflexionis angulo incidentie semper æqualis.

Inde sequitur speculo plano nullum esse focus in quo radii colligantur. Sed multa hujusmodi specula ita disponi possunt, ut radios versus aliquod corpus regerant, in eoque calorem imo & inflammationem excitent. Si enim radii solares certo numero, v. g. 12., versus thermometri ampullam reflectantur ab exiguis totidem speculis planis, quorum diameter 3. sit aut 4. pollicum, liquor intra tubum multo altius efferetur, quam si unum duntaxat adhiberetur speculum.

Archimedes Romanorum Syracusas obsidentium classem ope speculi intendisse historia commemorat. Quamvis hoc factum incredibile, & commentitium visum fuerit, illud tamen possibile demonstrat speculum a D. de Buffon inventum. Plurimis constat speculis planis in se invicem inclinatis, & ita dispositis, ut ex iis unum coalescat speculum, quo lignum ad 200. pedum distantiam inflammatur. Potuit vero Archimedes eadem arte Romanorum classem incendere. Narrant quippe Historici eam non fuisse distantem nisi veli jactu, qui 200. pedes non excedit.

2. Objecta per radios a speculo plano reflecta visa, ultra speculum conspiciuntur, exhibeatur enim speculum planum per lineam *ab*, (fig. 82.) sit punctum lucidum *C*, e quo radius incidens in *a* reflectatur versus oculum in *e* positum.

tum. Punctum C videbitur juxta directionem radii reflexi *de* versus *f*. Objecta enim visa semper referimus juxta lineam rectam radiorum, qui in oculos incurrunt, & quorum ope cernuntur: atqui punctum C conspicitur ope radii *de*; ergo illud referimus juxta directionem lineae *de* versus *f*, ac proinde ultra speculum planum *ab*.

3. Objecta tantum ultra speculum planum conspiciuntur, quantum citra posita sunt. 1. Enim objecta non cernimus, nisi per conos luminis, quorum basis in pupilla sita est. 2. Unumquodque punctum visibile eo in loco videtur positum, in quem radii essent coituri, si ex oculo proficiscerentur eodem ordine, quo ad ipsum pervernerunt; 3. experientia constat radios luminis a speculo plano reflexos, eodem modo esse divergentes, ac prius.

Quapropter cum radii luminis e puncto C (fig. 83.) in speculum planum *ab* incidentes, ab eo versus oculum *e* reflectuntur, punctum C referatur ad eam ultra speculum distantiam, in quam radii concurrerent, si ab oculo prodirent eodem ordine, quo fuerunt versus ipsum remissi: atqui concurrerent in punctum *g*, ut patet ex figura 83.; & punctum *g* eodem modo distat a speculo *ab*: ac punctum C; ergo objecta tantum ultra speculum planum conspici debent, quantum citra posita sunt.

Eam ob causam 1. si ad speculum planum accesseris, tibi obviam occurret tui ipsius imago; sin autem ab eo recesseris, fugere etiam ultra speculum videbitur amula imago. 2. Si quis adstans sese intueatur in speculo plano, juxta pedes suos horizontaliter constituto, inversa videbitur ipsius imago, pedes sursum sese attolent, & caput deorsum deprimetur. Cum enim caput a speculo magis distet, quam pedes, capitis simulacrum in majori ultra speculum recessu exhibebitur, quam pedum effigies. Hinc arbores in fluminis aut stagni ripa consista, in aquis  
in-

inversa pinguntur, ita ut cacumina inferiorem, & radices superiorem locum occupare videantur. 3. Cum objectum & oculos pariter a speculo plano distant, totum objectum non videt oculus, nisi speculum habeat saltem dimidum altitudinis objecti.

Supponimus 1. objectum  $KL$  & oculum  $E$  uno pede distare a speculo plano  $AB$ ; (fig. 84.) 2. altitudinem objecti  $KL$  duorum esse pedum. His positis, contendimus totum objectum non posse ab oculo  $E$  conspici, nisi speculi  $AB$  altitudo unius saltem sit pedis.

Demonstratur; integrum objectum  $KL$  ab oculo  $E$  non videbitur, si extremi duo radii  $KM$  &  $LN$  non incident in speculum  $AB$ : atqui in illud non incident; si altitudo speculi non sit unius pedis. Radii enim  $KI$ ,  $LI$  qui in punctum  $I$  simul concurrere concipiuntur, uno pede sunt a se invicem disjuncti; quando perveniunt ad speculum  $AB$ : speculum quippe istud inter punctis  $K$  &  $L$ , ubi illi radii sunt duobus pedibus a se invicem remoti, tam distat, quam a puncto  $I$  in quod iidem radii coeunt. Porro duo radii quorum distantia est unius pedis, a speculo excipi nequeunt, nisi unius saltem pedis altitudinem habeat, radii vero  $KI$  &  $LI$  uno pede a se invicem remonentur in punctis  $M$  &  $N$  propterea eos admittere non potest speculum  $AB$ , nisi ipsius altitudo sit unius saltem pedis; ergo, &c.

### GOROLLARIA.

1. Homo stans ante speculum quod sua altitudinis dimidiam non habet, in eo se totum videre non potest, imo e speculo multo magis se videt.
2. Idem ille homo magis alium cernit staturam sibi aequalem, sed ab eo speculo remotiorem. Extremi enim radii e loco magis distito venientes, minus a se invicem disjuncti sunt, quando in speculi superficiem incident.

3. Pro-

3. Propter rationem oppositam minus alium hominem conspiciet, qui speculo propior erit quam ipse.

§. II. De Speculis convexis & sphaericis.

Certis constat experimentis, radios luminis in specula convexa & sphaerica incidentes, ab iis ita vulgo reflecti, ut fiant 1. ex parallelis divergentes; 2. ex convergentibus divergentes; 3. ex divergentibus, magis etiam disjuncti. Ideo igitur specula convexa differunt a planis, quod duo radii luminis a superficie convexa reflecti, magis a se invicem disjungantur, quam antea.

Quo pacto res ita contingat ut intelligatur, fingamus duos radios parallelos  $BG$  &  $DH$  in speculum planum  $FAK$  (fig. 85.) incidere. Duo illi radii in seipsum resiliunt, & peracta reflectione, a se invicem distabunt intervallo  $BD$ . Nunc speculum planum  $FAK$ , in speculi convexi portiunculam  $FAM$  convertamus. Deinde in eam convexitatem mittantur duo luminis radii, alter  $Bc$ , & alter  $DH$  usque in  $E$  productus. Quid inde accidet? radius quidem  $Bc$  in seipsum reflectetur, quia lateri  $FA$  perpendicularis remanet: radius vero  $DHE$ , qui, lateri  $AK$  prius erat perpendicularis, non ita se habet respectu lateris  $AM$ ; ideoque reflectetur versus punctum  $O$ , ut angulum reflectionis  $OEM$  efficiat æqualem angulo incidentiæ  $DEA$ ; ergo duo radii luminis a superficie convexa reflecti, a se invicem disjunctiores sunt, quam ubi a superficie plana regeruntur.

Nequicquam igitur adhiberentur specula convexa ad augendum calorem, qui radiis solari-bus generatur; nedum enim lumen solis colligant, illud contra dispergunt.

Cum planetæ, qui radios solares ad nos usque remittunt, sint sphaerici, aut saltem ad formam sphaericam accedant, lumen ab iis ad

nos

nos transmissum maxime debilitatur; non solum quia longissimum decurrit intervallum, a sole ad illa sidera, ab iisque sideribus ad nos perveniendo; sed etiam quia nonnisi pars luminis versus globum nostrum repellitur; quodque ad nos devenit, maxime rarefit propter radiorum disjunctionem, quos a se invicem removeant sphaericae planetarum superficies. Experimentis, ait D. Nollet, diligentia cura tentatis, comparatum habuit D. Bouguer, lunæ plenæ lumen, in sua mediocri e terra distantia, trecenties milles rarius esse solis lumine. Eam ob causam nullum excitat calorem, etiam cum opè speculorum colligitur.

In montium excelsorum vertice longe debiliorem esse solis calorem, quam in locis depressis, ibique frigus vigere perpetuum, res certa est, viatoribusque perspecta. Inter varias illius effectus causas, merito recenseri potest, radiorum disjunctio (*la divergence des rayons.*) quam plurimum auget montium figura, quæ ad sphaericam accedit. Calor enim quem in terræ superficie experimur, non solum a radiis solaribus directis, sed etiam a reflexis procreatur: isti vero in montium cacuminibus, propter eorum convexitatem, maxime rarefiunt, aut dissipantur.

2. Specula convexa objecti imaginem exhibent ultra eorum superficiem reflectentem. Objecti enim imago videatur in eo puncto necesse est, in quod radii ex quibus constat conus luminis ad spectatoris oculum reflexi concurrerent, si ab oculo prodirent eodem ordine, quo ad ipsum devenerunt: utque radii illi ultra speculum convexum simul coirent, ut patebit figuram 86. inspicienti.

Qua in re specula convexa cum planis consentiunt, sed in eo discrepant, quod in planis punctum reflectionis æqualiter distet tum ab objecto, tum ab ejus imagine; in convexis autem imago propius ad speculi superficiem reflectentem

accedat ; & quidem eo magis , quo major est  
 convexitas . Cujus discriminis causam indigitat  
 figura 87. Suppono ex objecto *A* proficisci duos  
 radios obliquos in speculum planum *FGE* , alium  
*AG* qui reflectatur ad oculum *D* , & alium *AH*  
 qui remittatur ad oculum *C* : objecti *A* imago  
 videbitur in puncto *B* , huc enim coituri essent  
 radii *DG* & *CH* , si nullam patientes reflectio-  
 nem , ultra speculum *FGE* continuarentur . Qui-  
 bus positis , dicimus , si speculum *FGE* esset con-  
 vexum , imaginem objecti *A* propius conspicuam  
 fore , quam in puncto *B* .

*Demonstratio* . Si convexum foret speculum  
*FGE* , duo radii *DG* & *CH* disjunctiores essent ,  
 quam sunt . Ergo si concipiantur ultra speculum  
 producti , citius jungerentur quam in puncto *B* ,  
 nempe in *b* , ibique videretur objecti *A* imago ;  
 proinde si convexum foret speculum *FGE* , effi-  
 gies objecti *A* minus remota esset , quam pun-  
 ctum *B* ; objecti igitur imago minus a speculo  
 convexo , quam a plano distare debet .

Duorum radiorum *dG* & *cH* in punctum *b* coi-  
 tus probat , quo magis *divergentes* sunt duo ra-  
 dii post ipsorum reflexionem , eo citius fieri eo-  
 rum ultra speculum conjunctionem .

Quo speculum est convexius , eo minus ultra  
 illud depressa est (*enfoncée*) objecti imago : quo  
 magis enim convexum est speculum , eo disjun-  
 ctiores facit radios .

3. Convexa specula imaginem semper exhibent  
 objecto minorem . Ratio est , quia radii a duo-  
 bus objecti extremis devenientes , & a speculo  
 convexo reflexi minus *convergentes* sunt ; tar-  
 dius igitur in oculum simul coeunt , ideoque  
 objectum sub minori angulo repræsentant ; i-  
 pfius igitur imago videri debet contrahior ,  
 quam si extremi radii a speculo plano reflecte-  
 rentur .

Radios autem qui tardius simul concurrunt ,  
 minorem angulum efficere patet ex figura 98. ;  
 angulus enim *BCA* acutior est , quam an-  
 gulus

gulus  $BFA$  quem formant radii  $BF$  &  $AF$ , qui simul in puncto  $F$  citius jungantur, quam radii &  $BC$   $AC$  in puncto  $C$ .

### §. 3. De Speculis concavis.

Specula concava radios luminis ita reflectunt; ut eos magis *convergentes*, sive minus a se invicem disjunctos efficiant; quod certis compertum est experimentis. Habenda sunt enim speculi concavi elementa, tanquam exiguae superficies planæ, quæ aliæ versus alias inclinantur, quales sunt lineolæ  $AC$  &  $BC$ ; (fig. 88.) cum radii qui in eas incidunt, angulos *reflexionis* efficiant angulis *incidentiæ* æquales, necesse est ut propius ad se invicem accedant, sicut indicat figura 88. Ea est præcipua hujusmodi speculorum proprietas, ut intra angustum spatium, quod focus dicitur, eam colligant radiorum copiam, quæ corpora vel durissima comburat, liquefaciat, in calcem redigat.

Si objectum  $s$  inter focum  $F$  & centrum  $C$  interpositum sit, (fig. 89.) ejus imago videbitur in puncto  $E$ , a speculoque magis distabit, quam centrum  $C$ . Quamobrem spectator inter centrum  $C$  & speculum positus, hanc imaginem pone seipsum habebit, nec eam conspiciere poterit. Ubi vero lucidum objectum  $A$  inter focum  $F$  & speculum erit constitutum, tunc videbitur ultra speculum in puncto  $n$ ; huc enim coeunt radii reflexi.

Objecti inter focum & speculum positi imago videtur recta, dum apparet inversa, ubi alium situm habet objectum; quia scilicet radii lucidi non sese decussant, priusquam objecti imaginem delineent, ut indicat figura 89.; contra vero si objectum alio in situ reperiatur, v. g. in  $s$ , tunc radii sese intersecant, priusquam imaginem formaverint, quæ in puncto  $E$  inversa videbitur ab oculo  $n$ .



## ARTICULUS IV.

*De Lumine refracto.*

**D**IOPTRICA nuncupari solet ea Physicæ pars, quæ circa lumen refractum versatur. Experimentis comprobatum est, lumen a corporibus crassioribus in eo differre, quod ubi ex uno medio in aliud densius oblique traducitur, v. g. ex aere in aquam, tunc refractionem patiatur ad perpendicularem accedendo; cum vero e medio densiori in aliud rarius, ex, g. ex aqua in aerem, comseat, tunc refringatur declinando a perpendiculari.

Sit enim vas *LKSR*, cujus pars superna *LV* & laterales *LS* & *VR* sint opacæ, inferior autem *SR* perlucida, nempe vitrea, (*fig. 90.*) vas illud soli ita exponatur, ut luminis radius *DC* per foramen *C* illapsus terminetur in *H*.

Si vas illud in eodem situ positum, aqua impleatur, tunc radius *DC* non perget in *H*, ut ante, sed *J*, aut in punctum aliud, quod perpendiculari *AB* propius erit quam *H*. Radius igitur luminis e medio rariori, nempe aere, in densius oblique incidens, nimirum in aquam, ita refringitur, ut accedat ad perpendicularem.

Alterum hoc experimentum demonstrat lumen a perpendiculari recedere, quando e medio densiori, v. g. ex aqua, in aliud rarius, scilicet aerem, comseat. Præfatum vas *LKSR* sit apertum & aere duntaxat plenum, in cujus fundo, nempe in *J* ponatur nummus. Spectator retrocedat, donec nummum conspiciere desierit, ibique maneat. Locus autem ille sit *D*. Si postea vas aqua repleatur, nummus statim ex *D* videbitur; quia scilicet radius a nummo emissus, in aere non describet lineam *CT*, sed lineam *CD*, a perpendiculari *CA* recedendo

Idcirco spectator in  $D$  positus, nummum conspiciet in puncto  $H$  per lineam  $DH$ . Objectum enim, natura duce, semper referimus ad radii recti extremitatem, qui visus organum commovet.

Ex eo quod luminis radius e medio rariori in aliud densius transeundo refringatur ad perpendicularem accedendo, facile explicatur cur sidera mane & vespere a nobis supra horizontem conspiciantur, priusquam ad eum perveniant, & postquam infra ipsum descenderint: atmosphaera enim terrestris *medium* est illo densius, quod a siderum lumine trajicitur, antequam aerem nostrum subeat: radius igitur a stella  $S$  profectus, dum ista infra horizontem  $HG$  adhuc deprimitur ( *fig. 91.* ); radius, inquam, ille qui recta linea pergeret versus  $V$ , in puncto  $C$  refringitur, ad perpendicularem  $PP$  accedendo, sicque ad spectatoris oculum pervenit, qui in  $T$  constitutus fingitur, ipsi proinde stellam exhibet, quasi supra horizontem  $HG$  asculgeret.

Si baculum ex dimidia parte in aquam immersum oblique intuearis, fractus tibi videbitur, vel potius angulosus. Radit enim ex parte immersa devenientes, ubi primum ex aqua in aerem transeunt, refringuntur a perpendiculari recedendo; eam proinde baculi partem in alio situ exhibent, quam partem alteram extra-aquas positam.

Generatim quidem verum est lumen, dum oblique transit ex *medio* rariori in aliud densius, ita refringi, ut accedat ad perpendicularem, suumque motum acceleret. Hac tamen veritas quasdam admittit exceptiones. Observavit enim  $D. Mariotte$  lumen, dum ex aere in oleum, vel in spiritum vini oblique incurrit, versus perpendicularem magis inflecti, quam ubi ex aere in aquam traducitur.

Quæres 1. cur radii luminis ab aere in aquam vel aliud *medium* densius commeantes, ad per-

perpendicularem accedant, suumque motum accelerent, dum legem oppositam alia sequuntur corpora.

Resp. Duplex ea de re est opinio: docet Cartesius corpora densiora, ut aquam, vitrum, esse respectu luminis *medium* facilius quam aerem; aer scilicet ex partibus ramosis componitur, quæ intra illius *poros* protensa, totidem sunt luminis transeunti obices; corporum vero densiorum *pori* hujusmodi ramentis minime impediti, luminis transitum præbent liberiores.

Refellitur hæc opinio: 1. quia, juxta ipsam Cartesium, liquores pingues & viscosi, ideo tales sunt, quia particulis constant magis ramosis & secum invicem implexis, quam partes aquæ: atqui tamen experientia testis, oleum & liquores hujusmodi pingues, luminis faciliorem aditum permittunt, quam ipsamet aqua; in iis enim liquoribus motum habet liberiores & versus perpendicularem magis declinat. 2. Si aer eo modo esset constitutus, quem fingit Cartesius, quo pacto foret corporum omnium maxime perlucidum? si aeris meatus, propter implicatas illius partes, ita essent impediti & sinuosi, qui fieri posset ut luminis radii intra aerem juxta lineas rectas propagarentur?

Rem aliter explicant Newtoniani, ope nimis amicissima attractionis & particulae *medii* densioris, inquit, vim habent attrahendi potentiores, quam partes *medii* rarioris. Inde igitur fieri necesse est ut radii luminis oblique in *medium* densius incidentes, versus illud magis inflectantur, sicque suam mutant directionem, ad perpendicularem accedendo, suumque motum accelerent; eandem ob causam radii luminis e *medio* densiori in aliud rarius transeuntes, v. g. ex aqua aut vitro in aerem, refringi debent recedendo a perpendiculari. Nam ubi primum ex aqua exeunt, ab ea vehementius, quam ab aere, attrahuntur. Idcirco versus aquam detorqueri debent, & suam proinde direc-

tionem mutare, a perpendiculari deflectendo.

Huic opinioni experientiam opponunt alii; constat enim plurima esse corpora, tum solida, tum liquida, in quibus licet aqua & vitrum minus densis, luminis radii, non minus, imo magis refringuntur, motumque habent celeriores, quam in vitro & aqua. Propositæ igitur quæstioni nihil lucis afferunt Cartesiani & Newtoniani.

Quæres 2. quam mutationem subeant radii luminis, dum ex aere in vitrum, & vice versa transeunt?

Resp. De vitris planis silebimus, quia refractione quam patitur luminis radius, dum ex vitro plano in aerem commeat, mutationem corrigit, quam idem radius expertus fuerat, ex aere in vitrum transeundo. Quantum enim ad perpendicularem accesserat vitrum subeundo, tantum ab ea recedit, dum e vitro in aerem emergit, ut testatur experientia. De vitris igitur convexis duntaxat & concavis, quæ præcipua sunt exponemus.

### §. 1. De Vitris convexis.

Vitrum convexum radios luminis a quibus trahitur, efficit magis convergentes, sive minus a se invicem disjunctos, eosque brevi in spatio colligit, quod focus dicitur. Ita docet experientia, sicque demonstrari potest.

Adhibeatur vitrum convexum, vel lenticulare *Bb cc* (fig. 92.) cujus convexitas superior *Bb* suum habeat centrum in puncto *A*, convexitas autem inferior *cc* suum habeat in puncto *D*. Manifestum est lineas *BA* & *bA* in convexitatem *Bb* ad perpendicularum incidere, siquidem in illius centrum *A* coeunt. Pariter duæ lineæ *cD* & *cd* sunt convexitati *cc* perpendiculares, ad illius quippe centrum *D* pertingunt. Nunc in vitrum illud convexum ab objecto *EE* mittantur radii luminis *EB*, *EF*, *eb*. Quid inde evenire necesse sit, exponamus.

1. Lu-

1. Luminis radius  $EF$ , qui in duas vitri superficies convexas ad perpendicularum incidit, nullo modo refringetur. 2. Radii  $EB$  &  $eb$ , oblique ex aere in vitrum transeuntes, refringentur ad perpendiculares  $BA$  &  $ba$  accedendo, eoque ipso fient magis convergentes. 3. Radii  $EBc$  &  $ebc$ , qui ex vitro in aerem oblique redeunt, ita refringentur, ut ab utraque perpendiculari  $Dc$  &  $Dc$  recedant, siquidem e *medio* densiori in rarius transcurrunt; unde magis etiam convergentes facti, in foco  $F$  colliguntur; ergo vitrum convexum radios luminis efficit conjunctiores.

Si corpora quæ comburi possint, in foco  $F$  posueris, in cineres redigentur: ipsamet glacies, si formam sphericam induat, inflammationem excitare poterit. Qua arte paretur singulare illud speculum urens, sic docet *D. Mariotte*: postquam aqua limpida per dimidiam circiter horæ partem ebullierit, ut inde aer exeat, duos hujus aquæ pollices aeri frigidissimo exponas. Quando gelu adstricta erit, glaciei extrema igne admoto liquefacias, donec utrinque figuram convexo sphericam obtinuerit; aut saltem congeletur aqua in vase concavo, ubi formam sphericam accipiet. Deinde speculum illud soli obvertas tempore meridiano; tunc radii glaciem convexam trajicientes, intra focum communem colliguntur, in quo pulverem pyrium accendent, & flammam ab ipsa quasi glacie erumpere miraberis.

Ex eo quod radii luminis ex aere in vitrum transeuntes, & inde in aerem remeantes ad sese magis accedant, duo nascuntur corollaria. 1. Illustriora sunt objecta quæ trans vitrum convexum cernuntur. Obstat enim hujusmodi vitrum, ne dissipentur radii luminis, & versus oculum nostrum plurimos dirigit, qui ad eum non pervenissent. Eam ob causam artifices, quibus vegeto lumine opus est, quales sunt calatores (*les Ciseleurs*), sculptores, qui plurimum

temporis in subtilissimis operibus consumunt, lampade uti solent, cujus lumen lagenam trajicit rotundam (*un bocal*) tenui vitro conflatam, & aqua nitida repletam. Candelæ vel lampadis flamma huic vasi proxima, in convexam hujus superficiem radios emittit *divergentes*: ii vero, trajectis vitro & aqua, in aerem transeunt, ad sese invicem accedunt, & intra spatium angustius coeunt; inde crescit vis luminis.

2. Vitrum convexum res objectas amplificat; radiorum quippe ab objecti extremis prodeuntium conjunctionem accelerare non potest, quin illud sub majore angulo exhibeat. Si enim duo radii extremi  $EP$  &  $EF$  (*fig. 92.*) remotius jungerentur, angulum efficerent acutiorem angulo  $EFe$ .

### §. 2. De Vitris concavis.

Radii luminis qui ex aere in vitrum concavum oblique incidunt, eoque trajecto in aerem redeunt, fiunt magis *divergentes*, id est, a se invicem remotiores. Quam autem ob causam res ita contingat explanabit *figura 93.*

Sit enim vitrum concavum  $MNRS$  cujus concavitas super  $MN$  suum habet centrum in  $O$ , dum convexitatis inferioris  $RS$  centrum situm est in puncto  $E$ , apertum est lineas  $MO$  &  $NO$  in superficiem concavam  $MN$  ad perpendicularum incidere, siquidem in illius centrum  $O$  coeunt; pariter lineæ  $RE$  &  $SE$  sunt concavitati  $RS$  perpendiculares, in ipsius quippe centrum  $E$  concurrunt. His positis, duo radii paralleli  $AM$  &  $BN$  in vitrum illud concavum incidant; tunc ii radii definient esse paralleli, & fient magis *divergentes*.

Duo enim radii  $AM$  &  $BN$  qui ex aere in vitrum incurrunt, refringuntur, alter ad perpendicularem  $MO$ , & alter ad perpendicularem  $NO$  accedendo. Priori hac refractione incipiunt fieri *divergentes*. Dum vero iidem radii e vitro exeun-

exeuntes, in aerem oblique transeunt, rursus ita refringuntur, ut alter a perpendiculari  $RE$ , & alter a perpendiculari  $SE$  recedat. Posterior hæc refractione eos etiam magis *divergentes* efficit, quod intelligere facile est figuram 93. inspicienti.

Ex dictis tria sequuntur: 1. vitris concavis nullus inest focus, radios quippe luminis dispergunt, nedum eos colligant. 2. Objecta trans vitrum concavum videntur obscurius, quam ubi ea solis oculis intuemur. Hoc enim vitri genus non potest radios luminis a se invicem disjungere, quin minori numero ad oculum perveniant. 3. Objecti per interpositum idem vitrum conspecti imago nobis minor apparet, quam si illud nudis oculis conspiceremus. Vitrum enim concavum, radiorum a duobus objecti extremis emissorum conjunctionem retardat: illud proinde sub acutiori angulo exhibet: at vero quo minor est angulus, sub quo cernitur objectum, eo magis decrescit apparens illius magnitudo.

## ARTICULUS V.

*De Visione.*

**T**Riplicem in paragraphum articulus ille distribuetur. In primo brevem oculi, qui visus est organum, descriptionem præmittemus; in secundo definitiones & theoremata; in tertio varias quæstiones ad visionem pertinentes proponemus.

## PARAGRAPHUS I.

*De Visus organo, sive Oculo.*

**E**X præcipuis corporis humani partibus, in quibus sese prodit summa Creatoris sapientia, nulla est in qua splendidius eluceat quam in oculo. Cum necessarium sit illud organum, ut manuum actiones & pedum motus dirigamus,

mus, antrosum & versus summam capitis partem collocatum fuit. Si alium quæsieris locum muneris, cui destinatum fuit, magis accommodatum, nullum reperiēs. Quia vero maxime delicatum est, a minimisque sordibus laderetur, duabus tegitur palpebris quæ ita accurate sese claudunt, ut vel levissimis corpusculis ipsius aditum intercludant. Duo pilorum ordines quibus muniuntur, oculum a muscarum & culicum incursu defendunt. Incredibili quadam celeritate, nobis etiam invitis, sese claudunt, statim atque periculum imminet, ne quid oculum offendant. Unde manifestum est palpebras eo consilio fuisse a Deo institutas, ut oculum ab omni injuria tutum præstarent, utque pupillæ nitorem & perluciditatem servarent.

Eundem ob finem oculus in ossea quadam cavernula inclusus fuit, quam accurate replet, & ubi tamen mira facilitate & celeritate circumquaque volvitur. Hæc volubilitas oritur, 1. ex quatuor musculis quorum ope sursum & deorsum, dextrorsum & sinistrorsum movetur; 2. ex eo quod oculus quadam adipe involvatur, quæ illorum musculorum motibus facile cedat.

Quæres 1. quam sint præcipuæ oculi tunicæ.

Resp. Tres numerantur. Quæ occurrit prima, dicitur *cornea*. Partem oculi anteriorem obtegit, & digito potest tangi. Ipsi figura maxime convexa est. Suum nomen inde habet, quod plurimum accedat ad cornu translucidi similitudinem. Exhibetur per *Ff* (fig. 94.) In media sui parte radiis liberum permittit transitum. Illius vero pars quæ in oculi globo reconditur, opacior est, quam ut tranluceat, & appellatur *retina*.

Secunda post corneam tunica vocatur *lucida*; designatur per *Hb*. Opaca est, verum in media sui parte foramen habet rotundum, cui nomen *pupille* inditum est. Notatur per *A*. Hæc apertura quorundam ligaminum ope modo con-



contrahitur, cum scilicet uberior luminis copia læderet oculum; modo dilatatur, quando nimirum pauciores sunt, vel debiliores luminis radii, quam ut objecta distincte videantur.

Tertia membrana quæ totam oculi partem anteriorem involvit, vocatur *retina* *LLL*, ob suam cum reticulo similitudinem. Tenuissimis contextitur filis quæ a nervo optico *N* prodeunt: iste enim e cerebro profectus, versus oculi fundum plurimas in fibras sese expandit.

Quæres 2: quoniam sint oculi humores.

Resp: Sunt numero tres. Primus dicitur humor *aqueus*, quia instar aquæ purissimæ limpidus est. Inter corneam tunicam & crystallinum mediam sedem occupat. Figuram habet ex una parte convexam, ex altera vero concavam, quale est vitrum quo manuale horologium (*montre*) tegitur.

Secundus humor vocatur *crystallinus*. Perlucidus est, & aliquid soliditatis habet. Formam gerit lentis ex utraque parte convexæ. Sub humore aqueo & pupilla situs est.

Tertius humor dicitur *vitreus*, quia vitro liquesfacto pene est similis, humore aqueo densior, & minus solidus quam *crystallinus*, paululum concavus in sua parte anteriori, in qua includitur *crystallinus*, veluti adamas in sua funda (*dans son chaton*); at satis convexus in posteriori sua parte, quæ ad fundum oculi spectat.

Quæres 3: quem ad usum illas oculi tunicas, illos humores Deus destinaverit.

Resp: Radii luminis ex objectis emissi, oculum per foramen pupillæ subeunt. Deinde 1. humorem aqueum, 2. vitreum, 3. crystallinum trajiciendo, ita refringuntur, ut incidant in retinam, in qua pinguntur objectorum imagines. Motus quo fibræ, ex quibus textitur retina, a luminis radiis agitantur, ad sedem usque animæ per nervum opticum transmittitur. Inde ve-

ro, juxta leges conjunctionis animæ cum corpore, sequitur ea *sensatio*, quæ *visionis* nomine exprimi solet.

Qua ratione id fiat ut intelligatur, in memoriam quædam sunt revocanda: 1. aer humore aqueo rarior est; 2. humor aqueus crystallino etiam rarior est; 3. densior est humor crystallinus, quam vitreus; 4. radius luminis ex medio rariori in aliud densius oblique transeundo, refringitur ad perpendicularem accedendo; 5. radius luminis e medio densiori in aliud rarius incidens, ita refringitur, ut a perpendiculari deflectat; 6. radius luminis ex uno medio in aliud ad perpendiculum transiens, nullomodo refringitur, quodcumque sit medium in quod incidit.

His prænotatis fit figura 95. Supponimus ex objecto *A* in oculum emitti tres luminis radios *AB*, *AF*, *AL*. Punctum *S* centrum est non solum membranz corneæ *FB L*, sed etiam humoris aquei quem continet, ideoque lineæ *SF*, *SL*, per centrum *S* transeuntes, sunt perpendiculares tum membranz corneæ, tum humori aqueo.

Punctum *P* centrum est *convexitatis* superioris *KI* crystallini *KIMN*; lineæ igitur *PK* & *PI* superiori huic *convexitati* sunt perpendiculares.

Punctum *O* centrum est *convexitatis* inferioris *MN* crystallini *KIMN*, & humoris vitrei qui eam *convexitatem* contingit; ergo lineæ *OM*, *ON* sunt perpendiculares tum parti inferiori crystallini, tum humori vitreo. His præmissis, demonstrare facile est, luminis radios *AF*, *AL* in punctum *a* cum radio *AB* esse coituros, ope scilicet triplicis *refractionis*, quam in tribus oculi humoribus patiuntur.

*Demonstratio.* 1. Luminis radius *AB*, cum omnibus oculi tum humoribus, tum membranis sit perpendicularis, recta tendet in punctum *a*.

2. Radii obliqui *AF*, *AL*, ex aere in humo-

mo-

morem aqueum transeuntes; ita refringuntur, ut accedant alter ad perpendicularem  $FS$ , alter ad perpendicularem  $LS$ : humor enim aqueus aere densior est. Prima hæc *refractio* radios  $AF$ ,  $AL$  ad se invicem inflectere incipit.

3. Iidem radii  $AFK$ ,  $ALI$  ex humore aqueo in crystallinum, qui densior est, commeantes, ad perpendiculares  $KP$  &  $IP$  accedunt: quæ secunda *refractio* eos sibi invicem viciniore efficiet.

4. Humor vitreus minus est densus, quam crystallinus; iidem igitur radii  $AFKM$ ,  $ALIN$  ex humore crystallino in vitreum transeuntes, ita refringuntur, ut recedant alter a perpendiculari  $OM$ , alter a perpendiculari  $ON$ . Nova hæc *refractio* radios  $AFKM$ ,  $ALIN$  ad sese invicem sic admovet, ut in punctum  $a$  simul concurrant cum radio  $ABa$ .

Quæres 4. cur myopes objecta propinqua clare videant, confuse vero ea quæ sunt remota.

Resp. 1. Objecta propiora perspicue vident, quia radii a singulis objecti proximis punctis remissi, plurimum sunt *divergentes*; cum autem myopum oculus sit maxime convexus in membrana cornea  $DPD$ , vel in crystallino  $C$ , (fig. 96) radios *divergente*  $AP$  valide refringit, eosque colligit in puncto  $a$  supra retinam, unde nascitur visio clara & distincta.

2. Myopes nonnisi confuse objecta remota cernunt, quia radii ab huiusmodi objectis remissi, parum sunt *divergentes*; oculus autem myopum illos radios fortiter refringendo, efficit ut in punctum  $N$  concurrant; inde vero a sese sibi invicem remotiores facti, supra retinam usque illuc disperguntur, ideoque debilis confusa est visio.

Myopes, ut objecta nimium distita videant, vitro concavo utantur necesse est: huiusmodi enim vitrum radios  $AP$  magis *divergentes* efficit, priusquam ad oculum perveniant, eosque satis a se invicem sejungit, ut post refractionem in punctum  $a$  supra retinam confluant.

Quæres 5. cur *presbyta* objecta remota clare videant, confuse autem propinqua.

Resp. Radii *AP* ex objecto remotissimo profecti, nonnisi paululum sunt *divergentes*; *presbytarum* crystallinus, qui non satis est convexus, eos radios debiliter tantum refringendo, efficit ut supra retinam colligantur; sicque clara est visio.

Contra vero radii ex objecto viciniore devenientes, longe magis sunt *divergentes*; *presbytarum* igitur crystallinus, utpote non satis convexus, illos radios remissius inflectit; unde fit ut nonnisi ultra retinam in punctum *M* coituri sint. Radii igitur *APM* ad retinam perveniunt sejuncti & dispersi, neque in eam sociatis junctisque viribus agunt, ideoque confusa est visio: illius enim perspicuitas ex vi pendet, quam in idem retinæ punctum exerunt radii.

*Presbytis*, ut objecta propinquiore distincte videant, opus est vitro convexo, quod radiorum disjunctionem (*la divergence*), minuendo antequam oculum subeant, efficit ut supra retinam in puncto *a* colligantur, post novas refractiones quas in oculi humoribus patiuntur.

## PARAGRAPHUS II.

Tradantur quedam Definitiones & Theorematum quæ ad visionem pertinent.

### DEFINITIONES.

**P**rima, radius opticus (*le rayon visuel*) dicitur quivis radius luminis, ab objecto profectus, & trajectis oculi humoribus, in retinam incidens.

Secunda, radii appellantur *convergentes*, quando e diversis objecti partibus prodeuntes, ad sese invicem accedunt, tandemque in punctum aliquod simul coeunt.

Tertia, radii vocantur *divergentes*, cum ab  
co-

eodem objecti puncto devenientes, a se invicem recedunt, & quidem eo magis, quo longius protrahuntur.

Quarta, axis opticus est radius per oculi centrum transiens.

*Theorema 1.* Objecta conspiciuntur per ipsorum imaginem in retina depictam. E singulis enim objecti partibus emittuntur radiorum penicilli, qui in pupilla sese decussantes, objecti imaginem in retina effingunt. Si in fenestra cubiculi obscuri fiat exiguum foramen, & quamdam ad distantiam extendatur linteum album, experientia constat rerum foramini obversarum imagines in linteo exhiberi. Porro idem in retina fieri solet.

*Theor. 2.* Objectorum imagines in retina pinguntur inversæ: radii scilicet ex oppositis objecti partibus prodeuntes, in pupilla sese decussant. Radius ergo a superiori parte, v. g. ab hominis capite, emissus, incidit in partem retinæ inferiorem, & radius ab inferiori parte objecti, ab hominis pedibus proveniens, in partem retinæ superiorem incurrit.

Veritatem hanc illustrabit figura 97. Imago  $GH$  sagittæ  $CAE$  in retina  $G$  inversa esse debet: extremi enim radii  $CH$ ,  $EG$  ad retinam non perveniunt, nisi postquam in puncto  $B$  sese decussarunt. Ideo punctum  $R$  quod dextram in objecto  $CAE$  partem occupat, sinistrorsum in retina pingitur; & punctum  $E$  quod in eodem objecto partem sinistram obtinet dextrorsum in retina exhibetur.

Omni ea de re dubitationem tollet experimentum scitu dignissimum, sed quod sine aliqua industria feliciter tentari non potest: claudendæ sunt cubiculi fores & fenestræ, ut maxime obscurum fiat. Deinde perforetur fenestræ foricula (*le volet de la fenêtre*), ita ut foraminis diameter sit 5 aut 6 linearum. Huic aperturæ aptandus est oculus vituli aut vervecis recens, ita ut pars ipsius anterior foras spectet;

sed prius ex eo detrahenda sunt omnia integumenta, ultimo tamen excepto, quod humori vitreo contiguum est. Si naturalem oculi formam nimia pressione non mutaveris, in ipsius fundo depitas ordine inverso videbis objectorum externorum imagines.

*Theor. 3.* Quamvis objectorum imagines in retina pingantur inversæ, ea tamen in situ naturali videamus necesse est. Ita enim sumus a natura comparati, ut objecta referamus ad radiorum extremitatem, juxta lineas rectas quas describunt radii ad retinam transmissi, ut docet experientia: atqui id fieri non potest, quin corpora in situ eorum naturali conspiciamus, quamvis in situ inverso pingantur supra retinam. Nam linea recta quam percurrit radius *GH* (*fig. 97.*) in punctum sinistrum *H* retinæ incidens ad partem dexteram *C* visæ sagittæ terminatur: linea vere recta quam sequitur radius *EG*, punctum dexterum *G* retinæ occupans, ad partem ejusdem sagittæ sinistram pertingit; ergo mens punctum *H* transfert ad partem extremam *C*, & punctum *G* ad extremitatem *E*; objectum igitur in suo situ naturali videt.

Et vero quemadmodum cæcus objecta exteriora baculis decussatis pertentans, quæ ad sinistram posita sunt, per baculum dextrum percipit, & quæ ad dextram per sinistram; ita dum objectum in parte oculi sinistra delineatur, illud natura duce ad partem dextram referimus, & vice versa.

Contendunt nonnulli recentiores inter quos *D. D. de Buffon* & *de Condilhac*, objecta infantibus reipsa videri inversa, eumque errorem postea manuum magisterio corrigi, quæ probe videndi rationem nos edocent: sed immerito prorsus; tum quia animantia manibus destituta semper objecta in ordine inverso cernerent, tum quia error ope manuum emendari non posset; dum enim manus deorsum porrigeretur, eam  
 far-

furfum attolli judicaremus; tum quia id nullo potest experimento confirmari.

*Theor. 4.* Ubi duobus oculis idem objectum intuemur, unicum debet apparere; quamvis in utroque pingatur ipfius imago. Illud inde fit quod impressiones in utroque oculos excitata, ad unum & idem objectum referantur. Visionem enim semper referimus ad extremitates axium opticorum; illi vero in idem punctum concurrunt.

Alteram hanc causam ingeniose sic proponit D. Nollet; La membrane qui tapiffe le fond de l'œil, & sur laquelle se peint l'objet, est un tissu de fibres, qui appartiennent au nerf optique; & nous avons lieu de croire, que dans le deux yeux d'un même individu, ces membranes, pour l'ordinaire, se ressemblent par le nombre; l'arrangement, & peut être par le degré de ressort des files nerveux qui les composent. Cela étant ainsi, dès que les deux yeux se dirigent vers un même objet, les images tombent dans l'un & dans l'autre, sur des parties semblables & correspondantes du tissu dont je viens de parler; & les deux sensations qui en résultent, étant, pour ainsi dire, à l'unisson l'une de l'autre, ne font naître dans l'ame, qu'une seule & même idée, plus forte & mieux décidée, que par une seule image; mais toujours identique, à peu près comme le son qui frappe les deux oreilles, ou l'odeur qu'on reçoit dans les deux narines. Il suit de-là qu'on doit voir l'objet double, quand les deux images tombent au fond des yeux, sur des parties qui ne sont pas analogues, ou correspondantes; & c'est en effet ce qui arrive, quand ces parties semblables ne se trouvent pas jointes du côté du même objet, comme on peut l'éprouver soi-même, en pressant un peu de côté l'un des deux yeux pour le détourner. (Tom. 5. pag. 498.)

*Theor. 5.* Claritas visionis pendet, 1. ex luminis copia. Radii quippe singuli ex objecto devenientes, ad visionis claritatem conferunt; 2. ex pu-

pupillæ capacitate: quo enim latior est, eo plures radios ad retinam transmittit e variis objecti partibus reflexos; 3. ex humorum qui in oculo continentur perluciditate, ex qua fit ut major radiorum numerus ad retinam perveniat; 4. ex idonea nervi optici constitutione & fibrarum retinæ tensione, quia tunc facilius commovetur retina, suosque motus ad cerebrum usque vegetius traducit, ac proinde clarior esse debet visio.

*Theor. 6.* Corpora eo judicamus remotiora, quo confusius, eoque propiora quo distinctius perspiciuntur. Quo enim magis distant objecta, eo debilius est lumen ab iis reflexum, ideoque majorem esse ipsorum distantiam existimamus, cum videntur confusius. Hinc 1. iter per noctem facientibus flammæ & ignes videntur propiores, corpora autem opaca, ut arbores, ædes, &c. remotiora judicantur, 2. Quia lumen siderum propter varias crebrasque refractiones eo fit debilius, quo sunt horizonti propiora, idcirco ea longiori intervallo a nobis distare credimus, quando sunt horizonti viciniora; 3. pictores, ut objecta quædam in longinquo, quædam autem in propinquo exhibeant, alia vividis, alia obscuris coloribus vestiunt.

*Theor. 7.* Objecta eo magis diffita judicantur, quo plura & diversa in spatiis interpositis corpora cernuntur; ob rationem contrariam propiora censentur. Quando enim plura & diversa in spatiis interjectis corpora conspiciuntur, major æstimari solet distantia, quam intermediis illis corporibus metimur, quamvis reipsa minor sit. Hinc 1. horizon videtur cælo contiguus, quia inter eum & cælum nullum corpus apprehenditur, 2. Turres, domus, aliaque corpora videntur montem aut collem contingere, quando non conspiciuntur valles interpositæ.

Inde in æstimanda distantia plurimus error dimanat. Sic viatores qui per mare iter facere nondum consueverunt, duabus aut tribus tantum



tum leucis diffitam arbitrantur insulam, quæ tamen decem & amplius leucis distat. Cum enim spatium inter eos & insulam interjectum, plaga sit uniformis, nihil videt oculus, quo possit illud intervallum in partes distinctas dividere, easque numerare. Idem fere contingit erga corpora quæ cernimus in extrema plântie longissima, quam nec arbores, nec ædes, nec aliud quoddam notabile objectum interruptit.

*Theor. 8.* Superficiorum dimensiones eo minores videntur, quo sunt ab oculo remotiores. Apparens enim rei objectæ magnitudo instar mensuræ habent angulum opticum sub quo cernitur, & quem efficiunt duo radii qui a duobus objecti extremis prodeuntes, in pupillæ centro sese offendunt; ex. g. angulus  $BFA$  (fig. 98.) angulus est opticus sub quo videtur objectum  $AB$  ab oculo, qui in puncto  $F$  constitutus fingitur. Porro quo remotius est objectum, eo minor est angulus opticus. Sic objectum  $AB$  distans ab oculo intervallo  $EC$ , conspicitur sub angulo  $BCA$ , qui multo acutior est angulo optico  $BFA$ , sub quo cernitur idem objectum  $AB$ , quando non removetur ab oculo, nisi distantia  $EF$ .

Hinc deducitur ratio propter quam spectatori duas inter lineas parallelas posito, earum extrema eo magis ad se invicem accedere videntur, quo sunt ab oculo remotiora. Sic porticum & ambulatorum latitudo eminus spectata, iis coarctata apparet, qui inter eorum latera parallela sunt constituti. Sit enim ambulacrum aliquod  $ABCD$  (fig. 99.) cujus latitudo ubique sit æqualis  $AC$ ,  $FG$ ,  $BD$ , spectatori in puncto  $E$  versanti, linea  $FG$  quæ propior est, major apparebit, quam linea  $BD$ , licet ambæ sint æquales. Ratio est, quod linea  $FG$  videatur sub angulo optico  $FEH$ , qui major est angulo  $BED$ , sub quo conspicitur linea  $BD$ . Quamobrem ambulacri latitudo eo minor videbitur, quo longinquiore e loco eam spectaveris.

Pariter ubi porticum ingredimur, depressior nobis videtur in altera parte extrema, quia angulus opticus, cujus basis distantiam tabulati-  
laqueari complectitur (*la distance du plancher au plafond*) necessario fit minor, quando intervallum illud sumitur in loco qui ab oculo remotior est.

*Theor. 9.* Spectator in plano lineæ cujusvis longissimæ & remotissimæ positus, eam videt tanquam arcum circuli, cujus centrum ipse occupat. Cum enim radiorum ab oculis ad singula hujus lineæ puncta ductorum inæqualitatem, utpote exiguam, cognoscere & æstimare non possit, omnes radii videntur æquales. Objecta ergo quæ in variis præfatæ lineæ punctis existunt, ipsi apparent posita in circumferentia, cujus ipse centrum occupat.

Hinc nonnulla corollaria sic deducit D. de la Caille. 1. Qui versatur in planitie vastissima, in circuli centro constitutum se existimat, in circumferentia vero existere objecta excelsa & remota. Præterea, quamvis progredi non destinat, in eodem fere loco se consistere putat, quia semper in centro se videt. 2. Sphæræ remotissimæ, quales sunt sol & luna, non apparent nisi tanquam superficies planæ & rotundæ. 3. Turris quadrata, vel polygona videtur rotunda, imo & plana, quando conspicitur e longinquo.

*Theor. 10.* Objecta nobis videntur quiescere, cum eorum imagines eandem occupant retinæ partem. Tunc enim radii ex objectis devenientes, sunt immoti. Hinc corpora remotissima, quamvis reipsa moveantur, nobis tamen quiescere videri debent. Ipsorum quippe imago eandem retinæ partem occupare pergit. Spatium enim quod intra breve tempus percurrunt hujusmodi corpora singulum in oculo efficit, ita exiguum, ut percipi nequeat.

*Theor. 11.* Objecta videntur moveri, quando ipsorum imagines in oculi fundo moventur: sive  
diver-

diversas retinæ partes successive occupant. Imagines enim illæ intra oculum moveri nequeunt, quin objecta quæ per eas exhibentur e loco in locum transferri videantur.

*Theor. 12.* Quoties motus communis sub sensum non cadit, toties motus in objecta vicina refunditur. Id constat 1. experientia, Navigantibus enim stare navis videtur, & ipsius motum in littora transferunt. 2. Ratione: quandiu scilicet motus communis non percipitur, in oculo spectatoris nulla fit mutatio respectu illius corporis quicum movetur; frequens autem in oculis contingit mutatio, respectu objectorum externorum.

*Theor. 13.* Si duo corpora eadem celeritate moveantur, aliud vero tertium quiescat, duo priora stare videbuntur, & tertium ferri in partem contrariam. Sic nubes motu celerrimo abreptæ judicantur quiescere, luna vero in partem oppositam transferri: ratio est, quia nubes quæ eadem velocitate rapiuntur, secum invicem comparatæ, situm non mutant, ideoque altera respectu alterius videtur quiescere. Si vero cum luna comparentur, variæ ipsius partes, aliæ post alias iis nubibus respondent, ideoque luna in partem oppositam translata apparet.

*Theor. 14.* Quæ celerrime agitantur, omnia simul spatii quod describunt puncta videntur occupare. Sic quando citharæ fides vehementius pulsantur, ipsarum vibrationes totum simul per quod sese extendunt spatium implere juraveris. Pariter titio accensus in orbem velociter circumactus, igneum describere circulum judicatur, in singulisque circumferentiæ punctis simul existere. Ratio est, quia vibratio quam radii luminis in retina excitant singulis momentis, eo, v. g. quo titio flammeus orbem describere incipit; ista, inquam, retinæ vibratio, ac proinde impressio in mente facta, aliquandiu perseverat, donec circulum fere integrum absolverit titio accensus.

## PARAGRAPHUS III.

*Proponuntur nonnullæ quæstiones ad visum  
nem pertinentes ..*

**Quæres 1.** CUR, capite vehementer percusso, subito quidam luminis tractus videantur.

**Resp.** Ex gravi percussione fit, ut capitis partes, ideoque nervi optici fibræ vehementius commoveantur, quarum ex vibratione subitus luminis sensus in mente exoritur.

**Quæres 2:** Quam ob causam, qui e media luce in locum obscurum sese conferunt, nihil omnino videant; & cur iidem, quando e tenebris ad lumen redeunt, non solum caligent, sed etiam ab oculis doleant.

**Resp.** Cum in luce vividiori versamur, pupilla sese contrahit, ne admittat nimiam radiorum copiam, quæ nervum opticum læderet. Pupilla sic coarctata pauciores in obscuro loco radios excipit, quam ut retinam eo modo commoveam, qui ad visionem est necessarius. Idcirco qui ex splendida luce in obscurum locum transeunt, statim nihil visu percipiunt.

Postquam vero ibi aliquandiu commorati sunt, pupilla valde diducitur, & pluribus radiis transitum præbet, qui retinam afficiunt, & tunc apparere incipiunt objecta quæ prius erant inconspicua. Ubi e tenebris ad lucem fit reditus, tunc radii luminis per pupillam valde dilatatam tanta copia in retinam irruunt, ut eam vehementius concutiant. Inde nascitur caligatio, & dolor ab oculis.

Per illam pupillæ amplificationem & coarctationem multa explicantur.

1. Cur aquila irretortis oculis solem contueatur: pupillam scilicet ita contrahunt, ut non nisi paucissimos admittat radios. Hæc pupillam tantopere contrahendi facultas, omnibus non

com

concessa fuit animantibus. Hinc solem nudis oculis intueri non possumus: si tamen chartam acicula perforatam adhibeas, tunc per exiguum illud foramen poteris solem impune conspiceret. Res enim perinde se habet, ac si pupilla tenui illo foramine latior non esset..

2. Cur bubones & noctuæ lucem solis sustinere nequeant: illorum scilicet animalium pupilla contrahi non potest. Unde nimiam radiorum copiam excipere cogitur, quæ retinæ fibras fortius percellit, ideoque offendit..

3. Cur feles noctu videant: ita nimirum comparata est ipsorum pupilla, ut sese plurimum expandere possit. Eam igitur noctu sic dilatant, ut tenuissimæ lucis, quæ per noctem superest, radii ad retinam eo numero perveniant, qui ad visum sufficiat. Cum retinam habeant delicatissimam, ipsis non opus est nisi tenuissimo lumine..

Quidam extiterunt homines qui etiam noctu viderent. Tatis fuit Tiberius, teste Plinio. Ratio est, quia tenerrima & mobilissima erat ipsorum retina, ideoque facile commoveri poterat a lunæ vel stellarum radiis in objectâ incidentibus, a quibus in oculos reflectebantur..

Quæres 3. cur faces accensæ majore eminus in tenebris appareant, quam cominus..

Resp. Aer flammam immediate ambiens, & vivida luce perfusus, propter splendorem suum ab ipsa flamma in tenebris e longinquo non discernitur, sicque crescit: apparens hujus flammæ diameter; ubi autem oculus flammæ propior est, aeris circumfusi fulgorem ab ipsa flamma distinguit..

Quæres 4. cur sol & luna majores videantur, cum supra horizontem ascendere incipiunt, quam ubi meridianum attigerunt..

Resp. Hujus phænomeni duplex afferri potest ratio: 1. quando sol & luna supra horizontem assurgere incipiunt, quasi in tenebris versamur: atqui jam ostendimus facem accensam eminus in tenebrisque conspectam, multo majorem exhiberi;

beri ; inde ergo fieri debet , ut sol & luna majores appareant in horizonte , quam in meridiano .

2. Eadem sidera , cum pervenerunt ad meridianum , radios luminis emittunt , qui aerem ad perpendicularum subeunt , ac proinde nullam patiuntur refractionem . Contra vero ubi prope horizontem posita sunt , radii luminis ab iis profecti , oblique in atmosphæram incidunt , quæ diversos continet vapores ; illi igitur radii crebris refractionibus sunt obnoxii , quæ angulum opticum amplificant . Sic radii globulum vitreum aqua plenum trajiciendo , ita refringuntur , ut angulum opticum majorem efficiant , & objecti trans globulum conspecti imaginem plurimum augeant .

Quæres 5. quam ob causam stellæ interdum (*en plein jour*) non videantur .

Resp. Stellæ per diem fieri inconspicuas , quia lux solis , utpote multo vegetior , retinam longe vehementius afficit , quam remissum stellarum lumen , cujus proinde impressio in retinam fit nulla , neque sub sensum cadit . Quæ ratio prorsus certa est , si verum sit quod ajunt , scilicet ex imo puteo stellæ per diem conspici : earum quippe lumen tunc in oculum speculatoris ad perpendicularum incidit ; radii vero solis qui non supponitur puteo imminere , ad ipsius fundum non perveniunt , nisi postquam innumeris reflexionibus debilitati fuerint .

## ARTICULUS VI.

### *De Coloribus .*

**I**N coloribus quantum sit utilitatis , & quam splendide in eorum varietate eluceat summa Dei benignitas , sic describit Philosophus elegans & christianus .

*Les couleurs font le charme des yeux & sont un des plus doux agrements de la vie . Elles tiennent rang parmi les plus beaux présens du Créateur .*

teur. Si nous -en étions privés, nous verrions tout, & nous ne distinguions rien. Tout le terre seroit comme une campagne couverte de neige, dont la blancheur, malgré son éclat, empêche par son uniformité de distinguer les objets. L'intention de nous faire promptement distinguer les objets, n'est pas la seule qui ait donné naissance aux couleurs. Ici, comme en toute autre chose, Dieu s'est occupé de nos plaisirs, comme de nos besoins. Quel autre dessein, que celui de nous placer dans un agréable séjour, en a orné toutes les parries de peintures si brillantes & si variées? Le ciel & tout ce qui est vu de loin, ont été peints en grand, l'éclat & la magnificence en font le caractère. La légèreté, la finesse & les graces de la miniature se retrouvent dans les objets destinés à être vus de plus près; comme sont les feuillages, les oiseaux, les fleurs; & de crainte que l'uniformité des couleurs ne devînt en quelque sorte ennuyeuse, la terre change de robe & de parure selon les saisons. Il est vrai que l'hiver lui enlève une grande partie de ses beautés; mais il ramène un repos utile à la terre, & plus encore à celui qui la cultive. Tandis qu'il retient l'homme dans sa retraite, à quoi bon la terre se pareroit-elle; pour n'être point vue de son maître? (Spect. de la Nat. tom. 4. pag. 158.)

In explicanda colorum causa plurimus fuit Physicorum labor, & magna opinionum diversitas. Prætermisissis autem aliis, quæ jam obsoleverunt, eam tantum exponemus, cujus parens fuit clarissimus Newton. Tam variis confirmata fuit experimentis, ut in ea admittenda satis concordēs sint Physici recentiores. Juxta Newtonem, radii luminis ex natura sua hunc vel illum colorem procreant. Ex. gr. unus est radius quem vocat rubrum, quia colorem illum ex natura sua sibi adjunctum habet; alius est quem caruleum appellat, quia pariter ad excitandum ejusdem nominis colorem destinatur; adeo ut, quæ-

cum-

cumque mutatio radiis obtingerit, suum colorem ingenitum semper retineant. Ut autem probe intelligatur hæc sententia, quædam prænotare necesse est.

1. Juxta Newtonem, duplicis generis sunt radii solares, alii *simplices*, alii *compositi*. Simpliciter ii sunt qui ex aliis non coalescunt, eundemque semper colorem exhibent. Hujusmodi septem ab ipso numerantur: scilicet ruber, aureus (*l'orange*), flavus (*le jaune*), viridis, cæruleus (*le bleu*), indicus (*l'indigo ou le pourpre*), violaceus (*le violet*).

Radii *compositi* dicuntur ii qui ex radiis simplicibus & primigeniis constantur, & qui diversos efficiunt colores, prout ex pluribus vel paucioribus radiis simplicibus constant.

2. Contendit radios simplices, quibus suus insitus est color peculiaris, diversis modis refringi, id est, eos, licet sub eodem angulo incidant, variam tamen pati fractionem; v. g. radius ruber minus refringitur quam aureus, aureus minus quam flavus, & sic deinceps.

3. Radii qui magis refringuntur, facilius etiam reflectuntur; ex. g. quia radius cæruleus magis refringitur quam ruber, probat Newton eum facilius reflecti.

4. Tandem docet Newton colorem album suam ex omnium radiorum simplicium permissione originem ducere; ita ut color aliquis ad album plus minusve accedat, quo plures aut pauciores simul commiscuntur luminis radii. Quapropter, juxta Newtonem, ideo corpora colorem album induunt, quia omnes luminis radios reflectunt; quædam autem nigro colore perfusa conspiciuntur, quia omnes luminis radios absorbent: alia vero colore rubro vel cæruleo, &c. tincta cernuntur, quia radios, rubros vel cæruleos reflectunt; adeo ut objecta hunc vel illum colorem præ se ferant, prout his vel illis radiis remittendis idonea sunt. Quæ omnia cum experimentis consentiunt. Sit itaque

PRO-



## PROPOSITIO I.

*Lumen constat ex radiis specie diversis.*

Prob. **S**I luminis fasciculus in prismatico vitreo excipiat, in septem radios varie coloratos resolvitur, rubrum scilicet aureum, flavum, viridem, cæruleum, purpureum & violaceum; ergo lumen solis ex radiis specie diversis constat.

## PROPOSITIO II.

*Radii specie diversæ variis modis refringuntur.*

Prob. **I**lli radii variis modis refringuntur, qui sub eodem angulo in idem medium incidentes, diversam patiuntur fractionem: atque radii specie diversæ sub eodem angulo, &c. Per tubulum enim fenestræ foramini insertum inducatur in cubiculum obscurum luminis fasciculus  $SO$ , & incidat in angulum prismatis trianguli  $D$ , (fig. 100.) angulus ille sit 60. circiter graduum. Tunc fasciculus luminis  $SO$  a prima directione  $OI$  deflectens, in puncto  $O$  refringetur, in chartaque candida  $MN$ , a prismatico  $D$  16 aut 18 pedibus remota, septem exhibebit radios a se invicem secretos, eoque ordine dispositos: ruber, qui minus quam alii refringitur, conspicuus erit in 1, aureus (*l'orangé*) in 2, flavus in 3, viridis in 4, cæruleus (*le bleu*) in 5, indicus (*l'indigo ou le pourpre*) in 6; tandem violaceus, qui omnium maxime refringitur, occupabit spatium 7. Ergo, &c.

Radii rubri semper minus quam alii inflectuntur, id est, minus recedunt a prima & communis directione  $OI$ . Illud inde fieri debet quod radius ruber majori mole polleat. Ideo eo minus a via sua detorquetur, quia plus habet virium; ille autem virium excessus a majori vel-

locitate non oritur ; siquidem 7. vel 8. minuta , sicut & alii , impendit ut percurrat spatium inter solem & oculos nostros interjectum ; superest igitur ut vis efficacior , qua causæ refringenti , nempe prismati *D* , magis quam alii resistit , a majori ipsius mole repetatur .

Radii violacei semper magis quam alii frangi sunt . Id autem contingere verisimile est , ex eo quod minor sit eorum moles , ideoque debiliori vi motrice polleant . Quam ob causam prismati refringenti *D* facilius cedunt & obsequuntur .

Eandem ob rationem alii radii eo magis franguntur , quo minorem causæ refringenti molem opponunt : radorum igitur massicula *successive* decrescit , a rubris ad violaceos progrediendo , eo scilicet ordine quem in experimento mox exposito observavimus .

Rubri majorem habent molem , deinde , semper decrescendo , aurei , flavi , virides , cærulei , indici , violacei .

### PROPOSITIO III.

*Radii qui magis refringuntur , facilius etiam reflectuntur .*

Prob **E**Xperientia constat radios cæruleos magis refringi quam rubros : atqui facilius etiam reflectuntur . Minor quippe adhibenda est in prisma obliquitas ad radios cæruleos , quam ad rubros reflectendos : si enim prisma , cujus ope color ruber & color cæruleus in charta pinguntur , ita contorqueas , ut in illud lumen eo obliquius incidat , quo magis invertitur prisma ; color cæruleus e charta evanescit , antequam ruber deleatur , ergo minor requiritur in prisma obliquitas ad radii cærulei , quam ad rubri reflexionem ; ergo radius cæruleus facilius resistit quam ruber , ergo , &c.

PRO.

## PROPOSITIO IV.

*Luminis radius simplex eundem semper colorem retinet, quocumque modo reflectatur aut refringatur.*

Prob. **P**ERFORETUR charta *MN* (fig. 100.) in loco *F* quem occupat radius ruber. Iste ultra chartam progressus, excipiat in alio prismatico *P*, & inde in varia corpora incidat, quorum occurſu diverſis modis reflectatur aut refringatur: atqui experimento conſtat radium illum, quamvis multiplici reflexione & fractione vexatum, eundem ſemper colorem exhibere, nec alium diverſum induere. De aliis radiis idem teſtatur experientia; ergo, &c.

## PROPOSITIO V.

*Color albus ex radiorum ſimplicium permixtione oritur.*

Prop. **F**ASCICULUS luminis per cubiculi obſcure foramen rotundum illapſus, recipiatur in prismatico, ex quo oblique egreſſus incidat in lentem vitream 4. circiter pollicibus latam, ſexque pedibus a prismatico diſjunctam. Deinde radii in charta excipiantur. Quando iſta inter focum & lentem ſita eſt, tunc luminis radii diverſos exhibent colores; ubi autem in ipſo foco charta ponitur, tunc luminis radii colorem album procreant: atqui experimentum illud invicte probat albedinem in radiorum ſimplicium permixtione conſiſtere; ſiquidem radii omnes in lentis vitree foco colliguntur; ergo, &c.

## PROPOSITIO VI.

*Corpus ideo nigrum apparet, quod omnes radios absorbeat.*

Prob. 1. **Q**uia. tum putei altissimi fundus, tum aperta cubiculi fenestra, tum aditus spelunæ, quæ luminis radios absorbent, nigrum exhibent colorem. 2. Charta nigra in foco speculi urentis promptius ignem concipit, quam si alio colore tingeretur. 3. Globus partim niger, partim albus, si radiis solaribus exponatur, citius qua parte niger est, incallescit: quæ omnia probant illud esse corporibus nigris proprium, ut omnes fere luminis radios hauriant.

Eam ob causam vitra, quibus interpositis solem intuentur, fumo solent obducere Astronomi, ne major radiorum copia in oculum irruens, eum offendant. Tunc sidus colore flavo qui ad rubrum accedit, tinctum videtur. Ex omnibus animæ luminis speciebus, hæ sunt vegetiores, quæ colorem flavum & rubrum habent sibi inditum; idcirco sese ab illa opacitate expediunt, in quæ hærent aliæ, vel extinguuntur.

## PROPOSITIO VII.

*Colorum diversitas qua corporibus sese prodit, eo pendet, quod nonnullos radios abundantius reflectat, quam alios quoscumque.*

Prob. **C**orpora eo colore tincta videri debent, qui vividior in mente sensum excitat: atqui ubi corpus quosdam radios, v. g. rubros, copiosius reflectit, quam alios quoscumque, tunc radii rubri mentem nostram vividius afficiunt. Et vero albedo ex omnium radiorum commistione nascitur; si ergo corpora singula radios omnes ex æquo reflecterent, nihil esset quod candido colore persusum non videretur.

deretur; ideo igitur quædam corpora non sunt alba, quia radios omnes pariter non regeant. Itaque ea corpora sunt rubra, quæ ejusdem nominis radios uberius remittunt, quam alios cujuscunque generis; pariter ea corpora cærulea apparent, quæ radiis cæruleis majori copia regenerandis aptiora sunt. Cur vero quædam corpora quosdam luminis radios reflectant, potius quam alios, causa repetenda est ex partium insensibilium contextu, dispositione, figura, ex quibus fit, ut alia corpora his, alia vero illis radiis abundantius reflectendis magis sint accommodata.

Dices: juxta placitum Newtonianum, pratum nobis viride apparet; quia radios virides reflectit, & alios absorbet: at vero idem pratum trans vitrum rubeum si contuearis, tunc prorsus rubeum tibi exhibebitur; deinde pratum illud inspicias trans vitrum flavum aut violaceum, tibi videbitur colore flavo vel violaceo tinctum; porro experimentum illud omnibus notissimum opinionem Newtonianam funditus evertit.

Resp. Experimentum illud quod prima fronte cum sententia Newtoniana pugnare videtur, cum ea tamen facile conciliari.

1. Innumeris constat experimentis, post refractionem quæ luminis fasciculum resolvit in septem radiorum diversas species; constat, inquam, speciem unam ab aliis segregatam, v. g. viridem, suum colorem semper retinere, cujuscunque coloris sit corpus quo refringitur vel reflectitur; ergo radii quos remittit pratum, vel aliud corpus, non sunt virides soli, & ab aliis radiis rubris, violaceis, flavis, &c. omnino secreti.

2. Pratum sine vitro colorato conspectum, viride nobis apparet, quia versus oculum nostrum radios virides remittit, numero longe plures quam alios; quamvis tamen multos aliterius cujuslibet speciei radios ad oculum nostrum regeat, rubeos, flavos, violaceos, purpureos; oculos igitur nostros vividius afficiunt radii virides,

rides, aliorumque impressionem, utpote multo debiliorem, elidunt.

4. Quando trans vitreum coloratum, v. g. rubrum, cernitur idem illud pratum, tunc evanescit illius color viridis; non quia deficit pratum maximam radiorum viridum copiam emittere; sed quia isti a vitro rubeo vel absorbentur, vel dissipantur. Ideo tunc pratum rubro colore tinctum videtur, quia radii rubei cum viridibus reflexi, sed numero longe minori, soli poros vitri rubei sibi accommodatos libere permeant, ad oculumque perveniunt.

Instab. Responsum mox datum pugnancia involvit: Sit enim vitrum quodam colore, v. g. rubro infectum. Si quaesierim cur vitrum illud videatur rubrum in promptu causa est, inquires; scilicet vitrum istud radios rubros reflectit, & alios absorbet. Si deinde rogitem, cur eodem illo vitro prope oculum constituto, obvia quæque appareant rubicunda, illico mihi respondebis vitrum istud aditum solis radiis rubris liberum permittere, aliosque omnes absorbere vel repellere; idem igitur vitrum solos reflectit radios rubros, iisdemque solis liberum dat transitum, qua in re aperta est contradictio.

Resp. Quod idem corpus radios omnes rubros reflectat, & quibusdam liberum permittat transitum, id manifeste pugnat; quod vero idem objectum ex radiis rubris alios repellat, & alios admittat, in eo sane nihil est contradictionis.

Vitrum rubro colore tinctum omnes radiorum species, exceptis rubris, licet modus nos lateat, absorbet vel dispellit. Quoad rubros, alios reflectit qui in partes ipsius solidas incurrunt, alios vero intra poros suos admittit, qui libere permeant. Pars radiorum quæ reflectitur ad oculum delata qui vitrum intuetur, illud sub colore rubro exhibet; pars autem quæ ultra vitrum transmittitur, in oculo qui post vitrum situs est, colore

etiam rubro, & objectum a quo missa fuit, & ipsum vitrum pingit.

## ARTICULUS VII.

### *De Phosphoris.*

**PHOSPHORI** nomine generatim intelligitur substantia, quæ excitando in tenebris luminis sit idonea. Cum autem plurimas hujusmodi substantias nobis offerat natura, & aliunde ars ejus æmula multas prioribus consimiles suppeditet, phosphori merito dividuatur in naturales & artificiales.

### *De Phosphoris naturalibus.*

Ad eam classem multa pertinent insecta, inter quæ non infimum locum illud tenet, quod vulgari nomine dicitur gallice *ver luisant*, de quo sic habet D. Nollet: *Ce petit animal est la femelle d'un scarabée de couleur brune. On appelle scarabée en général, ces insectes volans, dont les ailes se renferment sous des fourreaux écailleux. Le hanneton, par exemple, est un scarabée.* Non toto in corpore lucet, sed in parte tantum ventris inferiore, cujus pellis translucida est. Quod emittit lumen, oritur ex materia fluida quam suis in visceribus continet. Hoc fluidum per aliquot adhuc minuta coruscat, postquam illud expresseris, partem corporis in qua residet comprimendo. Corruscationem hanc vel excitare, vel cohibere sua sponte videtur; non semper enim eundem exhibet splendorem eumque aliquando penitus subtrahit.

Numero pene infinita sunt animalia quæ eadem proprietate pollent. In Hispania, Italia, Sicilia, in nonnullis etiam e nostris provinciis meridionalibus, per æstivas noctes aer undique

videtur scintillare. Mirabile illud spectaculum debetur tenui scarabæo, qui in Italia dicitur *luciola*. Mirum est quantum annis quibusdam sobolescat illud scarabæorum genus. Ipsi lumen e ventre prodicens, adeo continuum est ac vegetum, ut duo vel tria ex iis insectis in tubo vitreo inclusa, per noctem obscurissimam conclaves ea luce collustrent, quæ sufficiat ad objecta quæque distincte cernenda. Sed vividius etiam fit hoc lumen, ut notat D. Noller, quando insectum volitat, aut agitur.

In insulis gallice dictis *les Antilles*, & plurimis Indiæ locis, reperitur aliud insectum majusculum, a quo emittitur lumen longo diurnum ac splendidius. Quædam est muscæ species circa quam multæ sunt D. de Réaumur observationes, (Tom. 5, *hist. insect.*) De insecto illo mentionem facit Pater Duret in sua generali *Antillarum historia*. Narrat hujus regionis incolæ illius animalis lucem adhibere in efficiendis operibus suis, dumque huc & illuc concursant. Idem insectum lumen per 15. circiter dies suppeditat, quibus elapsis, aliud in prioris locum substituitur.

Luciferis etiam insectis mare ipsum non destituitur. Qua de re nihil accuratius simul & elegantius dici potest, quam quod narrat D. Noller: *On voit briller de ces feux vivans jusque dans le sein des eaux; sans parler des daïsi, ni de quelques autres coquillages admis depuis long temps au rang des phosphores; je puis dire, pour l'avoir observé moi-même en 1749, que pendant l'été, les bords de l'Adriatique & de la Méditerranée fourmillent de petits animaux moins gros que des rêtes d'épingles, & qui brillent d'une manière admirable. On en voit surtout une grande quantité dans les lagunes de Venise, aux endroits où il y a de la mousse, ou de cette herbe qu'on appelle algue marine. C'est là que j'en fis la découverte, après avoir cherché avec beaucoup d'empressement & d'assiduité quela-*  
le.



le pouvoit être la cause de tous ces feux que je voyois pèsiller le soir sous les coups de rames, à la rencontre des gondoles, & le long des murs battus par les flots.

Non solum plurima lucere videntur animalia, quibus dotem hanc natura concessit quo tempore vivunt; sed ea ipsa quæ illa proprietate, dum viverent, fuerant fraudata, post mortem lucida evadunt; quando scilicet luminis materia, quæ in ipsis captiva residet, quodam putrefactionis gradu adjuta, suis e vinculis sese expedire potest, forasque prodire. Cujus rei exempla sic affert idem Physicus: Anteliani, inquit, visæ sunt omnes macelli carnarii (d'une boucherie) carnes notis luminosis inspersæ, ita ut his uti cives reformidarent. Non semel in vicorum angulis (coins des rues) cloacis fulgentes videntur piscium reliquæ. Felium, quorundamque aliorum animalium pili sub manu eos perfricante scintillant, dum præsertim sævit frigus. Multi sunt homines, qui obscuro in loco crines depectere non possunt, quin videant, imo & audiant igniculos suis e capillis crepirando exsistentes. Hujusmodi fulgoribus territi aliquando famuli stabularii (valets d'écurie) sibi persuadent quosdam equos a lemuribus curari (sont pansés par les esprit follets). Pingues tandem quidam vapores, e corporibus viventibus avolantes, interdum sponte sua inflammantur, levemque & innoxium ignem procreant. Tenuis hujusmodi flammulæ in veterum & recentiorum scriptis non semel descriptæ sunt sub nomine *ignis lambentis*.

Similia phænomena nobis offerunt substantiæ vegetales. Plurimæ enim sunt quæ lumine naturali & spontaneo colluceant. Ligna tenera & putrida per noctem lumen retinent, quo per diem imbuta fuerunt. *Olaus magnus*, aliique multi peregrinatores testantur, phænomenum illud in plagis borealibus ita esse conspicuum, ut viatores jubeant a suis ducibus præ se ferri

lignorum hujusmodi lucidorum fragmenta, quibus prælucentibus, iter sine erroris periculo conficiunt.

Tanto numero sunt in triplici genere animalium, vegetantium & fossilium phosphori naturales, ut eos recensere non sinat brevitatis. De his sane differit D. Beccari artis Chymicæ professor Bononiæ, in opere cui titulus: *De quam plurimis phosphoris nunc primum detectis Commentarius*. De phosphoris artificialibus nunc quædam sunt delibanda.

#### De Phosphoris artificialibus.

Quemadmodum naturales, ita & artificiales phosphori tanto sunt numero, ut dicere non dubitaverit D. Dufay: *Dans quel étonnement ne seroient pas aujourd'hui ceux qui ont fait des volumes entiers pour faire l'éloge des propriétés merveilleuses de la pierre de Boulogne, s'ils voyoient qu'il est presque impossible de trouver quelque matière dans le monde, qui n'ait pas les mêmes avantages? & ce sera dorénavant un phénomène singulier qu'une matière qu'on ne pourra pas rendre lumineuse, ni par calcination, ni par dissolution.* (Mém. de l'Acad. des Sciences pour l'année 1730., pag. 534.)

Inter phosphoros artificiales præsertim eminent phosphorus urinæ, lapis Bononiensis, phosphorus mercurii. 1. Phosphorus urinæ e civitate Amburgensi (de Hambourg) nomine Brandz inventus est, & quidem casu fortuito, dum scilicet inquirendo lapidi philosophico daret operam. Deinde a D. Kunckel Anglo & artis Chymicæ peritissimo ad perfectionem deductus est, ideoque nuncupatus *phosphorus anglicanus*. Conficitur ex urina sæpius distillata, & salinis sulphureisque partibus constat: instat baculi rigidioris & coloris flavi servatur in phiala aquæ plenâ, particule enim aquæ, dum phosphori meatus occludunt, ne avolent partes igneæ prohibent.

Aeri.

Aeri expositus ille phosphorus sensim consumitur, & vapores satis copiosos in modum fummi emittit. Vapores illi in obscuro loco sunt lucidi. Si enim in charta exarentur litteræ, vel aliæ quælibet figuræ, in tenebris pallidum & album lumen exhibent. Quod si vividius aeri velis, notas illas manu celeriter perstringas vel affrices. Ea quippe frictio materiam phosphori lucidam excitabit, magisque conspicuum efficiet.

Eundem phosphorum apto caloris gradu in oleo caryophylli, (*de girofle*) lini, &c. liquefacias: eum deinde in phiala includas accurate obturata, sed in qua vacuum satis amplum relictum fuerit; phosphorus partem vacuum luce implebit satis vivida, ut in obscuritate collasrentur objecta circumposita, postquam lagena relinita fuerit (*débouchée*).

Si perfricetur phosphorus, statim flammam concipit & celeriter adurit. Hujus frustulum in papyro sæpius in se replicata involvi solet; deinde affricatur papyrus; tunc inflammatur phosphorus & chartam accendit. Cavendum autem ne quid materiæ accensæ a papyro in digitos incidat. Eo quippe vividior esset adustio, quod naturæ quodam instinctu perfricari soleat pars manus, in quam cecidit inflammata hæc materia. Cui malo, si contigerit, mederi facile est, digitum scilicet in urinam mergendo.

2. Lapis Bononiensis exiguus est, coloris cinerei, tener, sed gravis, sulphureus, & particulis quibusdam micantibus sparsus. Cum invenitur prope Bononiam Italiæ urbem, inde suum nomen habuit. Hic lapis per calcinationem acquirit in tenebris lucendi proprietatem. Quam dotem fortuito casu detectam fuisse narrat D. Lamery: scilicet quidam sutor nomine *Vincenzo Culciavola*, de investigando lapide philosophico plurimum sollicitus, ex istis lapidibus multos collegit. Horum colore argenteo & gravitate delusus, eos calcinationi subiecit, ratus inde aliquid argentei se extracturum. Id vero unum

ex suo labore obtinuit, ut lapides isti lucem vividam in tenebris emitterent : Deinde Chymici periti non pauci suam industriam eo contulerunt, ut eisdem lapides in calcem redigendi modum investigarent, qui aptior huic proprii foret aptissimus. Quod ut assequerentur, varias inierunt vias. Hanc autem anteponendam multi censent, quam secutus est D. Margraff, cujus ista sunt verba : On choisit celles de ces pierres qui paroissent les plus nettes, le plus crystallines, le plus pesantes, celles qui se séparent par lamies, lorsqu'on les casse. On les fait rougir dans un creuset, & on les réduit ensuite en poudre très-fine, en les trituant dans un mortier de verre ou de porphyre. On ne forme alors une pâte avec de l'eau dans laquelle on a fait dissoudre une quantité suffisante de gomme adragan. On pétrit cette pâte, on la divise en plusieurs masses pour en former des especes de petits gâteaux très-minces. On les fait ensuite dessécher à petit feu ; mais on augmente le feu vers la fin de l'opération, pour les dessécher aussi parfaitement qu'il est possible.

Ces gâteaux étant ainsi préparés, on les fait calciner, en les posant à plat sur des charbons allumés dans un fourneau de réverbère rempli des ces charbons jusqu'aux trois quarts de sa capacité. On recouvre ces gâteaux de nouveaux charbons dont on remplit entièrement le fourneau. On couvre le tout avec un dôme dont le tuyau reste ouvert. On laisse consommer tout le charbon, & même refroidir le fourneau ; & l'opération est achevée. On enlève le dôme, & à l'aide d'un soufflet, on emporte la cendre qui recouvre les pierres calcinées. On les retire, & on les expose pendant quelques minutes à la lumière, pour les porter ensuite dans un endroit obscur, où elles répandent une lumière très-vive.

3. Phosphorus mercurii ita dicitur ab hydrargiro, quod Chymici cultores mercurium vocant. Eum vero conficiens mercurium aere purgatum in

in phialam infundendo, quæ post eductum aerem hermetice clauditur. Quibus ita paratis, si phiala ad perpendicularum succutitur, ex ea erumpit lux vivida. Ascensu enim & descensu hydrargiri vehementer commovetur luminis materia, & viribus aucta, foras sese prodir. Eamdem ob causam globus vitreus aere vacuus, & accurate clausus, si perfricetur, lumen instar fulguris emittit. Phosphorus ille nomen habet *phosphori in vacuo*.

## DISSERTATIO II.

*De Phænomenis ad globum terraqueum pertinentibus.*

**A** Gemus 1. de phænomenis terrestribus; 2. de aqueis; 3. de aereis, quæ *meteora dicuntur*.

## CAPUT PRIMUM.

*De Phænomenis terrestribus.*

**I**Nter phænomena terrestria, præcipuum locum habent magnes, electricitas, terræ motus, vulcanii montes (*les vulcans*.)

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Magnete. (Aiment.)*

**M**agnes est lapis subniger, qui magnam habet affinitatem, & quasi cognationem cum ferro, cujus e fodinis erui solet. In eo duo sunt poli, in quibus idem impositum fuit nomen, quod globi nostri polis; unus enim *septentrionalis*, alter *meridionalis*, live *australis* dicitur.

Sex præcipuæ sunt magnetis proprietates, mirum: *tractio, repulsus, communicatio, directio, declinatio & inclinatio.*

1. Magnetes duo suspensi, ubique permixti, cum sibi obvertunt diversi nominis polos, id est, unum borealem, australem alterum, sese attrahunt, in mutuosque veluti amplexus ruunt. Similiter magnes ferrum sibi obvium ad se rapit, & quidem tanta vi, ut pondus 60. librarum sustinere valeat.

2. Si poli ejusdem nominis, id est, boreales vel australes, sese respiciunt, magnetes duo a se invicem repelluntur & recedunt. Pariter acus ferrea libere suspensa versus magnetem properat, cum ei polus borealis obvertitur, fugit vero si ipsi obijciatur polus australis. Vis autem tum attrahendi, tum repellendi longe vehemens est, quando magnes lamina ferri per utrumque polum transeunte, firmiterque annexa cingitur. Tunc dicitur *armatus*. Attractio & repulsus vim suam exerunt, etiam interpositis quibuslibet corporibus, a magnete ferroque diversis, modo non sint crassiora.

3. Magnes, præsertim armatus, virtutem suam ferro & chalybi, non aliis corporibus, per affricum communicat, dummodo lamina ferrea semper magnetis armaturam juxta eandem directionem contingat. Quintimo multæ laminæ, post acceptam vim magneticam, simul conjunctæ, duos habent polos, australem & borealem, & potentius quam ipse magnes ferrum alliciunt aut repellunt. Quapropter ad illos effectus, potius quam ipse magnes, adhibentur. Hæc laminarum ferrearum congeries vocatur *magnes artificialis*. Qua vero arte parari debeat, sic exponit D. Nollet: *Il faut avoir plusieurs lames de fer, dont chacune ait environ une ligne & demie d'épaisseur, un pied ou quinze pouces de longueur, & cinq à six lignes de largeur. . . . On fait toucher toutes ces lames, l'une après l'autre, à un fort aimant bien armé,*

mi, observant de faire glisser chaque face d'un  
 bout à l'autre, & dans le même sens, sur la  
 masse de l'armure. On réunit ensuite toutes ces  
 lames aimantées, en mettant du même côté sou-  
 ses les extrémités, que l'aimant aura touchées  
 les dernières; & l'on forme cet assemblage avec  
 des ligatures de cuir. Mais une attention qu'  
 il faut avoir, c'est de ne donner aucun coup de  
 marteau, aucune secousse rude à ces pièces, soit  
 avant, soit après les avoir assemblées. (Tom.  
 6. pag. 179. )

Quinetiam sine ullo magnetis contactu acqui-  
 ri potest vis magnetica. Ex. g. lamellæ chaly-  
 bæ, prorsus levigatæ imponentur incudi perpo-  
 ndiculæ, exque juxta longitudinem, eandemque di-  
 rectionem attritentur ferro ad perpendiculum ere-  
 cto, cujus extremitas inferior sit rotunda & be-  
 ne versa. Si operatio illa per singulas lamellæ  
 chalybæ faces, quantum satis est, iteretur, exi-  
 miam virtutem magneticam acquirat, non secus  
 ac si exquisito magnete tacta fuisset.

Sine ulla magnetis ope, egregiam vim ma-  
 goeticam aliquando natura impertit. In præstan-  
 tissimos magnetes sæpe convertuntur virgæ fer-  
 reæ, in ædium tectis templorumque fastigiis ere-  
 ctæ. Idem etiam accidit interdum ferramentis  
 cælesti fulmine percussis. Traditur fulmen in  
 aliquod cubiculum decidisse, ubi cultri multi-  
 plexque hujus generis ferrum continebantur. Id  
 autem omnino singulare contigit, ut ferramen-  
 torum pars fulmine soluta fuerit, pars autem  
 illa insignem acquireret virtutem magneticam,  
 qua clavos annulosque ferreos ad se rapien-  
 ter.

4. Magnes, sive naturalis, sive artificialis,  
 in æquilibrio constitutus, aut filo suspensus, u-  
 nam sui partem versus septentrionem, alteram  
 versus meridiem constanter dirigit: ita ut, si  
 dispositionem hanc mutaveris, magnes sibi  
 permissus, inquiete sese agitet, donec priorem  
 ad directionem redierit. Huc virtuti  
 refertur.

referendum est acus nauticæ vi magnetica imbutæ inventum, cujus tanta est in navigatione utilitas, siquidem, ipsa indicante, cognoscitur, quam in partem dirigenda sit navis, cum cælum nubibus obducitur.

5. Acus nautica & magnetica ad mundi polos accurate non sese componit, verum a septentrione deflectit, modo versus Orientem, modo versus Occidentem. Qua in re multiplici variationi obnoxia est. Hæc autem acus nauticæ aberratio vocari solet *declinatio*, cui incommodo nihil remedium hactenus inventum est.

6. Magnes, siue acus nautica, ita versus polos sese dirigit, ut extremitas quæ polum propriorem respicit, aliquantulum deprimatur, dum sese extollit altera. Quæ depressio eo minor observatur, quo minor est locorum ab æquatore distantia, & contra eo major, quo loca minus a polis distant. Acus igitur magnetica inclinatio ex ipsa locorum latitudine pendere videtur, ita ut nulla esse debeat in regionibus sub æquatore positis.

Ad explicandam effectuum magneticorum causam, quæ nihil est tota in Physica obscurius, variæ excogitatae sunt hypotheses; sed nullam esse quæ suum scopum assequatur, ingenue confitentur insigniores Physici. Ab iis igitur referendis abstinemus. Quorsum enim in iis opinionibus describendis tempus consumere, quibus expositis, non minus latet causa quæ investigatur, & utinam semper non lateat!

Quæres an magneti insita sit virtus quædam medica.

Resp. Magneti inditam esse quibusdam morbis medendi vim, constat testimoniis fide dignissimis. Sæpissime, v. g. dentium dolorem susceperit, & quidem per notabile temporis spatium. Ad illud autem obtinendum necesse est, ut ægrotans vultum habeat aquiloni obversum, & denti vitiato applicetur magnetis polus meridionalis. Ad depellendam hemicraniam (*la migraine*).



de ) plurimum etiam valet materia magnetica :

Utriusque illius proprietatis testem habemus idoneum, nempe D. Sigaud de la Fond. Sic autem testatur : Je ne connois point d'animaux plus propres à cet effet, que de petits barreaux d'acier, faits par M. le Noble, Chanoine de Vernon-sur-Seine. Ils joignent à la commodité d'être très maniabiles, l'avantage d'être fortement aimantés, & je m'en fais servi nombre de fois avec le plus grand succès en pareilles circonstances. Nous les avons employés avec le même succès contre la migraine, & nous avons vu nombre de fois cette douleur cesser, en appliquant pendant quelques momens, le pôle sud d'un de ces barreaux sur la partie affectée, ayant également soin de diriger vers le nord le visage de la personne que nous opérons. ( *Elém. de Phys. tom. 4. pag. 590. & suiv.* )

Narrat idem Physicus D. Darquier Academiæ Scientiarum procuratorem ( *Correspondant* ), anno 1767. scripsisse ad D. de la Lande plurimos le homines præfatis morbis affectos sanasse. Mulierem, v. g. Tolosanam, adeo vexabant dentis cariosi dolores, ut plurimis a diebus eam fugeret somnus, nec quidquam alimenti sumere liceret. Quo in statu D. Darquier ipsi tenuem magnetem applicavit. Post 7. vel 8. minuta, ægrotans modicum frigus experta est, dolor abiit, nec rediit.

In Diario quod inscribitur *Journal de Médecine*, similes reperiuntur observationes D. de la Condamine, qui medicinam exercet Romani ( *Romans, ville du Dauphiné* ). Ibi legitur virginem Deo consecratam ( *une Religieuse* ) cujus dentes quidam molares carie vitati erant, expertam fuisse dolorem ab uno dente in alium veluti transcurrere, cum D. de la Condamine denti quo dolebat applicuisset unum e polis parvuli magnetis, qui solez ferrez ( *d'un fer à cheval* ) formam referebat. Malum vero, dum ab uno dente in alium fugeret,

geret, persecutus est medicus, cuique denti carioso magnetem successive applicans. Ibidem refert D. de la Condamine, magnetem in huiusmodi circumstantiis feliciter a se adhibitum semper fuisse. (*Journal de Médecine pour le mois de Septembre 1767.*)

Adversus morbos e nervorum affectionibus oriundos plurimum est in magnete præsidii, qualis est palpitatio. Quod malum cohibet magnetis artificialis plus aut minus vegeti applicatio. Illius efficaciam testem oculatum ita sese offert D. Sigaud de la Fond: *Nous avons vu quantité de palpitations de cœur céder assez promptement à l'application de ce topique, & les tremblemens de différentes parties du corps s'apaiser, pour ainsi dire, sur le champ, & renaitre lorsqu'on enlevoit ce topique. Nous laissons à ceux qui viendront après nous, & qui connoîtront mieux que nous la vertu magnétique, la gloire d'expliquer ces sortes de phénomènes.* (*Dict. de Phys. tom. 3. pag. 507.*)

## ARTICULUS II.

### De Electricitate.

**E**LECTRUM (*P. ambre*) quoddam est bituminis genus, quod perfricatum vicina corpuscula attrahit. Ab eo suum nomen habet *electricitas*, seu vis corpuscula quædam attrahendi, vel etiam repellendi, quæ nonnullis in corporibus affricu, in aliis vero communicatione, excitatur. Veterum quidem Philosophorum oculos non omnino effugerat electricitas, sed eam densa veluti trans nubila viderant. Illam tantum electrici proprietatem noverant, qua corpuscula quædam obvia allicit & repellit; tot vero phenomena quæ nunc miratur orbis litteratus, nequidem suspicabantur. Ad recentiores Physicos pertinet hæc cognitio, qui naturam tam sagaciter interrogarunt, ut illi plurimorum effectuum

noti

notitiam subripuerint, quos jam dudum tenebris involvebat. Industrii illi naturæ interpretes, inter quos insignem locum habet D. Noller, electricitatem, subtilissimum illum & tandiu fugacem Proteum, ita vinculis obstrinxerunt philosophicis, ut eam vel imperitis oculis aspectabilem, & manibus tractabilem fecerint. Hinc prodire tot miracula electrica, quibus tota personavit Europa.

Articulum illum septem in paragraphos dividimus; in primo nonnullas præmitteremus quæstiones, ex quibus pender eorum quæ dicturi sumus intelligentia; in secundo, de modo quo materia electrica in *conductorem* transeat, in ipsoque colligatur; in tertio, de natura materię electricæ; in quarto, de physica effectuum electricorum causa; in quinto, de proprietate quæ pollent cuspides materiam electricam e *conductore* hauriendi; in sexto, de causis virtutem electricam minuentibus; in septimo, de electricitatis variis corporibus applicatione differemus.

## PARAGRAPHUS I.

*Nonnullæ præmittuntur quæstiones ex quarum solutione facilius intelligentur quæ de Electricitate dicturi sumus.*

**Q**UÆRES I. quibus signis pateat corpus aliquod esse *actu* electricum.

Resp. Corpus sese *actu* electricum iis notis prodit, quas ita describit D. Nollet: Corpuscula, quæ in apta distantia collocantur, attrahere & repellere; pellem leviter perstringere, ut efficere solent gossipium bene carminatum (*du coton bien cardé*) vel aranæ tela, quæ in aere pensilis, nobis sit obvia; odorem fundere huiusmodi similem, quem spirant phosphorum urinae, vel alium, igneas cristulas emittere; cum strepitu quodam scintillare; digitum, vel aliam corporis partem propius admotam pungere; liquores  
ant

aut vapores spiritibus abundantes inflammare; denique eosdem effectus per aliquod tempus producendi facultatem aliis corporibus transmittere: et en solita indicia ex quibus cognoscitur corpus aliquod esse actu electricum.

Quæres 2. quænam instrumenta excitandæ electricitati idonea sint.

Resp: Multiplicis sunt generis. 1. In usu fuerunt tubi vitrei, & utiliter etiamnum in plurimis experimentis adhibentur. Tubi illi trium vel quatuor pedum longitudinem habent, & crassitudinem (*gros seur*) 12. aut 15. linearum. Manu eum papyro sicca perfricari solent. Majorem concipiunt vim electricam, cum pelli rupicaprae (*de chamois*) affricantur, & quidem juxta eandem semper directionem. Si velis ejusmodi tubum fervare ad tuos usus idoneum, eum diligenter a cæli intemperantia, a corpusculisque in atmosphæra fluctuantibus defendas. In theca chartacea recondendus est, panno laneo instructa, qui gallice dicitur *flanelle*.

2. Quia crebræ tuborum frictiones non sine labore & molestia fiunt, ipsis subrogati sunt globi vitrei, qui ope rotæ in orbem circumacti, vel subjecta manu sicca, vel pulvillo (*coussinet*) ex pelle confecto perfrincantur. Longe efficacius adhibetur globus, quam tubus. Dum autem globus rapido motu circumvolvitur, aer in eo inclusus ex frictione calorem concipit, quo plurimum rarefit & dilatatur. Inde non semel accidit ut subito impetu dissiliat, & partes comminutas huc illuc jaculetur, non sine maximo spectantium periculo.

3. Grave illud incommodum in causa fuit cur globi vitrei usus, in experimentis electricis penitus fere obsoleverit. Hujus in locum paucis ab annis substituta sunt plana crystallina (*plateaux*) quæ ope manubrii ipsorum axibus aptati inter pulvillos (*coussinets*) volvuntur, quibus sese affricant. Hujusmodi plana ipsis globis sunt efficaciora, nihilque periculi sibi adjunctum habent.

bent. Interdum quidem accidit ut fundantur, sed nulla pertimescenda est fragmentorum erupcio; quin etiam, licet in partes dissilirent, quod probabile non videtur, nihil inde metuendum esset: cum enim modico tantum rotationis motu donentur, ipsorum fragmina non satis vis centrifugæ acciperent, ut aliquid mali importarent. Quæres 3. quid *conductoris* electrici nomine intelligi soleat, & quæ esse debeant ipsius dotes.

Resp. *Conductores* vocantur corpora, quæ electricitati a globo vitreo, vel plano crystallino recipiendæ & aliis transmittendæ idonea sunt. Si velis in aliquo corpore fluidum electricum accumulare, ita disponatur necesse est, ut acceptam virtutem electricam retineat: eam autem servare non poterit, si cum iis corporibus communicet, quæ electricitati recipiendæ, simul & aliis transmittendæ accommodata sunt. Ab huiusmodi proinde corporibus accurate segregandum est. Experientia vero constat quasdam esse substantias, quæ electricitatem sibi communicatam in alia corpora diffinere non permittunt; qualia sunt vitra, resinae, gummi, filaserica.

*Conductor* qui in experimentis electricis adhiberi solet, rubus est metallicus, qui cum globo vel plano crystallino per interpositum pulvillum communicat. Ut procreandis effectibus electricis idoneus sit; quædam in eo requiruntur conditiones.

1. Ut virtutem electricam a globo vel plano sibi inditam retineat, propter rationem modo expositam opus est ut funiculis sericis suspendatur, vel fulcris (*des supports*) resinaceis aut vitreis innitatur, quæ materiam electricam sibi communicatam, in alia corpora non transmittunt.

2. Eum esse oportet expositum & levem (*lisse*), ita ut in ejus superficie nulla sit asperitas, nulla pars prominens. Alioquin quæ ad  
eum.

eum affluit materia electrica, in ipso, quantum satis est, non retinetur nec accumulatur; verum per extrantes (*saillantes*) & angulosas partes sub cristarum forma elabatur. Hinc intelligere est, quam parum *conductoris* muneri aptæ essent vestes ferreæ (*barres des fer*) & quadratæ, quæ olim in usu erant. Non satis enim materiz electricæ suscipiebant; sed fluidum illud per ipsarum angulos effluebat. Eodem vitio laborabant catenæ ferri, vel cujuslibet alterius metalli, quæ in experimentis electricis usurpatæ fuerunt. Denique *conductores* e. ferro candido (*fer-blanc*) facti, quorum frequens est usus, feliciter adhiberi non possunt, nisi summa cum cura fuerint agglutinati (*soudés*), ut in iis nulla sit inæqualitas, nullaque asperitas; quo vitio peccare solent hujusmodi opera.

Plurimis simul *conductoribus* utitur D. Sigaud de la Fond, in experimentis electricis versatissimus. Eorum præcipuus capro diligentissime polito constat, cujus in superficie nulla est sensibilis asperitas. Terminatur in gentibus ejusdem metalli globis. In plerisque experimentis jungitur duobus aliis ferri candidi *conductoribus*, qui ad trium & amplius pedum e tabulato (*plancher*) distantia suspensi sunt; horum quippe atmosphaera electrica brevi dissipatur, si propius ad tabulatum accederent. Illos *conductores* sibi invicem sociantur per intermedios cupri scapos (*des riges de cuivre*).

Ex multiplicatis *conductoribus*, valentior fit electricitas. Quando enim solus est primus *conductor*, scintilla quæ ex ipsius parte extrema elicitur, multo minus vegeta est, quam ubi eorum apparatus suis *conductoribus* instructo educitur. Cujus discriminis aperta est ratio: quodcumque scilicet corpus quædam tantum electricitatis copiam in se admittit. Quam igitur primus *conductor* suscipit hujus fluidi quantitatem, hæc ea longe minor est, quæ in *conductorum* summa colligitur. Cum autem digitus scintil-

lam eliciens, totam quæ in *conductore* residet materiam electricam exhauriat, longe uberiores illius copiam educit, quando universos *conductores* ea quam continent electricitate exuit; hujus ergo scintillæ effectus multo vehementior esse debet.

Quænam autem in parando *conductore* potissimum servandæ sunt proportionēs, ut materiam electricam copiosius recipiat? Plurimis exemplis comprobatum videtur, ad eum effectum plus conferre superficiem quam soliditatem, eamque superficiem cuilibet alteri anteponendam esse, cujus major est longitudo.

## PARAGRAPHUS II.

*De modo quo materia electrica in conductorem transeat, in ipsoque colligatur.*

**H**IC quædam sunt observanda. 1. In eo sentiant omnes electricitatis exploratores, quod fluidum illud in omnia generatim corpora sit diffusum. Ex iis nullum est quod certam illius quantitatem non contineat. 2. Globus terrestris & atmosphæra quo circumcingitur, videntur esse hujus materiæ commune receptaculum in quo plus minusve copiose, pro variis circumstantiis, residet. 3. Potest fluidum electricum in aliquo corpore accumulari; quod fieri manifestum est in machinæ electricæ *conductore*, & aliis corporibus quæ cum ipso communicant. 4. Fluidum illud quadam veluti propensione ad æquilibrium nititur; id est, in omnia corpora contigua sese æquabiliter diffundere amat, & facillime a corpore uberiores ipsius copiam continente, & aliud transit quod ejusdem fluidi quantitatem sibi tantum propriam habet. Id ipsum contingere videmus, cum electricis corporibus digitum admoveamus; in eum quippe statim sese conjicit materia electrica.

His prænotatis, sic fieri materiæ electricæ transmissionem intelligi potest: scilicet ubi perfrica-

fricatur globus vitreus aut planum crystallinum, aliquam in suis partibus concussionem excitat ille affrictus. Ex ea vero commotione fit, ut materia electrica in globo vel plano inclusa ab iis sese expediat, in conductoremque & corpora ipsi contigua transeat. Prout hæc materia ex globo effluit, nova ex communi receptaculo statim affluit, quæ prioris locum occupat. Hæc posterior pariter dissipatur, & suum alteri advenienti locum cedit, sicque deinceps. Dum ergo confricari pergit globus, fluidum electricum quod in se continet, sibi juncto conductori distribuit: sed damnum illud continuo compensat nova ejusdem fluidi, copia, quæ ex communi receptaculo ad globum allabitur.

Hic materia electricæ a receptaculo communi ad globum, ab illoque in conductorem circuitus experimentis confirmatur. Totum enim apparatus & ipsum hominem qui globum vel planum crystallinum circumagat, ab iis corporibus omnino sejungas, quæ transmittendæ materia electricæ, huicque e communi fonte ad globum adducendæ idonea sunt. Post elicatas quasdam scintillas e conductore, eas deinde sensum decrescere, & ita debilitari, observabis, ut vix ac ne vix quidem conspicuæ sint. Si apparatus esset absolute sejunctus (*parfaitement isolé*), & ær egregie siccus, tunc conductor prorsus exhauriretur, & frustra globum vel planum vitreum circumvolveres. In ea quippe hypothese materia electricæ præcluditur transitus e receptaculo communi ad globum vel planum crystallinum.

Eandem veritas sic confirmari potest: prædictum experimentum in obscuro loco fiat, & homo segregatus (*isolé*) qui globum vel planum circumagat, altera manu cuspidem teneat paululum obusam; denique alius homo minime sejunctus (*non isolé*) huic cuspidi alteram similem admoveat: tunc crista lucida ex posteriori cuspidi exsiliet, & punctum luminosum vi-



videbitur in acumine quod tenet homo segregatus (*isolé*). Inde patet eum hominem novam electricitatis copiam accipere e receptaculo communi advenientem, & quidem interventu cuspidis quam admovet alter homo non segregatus (*non isolé*). Idcirco quandiu res in eo statu permanent, *conductor* satis materiae electricae suppeditat, nec exhauritur. Experientia igitur compertum est, cum apparatus non segregatur, fluidum electricum e communi receptaculo transire in globum qui circumagitur, & inde in *conductorum* in quo colligitur & accumulatur.

## PARAGRAPHUS III.

*De Materia Electrica natura.*

1. **M**ateria electrica non propria est corporis electrici materia. Quamvis enim tubus millies vi electrica donetur, nulla tamen in ipsius mole deprehenditur immixtio. 2. Materia electrica non ipse est aer? in vasis enim vitreis aere vacuis eadem sese produnt signa electricitatis. 3. Ex iis quae huc usque nobis de electricitate comperta sunt, sequitur inter eam & ignem communem, ac lumen plurimam esse cognationem, plurimam simul & discrepantiam. Unde fit

## PROPOSITIO I.

*Inter materiam electricam & ignem communem ac lumen, plurima est cognatio.*

Prob. **E**X multiplici effectuum & proprietatum consensione, quae inter materiam electricam ignemque ac lumen interest. 1. Si quis supra sulcrum resina obductum, aut supra tabulam funiculis sericis suspensam collocetur, & manu contrectet catenulam ferream vi electrica imbutam, proh! quam repentina fit in illo conversio! Haud mora, fluidum electricum ca-

canalibus in eum illabitur; ad quamcumque illius corporis partem tuum digitum admoveas, protinus bellulæ erumpent scintillulæ, & pellem, non sine mutuo doloris sensiculo, vellicabunt. Circa illius caput digitum huc illuc vagus circumferas, tunc ipsius comas circumlambere videbitur flammula erratica.

Præterea mediis in tenebris vim electricam excita in homine, qui veste filis aureis vel argenteis contexta induatur. Deinde illitum aurum leviter perstringas, tunc fulgor rapidus per ambiguos filorum anfractus discurret, tamque splendidis ludet imaginibus, ut minutos characteres obscura in nocte possis legere. Singulæ quæ tunc micant cristulæ, sunt quasi totidem aciculæ, quibus pellis pungitur.

Si tandem spiritum vini tepidum in cochleari infuderis, & vir electricus digitum sic admoveat, ut summo liquori immineat, nec tamen eum tangat, flammam concipiet liquor; sed priusquam ardeat, aliquando crebri exsiliunt igniculi, qui digitum crepitando repercutiunt.

Unde sic argumentor: eæ sunt luminis & ignis proprietates, ut colliscent, pungant, & crepitando comburant: atqui his proprietatibus gaudet materia electrica, ergo ex hac parte cum igne & lumine consentit.

2. Materia ignea non sponte nec injussa ardere solet, sed opus, est ut quodam impulsu exagitetur, & quasi provocetur; quamvis, ex gr. in silicis venis plurimum ignis natura congesterit, nullam tamen exeret scintillam, nisi fortiter collisus fuerit: atqui pariter, licet multis in corporibus delitescat uberrima materia electricæ copia, nihil tamen emittent fulgorem, nisi repetito manus aut alicujus corporis affricu sollicitentur.

3. Eo promptius & vividius calefiunt corpora, quo ipsorum partes sunt magis densæ, rigidæ, tenaces, elasticæ: atqui, ut calor, ita electricitas promptior est ac vegetior in corporibus

ribus quorum partes prædictis dotibus pollent. Vitrum, ex. gr. cum particulis constet rigidis & elasticis, electricitati maxime est idoneum. Cerei, dum sævit hiems, paululum fiunt electrici; per æstatem vero eos perfricando nequicquam sudaveris; ex iis ne minimum quidem electricitatis indicium exprimes. Cujus disparitatis in promptu est ratio: per hiemem enim partes cereæ frigore stringuntur, rigescunt, & quamdam vim elasticam obtinent; per æstatem vero fiunt lentiores & molliores; ignis igitur & electricitas eandem in corporibus partium conformationem postulant; ergo in eo capite sunt bene concordæ.

4. Nemo nescit vim ignis in metalla promptius quam in alia corpora sese diffundere. Ex. gr. partem virgæ metallicæ extremam teneas, dum pars opposita prunis ardentibus subjicietur. Vis ignea interjectum virgæ spatium protinus transiliens, in manum tuam irumpet, in aliis autem corporibus aliter se res habet: atqui electricitatem igni semper æmulam, vel potius igni simillimam, facilius in corpora metallica excurrere experimentis compertum est.

5. Ubi ignis purissimus, ab aliisque corpusculis segregatus, nullum superandum habet ostaculum, sed primo impulsui cedit, quid contingit? vix micat, cum per circumfluum aera dilabitur evanidus, nulloque caloris sensu afficit. Cum vero aliquid ejus eruptioni moras injicit, tunc adversus obstantia luctatur foribundus, vires colligit, & si repagula perfrigerit, tunc disruptis particulis armatus, obvia corpora concipit, concutit, subvertit. Tanta est imperus ignis, quem irritant obstacula! crescit etiam vis ignea, pro varia circumjacentis aeris densitate.

Atqui simile aliquid in electricitate accidere testatur experientia: e tubo enim vitreo, quantum fieri potest, aer exhauriatur, qui semper varias corporum particulas sibi adjunctas habet.

Deinde in isto tubo excitetur electricitas. Statim in eo divagabitur lux plurima, iis simillima fulguribus, quæ tempore sereno, per æstivam fervidam, huc illuc discurrunt. Hæc flamma in tubo diffusa non crepitat, non sibilat; non scintillat; sed blandula est, placida, taciturna. Undenam autem oritur illius flammolæ quasi benignitas & silentium; nisi ex eo quod intra tubum nullus sit aer; qui ejus eruptionem remoretur? sicut ergo ignis, sic etiam electricitas, vividior est, vel remissior, prout magis vel minus adversus obices luctari cogitur.

6. Lumen immensa intervalla tempore brevissimo percurrere demonstravimus: atqui stupendam hanc celeritatem sibi etiam vindicat electricitas; ut plurimis constat experimentis, ex quibus unum aut alterum referemus.

*Conductori* virtute electrica imbuto dependeat filum metallicum, quod inferatur lagenæ vitreæ & aqua semiplenæ. Deinde ducenti vel mille homines in urbem ita disponantur, ut primus una manu vas comprehendat, & alteram immisceat manui hominis sibi proximi, ille & alter ipsi vicinus dextram dextræ mutuo jungant, & sic alli subsequentes; ut autem intra singulos majus interjaceat spatium, dum manus confoctant, brachia protendant. His peractis, qui claudit agmen, scintillam eliciat: ea vix micat, cum ictus electricus singulorum membra simul quatit & exagitat.

Præterea Physicus de electricitate bene meritus D. de Mannier, filum adhibuit ferreum, & spatium unius lenæ longum. Filum illud partim serbatum homi, partim variis arborum truncis erat circumvolutum; uno verbo in mille sinuosos contractus flectebatur; sed diversi illi staminis ferrei itus & reditus vim electricam non cohibuere: nec obstituerunt tot flexus, quominus fluidum illud in utraque fili parte extrema, sine ullo temporis discrimine sensibili, se-

se manifestaverit. Quis tantam celeritatem cogitatione assequatur?

7. Fulmen nihil aliud est quam ignis subtilissimus: atqui materiam inter fulmineam & electricam maxima est cognatio. Quemadmodum enim in partem fulminis veniunt effluvia sulphurea & bituminea sursum evecta, ita electricitas naturalis suum præsentim habet fomitem in corporibus quæ sulphure & bitumine abundant: sicut etiam variz exhalationes, in nubibus fermentescendo & sese collidendo, in fulgura exardescunt; sic e corporibus electricis, ubi perfricantur, splendidi erumpunt igniculi, fulguribus non absimiles. Strepitus stridulusque sonitus, qui auditur statim atque digito admotum perfrigitur atmosphæra electrica, quantum potest, tonitruum fragorem imitatur: sicut fulmen teneris & rarioribus parcit, durissima vero quæque dissipat & comminuit; ita vis electrica molliores & facile cedentes corporis partes sine injuria permeat, solidas vero & contumaces quatit & hebetat; imo tam violenta interdum fuit illius eruptio, ut animalia protinus enecaverit. Nonnulli etiam Physici terribile & maleficum illud fluidum audentiori manu & plus æquo familiariter tractantes, subito illius ictu perierunt, nimiz curiositatis tristes victimæ.

8. Si tubum humida, vel madente manu perfricaris, quantumlibet coneris, nullam aut pene nullam ex eo electricitatem exprimes. Non feliciter succedunt experimenta electrica, ubi sunt cælo humido, vel in conclavi (*chambre*) cujus aer ex spectantium exhalationibus plurimum humescit; si in tubum vitreum aquam effundas, ex eo vix ullum electricitatis indicium elicies: pariter ignem in corporibus humidis non facile excitaveris.

Ex iis omnibus patet inter electricitatem, ignem communem & lumen plurimam esse affinitatem.

## PROPOSITIO II.

*Inter electricitatem & ignem tum communem, tum solarem, multiplex intercedit discrepantia.*

Prob. 1. **Q**uia ignis nonnisi lentis progressibus metalla, lapides aliæque corpora densa penetrat; electricitas autem vix minutum secundum impendit, ut filum metallicum transiciat, cujus longitudo sit 2276. sexpedarum, juxta D. *Winkler* observationem.

2. Ignis vulgaris tardo molimine e corporibus quæ occupavit, sese expedit. Quinetiam ingentes metallicas moles non deserit, nisi post plurimas horas: longe autem alia est fluidi electrici celeritas. E maximis enim corporum massis fere subito evolat.

3. Ignis vulgaris, quantuluscumque sit, vim habet corpora quæ contingit calefaciendi, dum ignis electricus nullum caloris sensum excitat. Corpora etiam quæ copiosius pervadit nullam suscipiunt caloris accessionem; filum enim ferreum in liquore thermometri immergas; quantumvis eum liquorem fluido electrico saturare coneris, nullum deprehendes caloris incrementum; non altius ascendet, quam alterius thermometri sibi proximi liquor.

Si tubi electrici atmosphæræ manum admoveas, materiæ electricæ fluxum senties, perinde ac si manum in telam araneæ inferres; nullum vero caloris sensum experieris: res autem longe aliter se habet, quando manum accensis carbonibus, vel radiis solaribus objicimus; tunc enim sensu caloris plus aut minus vivido afficimur.

4. Ignis & electricitas rapido perfrictu excitari possunt; sed quævis metallum, v. g. sub repetitis mallei quo tunditur ictibus calefiat, nullum tamen electricitatis signum præbet.

5. Flamma igne excitata; per suam basim alimentum

mento quo nutritur adhæret, illud absorbit, in apicemque definit: plurimum autem diversa est electricitatis ratio. Lucidæ ipsius cristæ (*aigrettes*) per apicem iis corporibus inhærescunt, a quibus gignuntur, & deinde in amplius spatium sese explicant; corporum quibus adhærent nullas auferunt vel consumunt particulas.

6. Oleosæ & resinosæ substantiæ igni communi alimentum suppeditant; eas dividit, dissolvit & facile pervadit: contra vero fluidum electricum in huiusmodi corpora non sese conjicit nisi reluctans & quasi invitum, eaque difficillime tantum penetrat.

7. Ignis, sive lumen solis corpora opaca non permeat; at supra eorum superficiem labens (*glissant*) eam calefacit: electricitas vero omnia fere corpora facile trajicit.

8. Lumen solis circa corpus in quod incidit, minimum quidem spargit odorem; nullum effundit etiam ubi ope speculi urentis (*d'un miroir ardent*) in corpore inodoro colligitur & accumulatur: electricitas longe dissimilis gravissimum quasi alii odorem emittit.

9. Radii solis in ore aperto excepti, gustus organum ne leviter quidem afficiunt; electricitas vero illud acidorum more pungit & vellicat.

### COROLLARIUM

Ex indicatis iis discriminibus concludit clarissimus Mussenbroek, si electricitas verus sit ignis, ut dubitare non sinit phenomena prius exposita; concludit, inquam, eum ignem non esse cum vulgari & solari confundendum, sed ab utroque nonnullis dotibus discrepare, quæ nondum satis exploratæ sunt, & quarum inquisitione Physicorum conatibus est dignissima.

## PARAGRAPHUS IV.

*De causa Effectuum electricorum physica.*

**I**Nter varias hypothesas quæ ad explicanda electricitatis phænomena excogitatæ sunt, hæc principem locum sibi vindicare videtur, quam tanta cum sagacitate adornavit D. Nollet. Eam igitur præ cæteris describemus.

1. Clarissimus ille naturæ indagator, propter rationes supra expositas, censet materiam electricam nihil pene aliud esse, quam ignem ipsum elementarem.

2. Subtilissimum esse illud fluidum, siquidem corpora omnia, vel densissima, libere permeat.

3. Materiam electricam moveri juxta lineam rectam, non vero in circulum flexum. Id probat tum directio quam in tenebris sequi deprehenduntur cristullæ lucidæ, & tubo erumpentes; tum linea quam describunt corpuscula, sive cum attrahuntur, sive cum repelluntur.

4. Statuit corpus quodlibet electricum quadam materiæ electricæ atmosphæra circumdari. Ut enim ab eo eliciatur scintilla, illud tangere minime necesse est. At sæpe exsilit scintilla, dum digitus *conductori* admotus ab eo 9, 10, 12; imo & interdum 14. pollicibus distat.

5. Atmosphæram hanc compositam esse ex materiæ electricæ rivulis, quorum alii e corpore electrico effluunt, alii vero ad ipsum affluunt sive ab aere, sive a corporibus vicinis: existere autem illos materiæ simul *effluentis & affluentis* rivulos, sic probat.

Si corpori electrico admoveantur levia corpuscula, quales sunt lamellæ metallicæ, experientia constat ex iis alia versus corpus electricum tendere & impelli, alia autem statim ab eo repelli: atqui impulsus illi & repulsus satis indicant, diversos materiæ electricæ rivulos, quorum alii ad corpus electricum adveniunt, & alii

ab



ab eo exeunt. Si enim non adesset nisi materia *affluens*, omnia corpuscula removerentur a corpore electrico; ad illud autem omnia accederent, si non existeret nisi materia *affluens*.

Præterea supra virgæ ferreæ superficiem injiciatur pulvisculus, & in ea excitetur vis electrica; tunc deprehendens partes hujus pulveris crassiores huc, illuc disjici & dissipari, particulas vero tenuiores corpori electrico adhærere: atqui duo illi effectus oppositi, varios demonstrant materiæ electricæ rivulos, alios scilicet e virgâ ferrea effluentes, alios in eam irruentes. Sed ipsum audiamus hujus opinionis parentem clarissimum:

*Quand on électrise une barre de fer, sur laquelle est répandu du son de farine, on voit d'abord toutes les parties grossières emportées par la matière électrique, qui s'élance du corps électrisé; mais on observe aussi constamment, que toute la surface du fer, quoique électrique, demeure couverte d'une poussière impalpable. Cette expérience prouve assez clairement, 1. que la matière électrique s'élance du corps électrisé, puisqu'elle emporte les corps légers qui sont sur sa surface; 2. qu'une pareille matière vient au corps électrique, réparer apparemment celle qui en sort, puisque les particules qui sont comme adhérentes au fer, ne s'y attachent, que par l'action d'une matière qui vient au corps électrique; comme celles qui s'envolent ne font connoître l'effort d'une matière qui sort. . . . D'ailleurs un corps ne s'épuiseroit pas pour être continuellement électrisé; & comment ne s'épuiseroit-il pas à la fin, si rien ne réparoit les émanations qu'il fournit? 3. Que ces deux courans de matière, qui vont en sens contraires, exercent leurs mouvemens en même temps, puisque le même corps électrisé attire & repousse tout à la fois.*

Positis materiæ electricæ rivulis, quorum alii e corpore electrico exeunt, & alii in illud confluant, ingeniosè admodum phænomena ele-

Strica explicat auctor celeberrimus. E multis pauca feligemus.

*Phænomenum primum.* Corpora leuiuscula, quales sunt paleæ, aut lamellæ metallicæ, corpori electrico admotæ nunc attrahuntur, nunc repelluntur.

*Explicatur.* Materia affluens obvia quæque corpuscula in corpus electricum impellit; qui motus dicitur *attractio*; materia vero effluens secum levia corpora rapit, eaque cogit a corpore electrico recedere; quo in motu situs est *repulsus*.

*Phæn. II.* Quando electrica fit virga ferrea, in parte ipsius extrema emicat, non sine aliquo strepitu, luminis cristula.

*Explic.* Unaquæque materiæ electricæ pars, inquit auctor, habenda est tanquam ignis elementaris particula, quæ materia quadam pingui, salari, vel sulphurea involvitur, & sese explicare nititur. Quando materia e corpore electrico erumpens, aliam offendit quæ ad ipsum advenit, sese mutuo collidunt. Quo conflictu franguntur involucra, in quibus ignis captivus retinebatur: ignis e suis vinculis expeditus, circumquaque sese expandit, similique motu alias partes sibi cognatas & contiguas exagitat; eodem ferre modo, quo inflammatum pulveris pyrii granum, alia sibi proxima statim incendit. Igneæ particulae, rupto carcere, aerem obvium vi subita feriunt; hinc cæcus ille strepitus qui lucidis cristulis jungitur.

*Phæn. III.* Si homini electrico digitum admoveas, statim exsiliunt splendida & crepitantes scintillæ, quæ in utroque ingratum, veluti puncturæ sensum excitabunt.

*Explicatur.* Scintillæ, ut modo diximus, oriuntur ex materiæ affluentis & effluentis conflictu. Ideo autem sensum doloris utrinque pariunt, quia duo materiæ inflammatae rivuli ex partibus oppositis in sese invicem incurrunt. Ex illa enim collisione mutus nascitur percussus, qui motum ipsorum efficit retrogradum. Ri-

valus vero materię electricę, quę flammam concipiendo sese dilatat, intra pallem regredi non potest, quin illius porę vehementer distendat. Hinc motus ille doloris sensus, quem utrinque excitant pungentes scintillę.

*Phæn. IV.* Si homo electricus extremum digitum spiritui vini admoveat, illum inflammabit, maxime si paululum calefactus fuerit.

*Explicatur.* Materia electrica, ex dictis verus est ignis; norunt autem omnes ignem motu quodam agitatum, si incurrat in corpus ad inflammationem expeditum, illud incendera; cum igitur ex hominis electrici digito exeant ignę particulę, & spiritus vini ad conflagrationem sit paratissimus, cum in hypothesis proposita inflammari mirum non est. Observat D. Nollēt, quando vegeta est electricitas, ad inflammationem opus non esse, ut spiritus vini prius fuerit calefactus.

*Phæn. V.* Funem adhibeas madefactum, & quantum tibi libuerit longum; conductori machinę electricę alligata sit una illius extremitas; alteram manu teneat aliquis supra fulcrum resina conflatum positus. Si funis diversa per intervalla funiculis sericis sustineatur, homo supra fulcrum constitutus fiet electricus, quantumvis a machina electrica distet, & quoscumque in sinus & anfractus funis flectatur.

*Explicatur.* Non dissentientur Physici, vel peritissimi, inquit D. Nollēt, in corporibus etiam densissimis, plus esse vacui, quam pleni; quanto magis autem credibile est, in fune, in virga metallica, &c., huiusmodi esse porositatē, ut materia electrica, subtilissimum illud fluidum, & ubique diffusum, in iis corporibus non interruptam habeat partium contiguitatem? cum ergo volvitur globus vitreus, agitari non potest una radorum electricorum extremitas, quin motus ille, eodem pene momento, in alteram transmittatur. Eodem enim fere modo se habent fluidi electrici particulę, ac globi

recta serie dispositi: porro si primum percutias, motus eodem pene instanti in ultimum traducitur. Quanto magis id contingere debet tenuissimis & mobilissimis materiæ electricæ partibus. Felicius autem adhibetur funis madefactus, quam siccus, quia in priori difficilior dissipatur fluidum electricum.

*Phæn. VI.* Una manu apprehendas phialam vitream, aqua semiplenam, intra quam inferatur filum metallicum, vi electrica imbutum. Deinde manum alteram ejusdem fili extremitati admoveas, ut exciterur scintilla. Vix micabit, cum brachia, aliasque corporis partes vehementer concuti senties. Si numerosa hominum series ita disposita sit, ut sese manu teneant, & qui agmen claudit, fili metallici extremitatem digito perstringat, tunc singuli similem commotionem, eodem fere tempore percipient. Famosum illud experimentum vocitari solet, *expérience de Leyde*, quia Lugdani Batavorum primo inventum est.

*Explicatur.* 1. Materia electrica, inquit idem Physicus, per filum metallicum in aquam inhabitur, & per aquam intermediam in phialam admissa, ibi congeritur; hæc igitur fluido electrico tora prægat, ideoque effectum vehementiorem præcreare debet.

2. Quando phialam una manu sustinens, altera scintillam ex parte fili metallici extrema elicio, vehementem in brachiis aliisque corporis partibus commotionem experior. Cujus effectus rationem hanc affert: rivulus materiæ igneæ a fili metallici parte suprema magno cum impetu erumpens, meum intra corpus insilit per manum quæ scintillam elicit. Alter etiam materiæ igneæ rivulus, cum eadem vi prosilit ex parte vasis inferiori, vitrum permeat, meumque in corpus irrumpit per manum quæ phialam sustinet. Duo illi materiæ electricæ rivuli e partibus oppositis irruentes, sese violenter intra meum corpus collidunt; qui confictus eam vehe-

vehementem commotionem excitat, qua totum meum corpus concutitur. Eandem ob causam plurimi simul homines in præfato experimento ictu simplici percutiuntur. Ingeniosa quidem est ista explicatio; eam vero gravissimis urgeri difficultatibus patebit ex modo dicendis.

## S C H O L I U M.

Ut celeberrimum illud experimentum explicet clarissimus D. Francklin, longe aliam sequitur viam. Vitrum a materia electrica trajici existimat D. Nollet, idque variis probat experimentis, quale est istud: in globo vitreo excitetur virtus electrica, in quem immissum fuerit paululum pulveris lignei. Deinde sistatur illius globi motus, ad partemque ipsius inferiorem admoveatur extremus digitus; tunc levia hæc corpuscula ab imo sursum exsilire videas; quod sane non aliunde oritur, quam ex materie electricæ impulsu, quæ e digito exiens pulverem hunc secum abripit; illud vero efficere non potest, quin globum trajiciat.

Id vero negat D. Francklin. Quo pacto, inquit, fieri posset, ut phiala tantam electricitatis copiam acquireret, & commotionem adeo vehementem excitaret, si fluido electrico pervium esset vitrum? nonne statim dissiparetur materia electrica, e vitro in manum transiens quæ lagenam sustinet, unde in commune receptaculum sese diffunderet?

Præterea statuit vitrum ex natura sua quamdam electricitatis quantitatem continere, quæ suas inter superficies interiores & exteriores dispertitur, & qua proportionem una superficies novam fluidi electrici accessionem recipit, eadem proportionem aliquid ex sua electricitate perdit altera. Quod ut magis elucescat, supponamus in lagena contineri 100. electricitatis gradus: juxta mentem D. Francklin, 50. gradus in phialæ superficie interiori, & 50. alii in

exteriori resident. Quo posito, si interna lagenæ superficies 10. novos electricitatis gradus acquirat, ii. 50. aliis additi efficiunt 60.; externa vero superficies, amissis 10. suæ materiæ electricæ gradibus, 40. tantum retinebit. Denique si interioris superficiæ electricitas 50. gradibus augeatur, tunc 100. continebit, dum paupercula superficies exterior sua prorsus materia electrica spoliabitur. Tunc lagena fluido electrico, quantum fieri potest, instructa est (*garnie, chargée*). interior enim superficies novum electricitatis incrementum suscipere nequit, cum novam ipsius jacturam facere non potest exterior superficies.

Id adeo verum est, inquiunt illius opinionis defensores, ut lagena vim electricam non concipiat, nec excitandæ commotioni idonea sit, quando superficies illius externa de sua naturali electricitatis quantitate nihil perdere potest; cujus in facti gratiam allegant experimenta, quale est istud.

Lagenam bracteola stannea (*d'une feuille d'étain*) exterius vestitam e conductore suspendas: sed prius diligenter inspicias, an stannum ipsius superficiæ accurate applicetur; annon in ea quedam sint exiguae asperitates. Ut felicius succedat experimentum, tempore sicco utaris. Imo ne humiditas noceat, lagenam, antequam suspendatur, calefacis. Lagena sic comparata nonne videtur suscipiendæ electricitati optime accommodata? atqui tamen frustra sudaveris, ut eam electricam fieri cogas. Quam autem ob causam, nisi quia exterior illius superficies nihil potest amittere, ideoque nihil etiam acquirere potest interior?

Ut vero compertum habeas lagenam non magis electricam esse post experimentum, quam ante, eam a conductore avellas, utendo duobus radiis (*baguettes*) crystallinis, quorum longitudo sit unius circiter pedis, eamque transferas in mensam; deinde lagenam una manu com-

pre-

prehendas, ex altera suum uncinum (*son cro-*  
*chet*) tangendo; nullam senties commotionem:  
 imo ne levissimam quidem scintillulam ex ea  
 elicies. Adeo certum est, non posse quidquam  
 electricitatis in interiorē lagenæ superficiem  
 intromitti; dum exterior e sua naturali electri-  
 citatis copia nihil perdere potest.

Juxta eundem Physicum interna lagenæ su-  
 perfacies acq̃uistam electricitatis copiam dimit-  
 tere, externa vero eam quam perdidit recupe-  
 rare nititur. Utrumque fit subito, ubi quædam  
 duas inter superficies instituitur communicatio,  
 ut contingit quando aliquis lagenam una manu  
 comprehendens, ex altera tangit uncinum (*le*  
*crochet*) in aqua lagenæ immersum. Tunc ignis  
 electricus e superficie interiori cum magno im-  
 petu in exteriorē irruit. Repentinus autem  
 ille ignis electrici ab una superficie in alteram  
 transfusus commotionem excitat.

Ad alterutram D. Noller & D. Francklin  
 opinionem plus minusve accedunt aliorum Phy-  
 sicorum placita.

Quæres 1. utra magis ad verum accedat.

Resp. in ea re definienda plurimum esse dis-  
 ficultratis. Utrique enim opinioni patrocinari vi-  
 detur experientia. 1. Duo materiæ electricæ ri-  
 vuli oppositi, qui in aliis phænomenis electri-  
 cis tam aperte se produnt, & quos defendit D.  
 Noller, in Leidenſi non minus sunt manifesti,  
 ut probat experimentum quod ita describit D.  
 Brisson: *Dans un cahier de papier de 18. ou 20.*  
*feuilles, plus ou moins, mettez trois lames min-*  
*ces de l'étain dont on se sert pour étamer les*  
*glaces, savoir une au milieu, & une de chaque*  
*côté après la première ou seconde feuille: fai-*  
*tes passer la commotion au travers de l'épaisseur*  
*de ce cahier ainsi garni. Vous trouverez, si*  
*la commotion n'est pas trop forte, les deux*  
*lames d'étain extérieures précées, & celle du*  
*milieu ne le sera pas. On conçoit aisément*  
*qu'il est impossible qu'un seul courant produise*

erit effect. (Dict. de Phys. tom. 1. page 597.)

2. Quod docet D. Francklin, nempe unicum existere rivulum, & in una lagenæ superficie coacervari fluidum electricum, dum eo prorsus destituta est altera superficies, id etiam indicare videtur istud experimentum: fluidum electricum in lagenam transmittas per ipsius uncinum, ita ut conductor cum interiori illius superficie communicet. Deinde tollatur uncinus (*le crochet*) & quidem cum ceræ Hispanicæ radio (*bâton de cire d'Espagne*) ut nihil ex sua electricitate amittat. Lagenam supra machinæ pneumaticæ orbem æneum (*la platine*) colloques eamque excipulo contegas, unde aerem educes. Si experimentum in obscuro loco fiat, ignem electricum videbis ex ore lagenæ copiose exeuntem: & plurimos in jactus divisum, qui sese inflectentes ad lagenæ alvum (*la panse*) properabunt. Experimentum iteres, cum eo tamen discrimine quod lagena per ipsius alvum virtute electrica imbuetur: tunc videbitur ignis electricus ex vasis alvo erumpere, in multos rivulos distrahi, qui sese incurvabunt ut lagenæ orificium subeant. Hæc omnia nonne probant superficiem quæ conductori jungitur (*qui communique*) nimiam acquirere ignis electrici copiam, dum altera minus habet quam ipsi opus est.

Hæc facta quæ secum pugnare videntur, non parum negotii faceffunt, ubi agitur de explicando Leideni experimento. Unde colligere est, nondum satis nobis exploratum esse modum, quo stupenda hæc lagena commotionem excitet.

Quæres 2. an aqua, vel minutum plumbum, aliave corpuscula, quæ in lagenam excitandæ commotioni destinata intromitti solent, electricitatem in seipsis recipiant; an vero sint mera vehicula, quibus electricitas in superficiem lagenæ interiorē deferatur.

Resp. hujusmodi corpora in se fluidum electricum non retinere, sed *conductorum* vices gerere, quorum ope electricitas in interiorē lagenæ



genæ superficiem deducatur. Id enim testari videtur experientia. Ejusmodi lagenam minuto plumbo semiplenam, postquam electricitate donata fuerit, supra fulcrum vitreum constituas, ut ipsius uncinum (*crochet*) eripere possis, sine ulla fluidi electrici jactura. Deinde eam manu comprehendas, & alteram lagenam similem, sed vacuum supra idem fulcrum colloques; in istam infundibulum vitreum intromittas, cujus ope in eam effundes quidquid minuti plumbi continet prior phiala.

Secundæ lagenæ aptentur prioris obturamentum & uncinum. Quo facto eam una manu corripas, & altera ipsius uncinum tangas; nullam experieris commotionem, & ne unam quidem scintillam inde obtinebis. Unde merito colligitur, nec uncinum, nec plumbum prioris lagenæ electricitatem in se retinuisse.

His peractis, ad priorem lagenam vacuum, cui primum communicata fuit electricitas, redeas. Hanc supra fulcrum vitreum colloques. Ope infundibuli vitrei in eam demittas minutum aliud plumbum, nulla electricitate imbutum. Cum eo semiplena fuerit, tolle infundibulum, in ejusque locum substituas obturamentum & uncinum, quibus primo instructa fuerat. Hanc lagenam una manu teneas, & alteram ad ipsius uncinum admove; tunc commotionem accipies majorem vel minorem, pro fluidi electrici quantitate, quæ in eam fuerat intromissa.

Inde manifestum est electricitatis copiam lagenæ communicatam, ut excitandæ commotioni idonea sit, intra superficiem ipsius interiorem recipi; minutum vero plumbum, aliæque corpora in lagenam introducta, meros esse conductores, qui in internam ipsius superficiem fluidum electricum deferunt.

## PARAGRAPHUS V.

*De proprietate quam habent cuspidēs ( les pointes ) materiam electricam hauriendi.*

**D**eprehendit D. Francklin, summa in tractandis rebus electricis sagacitate notissimus, eam cuspidibus inesse proprietatem, ut *conductori* materiam electricam copiosius subtrahant, & maiorem ad distantiam, quam corpora obtusa. Rem illo confirmavit experimento:

Aliquis supra fulcrum vitreum positus manū teneat virgam ferream, cuius rotunda sint duo extrema. Alterutrum *conductori* obiciat ad unius pedis distantiam; tunc vel nullo modo, vel nonnisi tantillum fiat electricus. Si vero virgam ferream adhibeat, quæ in apicem desinat, tunc probe electricus evadet, non tantum ad unius pedis a *conductore* intervallum, sed majori etiam in distantia.

Quæres an cuspidēs metallicæ totam *conductoris* electricitatem subducere valeant.

Resp. a cuspidibus metallicis totam exhausti *conductoris* electricitatem, & quidem tacite, ac sine ullo strepitu. *Conductori* enim quādam ad distantiam obiectis acutissimam metalli cuspidem; ipsius electricitatem ita subtrahet, ut languidula tantum scintillæ ex eo eliciantur. Metallum acuminatum propius admove, tunc adhuc remissiores erunt scintillule. Tandem prorsus evanescent, ubi ad *conductorem* satis accesserit; materiam igitur electricam ad ipsum affluentem subducit, eumque tota eius virtute electrica exuit.

Præterea *conductorem* tacite spoliat, ut demonstrat sequens experimentum: mucronem metallicum, & quidem non segregatum, (non *isolé*) *conductori* satis admoveas, ut ipsi materiam ejus electricam subripiat; ex eo nullam obtinebis scintillam, nullum audies crepitum: in

acu-

acumine autem punctum quoddam tenue & lucidum observabis, quo indicatur fluidi electrici ex *conductore* in cuspidem transitus.

Quantum sit in metallicis acuminibus virtutis, ad ignem fulmineum e nube procellosa eliciendum, alibi exponemus.

## PARAGRAPHUS VI.

### *De Causis virtutem electricam minuentibus.*

PLURIMÆ sunt causæ quæ virtuti electricæ noceant, & impendant ne suum omnem effectum obtineat. Hujusmodi sunt atmospheræ temperies quædam, animalium exspiratio, (*transpiration*) exhalationes e pulmonibus adstantium exeuntes, flammæ quæcumque. Omnia hæc aliæque nondum cognita partem electricitatis subtrahunt, quam *conductibus* transmittere conamur.

1. Experientia constat vapores aqueos electricitati via communicationis excipiendæ esse maxime idoneos, optimumque illius vehiculum. Quapropter ut funis virtutem electricam insigniter concipiat, ad notabilemque distantiam transmittat, humectari solet, & cum spongia madefacta perficari. Inde sequitur humorem aeris *conductores* ambientis, ipsis fluidi electrici partem suffragari, & traducere in humorem aeris vicini; ita ut e proximo in proximum (*de proche en proche*) hæc electricitas in commune receptaculum referatur.

Cui incommodo si velis, quantum fieri potest, occurrere, dissipandus est humor qui *conductibus* adhærescit, & maxime corporibus quæ iis segregandis (*à les isoler*) inserviunt. Quam ob causam, ubi cælo humido, remissiores sunt electricitatis effectus, ut eorum virtus excitetur, apparatusi admoveri solent foculi (*des rechauds de feu*) cum pannisque calidis exterguntur globi, *conductor*, & fulcra crystallina quibus innitur.

Secd

## PARAGRAPHUS IV.

*De causa Effectuum electricorum physica.*

**I**Nter varias hypotheses quæ ad explicanda electricitatis phænomena excogitata sunt, hæc principem locum sibi vindicare videtur, quam tanta cum sagacitate adornavit D. Nollet. Eam igitur præ cæteris describemus.

1. Clarissimus ille naturæ indagator, propter rationes supra expositas, censet materiam electricam nihil pene aliud esse, quam ignem ipsum elementarem.

2. Subtilissimum esse illud fluidum, siquidem corpora omnia, vel densissima, libere permeat.

3. Materiam electricam moveri juxta lineam rectam, non vero in circulum flexum. Id probat tum directio quam in tenebris sequi deprehenduntur cristullæ lucidæ, & tubo erumpentes; tum linea quam describunt corpuscula, siue cum attrahuntur, siue cum repelluntur.

4. Statuit corpus quodlibet electricum quadam materiæ electricæ atmosphæra circumdari. Ut enim ab eo eliciatur scintilla, illud tangere minime necesse est. At sæpe exsilit scintilla, dum digitus *conductori* admotus ab eo 9, 10, 12; imo & interdum 14. pollicibus distat.

5. Atmosphæram hanc compositam esse ex materiæ electricæ rivulis, quorum alii e corpore electrico effluunt, alii vero ad ipsum affluunt siue ab aere, siue a corporibus vicinis: existere autem illos materiæ simul *effluentis* & *affluentis* rivulos, sic probat:

Si corpori electrico admoveantur levia corpuscula, quales sunt lamellæ metallicæ, experientia constat ex iis alia versus corpus electricum tendere & impelli, alia autem statim ab eo repelli: atqui impulsus illi & repulsus satis indicant, diversos materiæ electricæ rivulos, quorum alii ad corpus electricum adveniunt, & alii

ab eo exeunt. Si enim non adesset nisi materia *affluens*, omnia corpuscula removerentur a corpore electrico; ad illud autem omnia accederent, si non existeret nisi materia *affluens*.

Præterea supra virgæ ferreæ superficiem injiciatur pulvisculus, & in ea excitetur vis electrica; tunc deprehendens partes hujus pulveris crassiores huc, illuc disjici & dissipari, particulas vero tenuiores corpori electrico adhærere: atqui duo illi effectus oppositi, varios demonstrant materiæ electricæ rivulos, alios scilicet e virgâ ferrea effluentes, alios in eam irruentes. Sed ipsum audiamus hujus opinionis parentem clarissimum:

*Quand on électrise une barre de fer, sur laquelle est répandu du son de farine, on voit d'abord toutes les parties grossières emportées par la matière électrique, qui s'élance du corps électrisé; mais on observe aussi constamment, que toute la surface du fer, quoique électrique, demeure couverte d'une poussière impalpable. Cette expérience prouve assez clairement, 1. que la matière électrique s'élance du corps électrisé, puisqu'elle emporte les corps légers qui sont sur sa surface; 2. qu'une pareille matière vient au corps électrique, réparer apparemment celle qui en sort, puisque les particules qui sont comme adhérentes au fer, ne s'y attachent, que par l'action d'une matière qui vient au corps électrique; comme celles qui s'envolent ne font connoître l'effort d'une matière qui sort.... D'ailleurs un corps ne s'épuise pas pour être continuellement électrisé; & comment ne s'épuiseroit-il pas à la fin, si rien ne réparoit les émanations qu'il fournit? 3. Que ces deux courans de matière, qui vont en sens contraires, exercent leurs mouvemens en même temps, puisque le même corps électrisé attire & repousse tout à la fois.*

Positis materiæ electricæ rivulis, quorum alii e corpore electrico exeunt, & alii in illud confluant, ingeniosè admodum phænomena ele-

Strica explicat auctor celeberrimus. E multis pauca feligemus.

*Phænomenum primum.* Corpora leviuscula, quales sunt paleæ, aut lamellæ metallicæ, corpori electrico admotæ nunc attrahuntur, nunc repelluntur.

*Explicatur.* Materia affluens obvia quæque corpuscula in corpus electricum impellit; qui motus dicitur *attractio*; materia vero effluens secum levia corpora rapit, eaque cogit a corpore electrico recedere; quo in motu situs est *repulsus*.

*Phæn. II.* Quando electrica fit virga ferrea, in parte ipsius extrema emicat, non sine aliquo strepitu, luminis cristula.

*Explic.* Unaquæque materiæ electricæ pars, inquit auctor, habenda est tanquam ignis elementaris particula, quæ materia quadam pingui, salari, vel sulphurea involvitur, & sese explicare nititur. Quando materia e corpore electrico erumpens, aliam offendit quæ ad ipsum advenit, sese mutuo collidunt. Quo conflictu franguntur involucra, in quibus ignis captivus regebatur: ignis e suis vinculis expeditus, circumquaque sese expandit, similique motu alias partes sibi cognatas & contiguas exagitat; eodem ferè modo, quo inflammatum pulveris pyrii granum, alia sibi proxima statim incendit. Igneæ particule, rupto carcere, aerem obvicum vi subita feriunt; hinc cæcus ille strepitus qui lucidis cristulis jungitur.

*Phæn. III.* Si homini electrico digitum admoveas, statim exsurgent splendide & crepitantes scintillæ, quæ in utroque ingratum, veluti punctulæ sensum excitabunt.

*Explicatur.* Scintillæ, ut modo diximus, oriuntur ex materiæ affluentis & effluentis conflictu. Ideo autem sensum doloris utrinque pariunt, quia duo materiæ inflammatæ rivuli ex partibus oppositis in sese invicem incurrunt. Ex illa enim collisione mutus nascitur repercussus, qui motum ipsorum efficit retrogradum. Ri-

valus vero materię electricę, quę flammam concipiendō sese dilatat, intra pellem ingredi non potest, quā illius poris vehementer distendat. Hinc motus ille doloris sensus, quem utrinque excitant pungentes scintillę.

*Phæn. IV.* Si homo electricus extremum digitum spiritui vini admoveat, illum inflammabit, maxime si paululum calefactus fuerit.

*Explicatur.* Materia electrica, ex dictis verus est ignis; norunt autem omnes ignem motu quodam agitatū, si incurrat in corpus ad inflammationem expeditū, illud incendere; cum igitur ex hominis electrici digito exeant igneę particulę, & spiritus vini ad conflagrationem sit paratissimas, eam in hypothesi proposita inflammari mirum non est. Observat D. Nollēt, quando vegeta est electricitas, ad inflammationem opus non esse, ut spiritus vini prius fuerit calefactus.

*Phæn. V.* Funem adhibeas madefactum, & quantum tibi libuerit longum; conductori machinę electricę alligata sit una illius extremitas; alteram manu teneat aliquis supra fulcrum resina conflatum positus. Si funis diversa per intervalla funiculis sericis sustineatur, homo supra fulcrum constitutus fiet electricus, quantumvis a machinā electrica distet, & quoscumque in sinus & anfractus funis flectatur.

*Explicatur.* Non dissentientur Physici, vel peritissimi, inquit D. Nollēt, in corporibus etiam densissimis, plus esse vacui, quam pleni; quanto magis autem credibile est, in fune, in virga metallica, &c., huiusmodi esse porositatē, ut materia electrica, subtilissimum illud fluidum, & ubique diffusum, in iis corporibus non interruptam habeat partium continuitatem? cum ergo volvitur globus vitreus, agitari non potest una radiorum electricorum extremitas, quin motus ille, eodem pene momento, in alteram transmittatur. Eodem enim fere modo se habent fluidi electrici particulę, ac globi

recta serie dispositi: porro si primum percutias, motus eodem pene instanti in ultimum traducitur. Quanto magis id contingere debet tenuissimis & mobilissimis materie electricæ partibus? Felicius autem adhibetur funis madefactus, quam siccus, quia in priori difficilius dissipatur fluidum electricum.

*Phæn. VI.* Una manu apprehendas phialam vitream, aqua semiplenam, intra quam inferatur filum metallicum, vi electrica imbutum. Deinde manum alteram ejusdem fili extremitati admoveas, ut exciterur scintilla. Vix micabit, cum brachia, aliasque corporis partes vehementer concuti senties. Si numerosa hominum series ita disposita sit, ut sese manu teneant, & qui agmen claudit, fili metallici extremitatem digito perstringat, tunc singuli similem commotionem, eodem fere tempore percipient. Famofum illud experimentum vocitari solet, *expérience de Leyde*, quia Lugdani Batavorum primo inventum est.

*Explicatur.* 1. Materia electrica, inquit idem Physicus, per filum metallicum in aquam illabitur, & per aquam intermediam in phialam admissa, ibi congeritur; hæc igitur fluido electrico tota prægnat, ideoque effectum vehementiorem præcreare debet.

2. Quando phialam una manu sustinens, altera scintillam ex parte fili metallici extrema elicio, vehementem in brachiis aliisque corporis partibus commotionem experior. Cujus effectus rationem hanc affert: rivulus materie igneæ a fili metallici parte suprema magno cum impetu erumpens, meum intra corpus insilit per manum quæ scintillam elicit. Alter etiam materie igneæ rivulus, cum eadem vi prosilit ex parte vasis inferiori, vitrum permeat, meumque in corpus irrumpit per manum quæ phialam sustinet. Duo illi materie electricæ rivuli e partibus oppositis irruentes, sese violenter intra meum corpus collidunt; qui confictus eam  
vehe-



vehementem commotionem excitat, qua totum meum corpus concutitur. Eandem ob causam plurimi simul homines in præfato experimento lectu simplici percutiuntur. Ingeniosa quidem est ista explicatio; eam vero gravissimis urgeri difficultatibus patebit ex modo dicendis.

S C H O L I U M.

Ut celeberrimum illud experimentum explicet clarissimus D. Francklin, longe aliam sequitur viam. Vitrum a materia electrica trajici existimat D. Nollet, idque variis probat experimentis, quale est istud: in globo vitreo excitetur virtus electrica, in quem immisum fuerit paululum pulveris lignei. Deinde sistatur illius globi motus, ad partemque ipsius infatorem admoveatur extremus digitus; tunc levia hæc corpuscula ab imo sursum exsilire videas; quod sane non aliunde oritur, quam ex materie electricæ impulsu, quæ e digito exiens pulverem hunc secum abripit; illud vero efficere non potest, quin globum trajiciat.

Id vero negat D. Francklin. Quo pacto, inquit, fieri posset, ut phiala tantam electricitatis copiam acquireret, & commotionem adeo vehementem excitaret, si fluido electrico pervium esset vitrum? nonne statim dissiparetur materia electrica, e vitro in manum transiens quæ lagenam sustinet, unde in commune receptaculum sese diffunderet?

Præterea statuit vitrum ex natura sua quandam electricitatis quantitatem continere, quæ suas inter superficies interiorem & exteriorem dispergitur, & qua proportionem una superficies novam fluidi electrici accessionem recipit, eadem proportionem aliquid ex sua electricitate perdit altera. Quod ut magis elucescat, supponamus in lagena contineri 100. electricitatis gradus: juxta mentem D. Francklin, 50. gradus in phialæ superficie interiori, & 50. alii in

exteriori resident. Quo posito, si interna lagenæ superficies 10. novos electricitatis gradus acquirat, ii 50. aliis additi efficiunt 60.; externa vero superficies, amissis 10. suæ materiæ electricæ gradibus, 40. tantum retinebit. Denique si interioris superficiei electricitas 50. gradibus augeatur, tunc 100. continebit, dum paupercula superficies exterior sua prorsus materia electrica spoliabitur. Tunc lagena fluido electrico, quantum fieri potest, instructa est (*garnie, chargée*). interior enim superficies novum electricitatis incrementum suscipere nequit, cum novam ipsius jacturam facere non potest exterior superficies.

Id adeo verum est, inquiunt illius opinionis defensores, ut lagena vim electricam non concipiat, nec excitandæ commotioni idonea sit, quando superficies illius externa de sua naturali electricitatis quantitate nihil perdere potest; cujus in facti gratiam allegant experimenta, quale est istud.

Lagenam bracteola stannea (*d'une feuille d'étain*) exterius vestitam e conductore suspendas: sed prius diligenter inspicias, an stannum ipsius superficiei accurate applicetur; annon in ea quedam sint exiguæ asperitates. Ut felicius succedat experimentum, tempore sicco utaris. Immo ne humiditas noceat, lagenam, antequam suspendatur, calefacis. Lagena sic comparata nonne videtur suscipiendæ electricitati optime accommodata? atqui tamen frustra sudaveris, ut eam electricam fieri cogas. Quam autem ob causam, nisi quia exterior illius superficiei nihil potest amittere, ideoque nihil etiam acquirere potest interior?

Ut vero compertum habeas lagenam non magis electricam esse post experimentum, quam ante, eam a conductore avellas, utendo duobus radiis (*baguettes*) crystallinis, quorum longitudo sit unius circiter pedis, eamque transferas in mensam; deinde lagenam una manu com-

prehendas, ex altera suam uncinam (*son cro-*  
*chet*) tangendo; nullam senties commotionem:  
 Immo ne levissimam quidem scintillulam ex ea  
 elicies. Adeo certum est, non posse quidquam  
 electricitatis in interiorē lagenæ superficiem  
 intrromitti; dum exterior e sua naturali electri-  
 citatis copia nihil perdere potest.

Juxta eundem Physicum interna lagenæ su-  
 perficies acquirat electricitatis copiam dimi-  
 nere, externa vero eam quam perdidit recupe-  
 rare nititur. Utrumque fit subito, ubi quædam  
 duas inter superficies instituitur communicatio,  
 ut contingit quando aliquis lagenam una manu  
 comprehendens, ex altera tangit uncinam (*le*  
*crochet*) in aqua lagenæ immersum. Tunc ignis  
 electricus e superficie interiori cum magno im-  
 petu in exteriorē irrumpit. Repentius autem  
 ille ignis electrici ab una superficie in alteram  
 transfusus commotionem excitat.

Ad alterutram D. Noller & D. Francklin  
 opinionem plus minusve accedunt aliorum Phy-  
 sicorum placita.

Quæres 1. utra magis ad verum accedat.

Resp. In ea re definienda plurimum esse dif-  
 ficultatis. Utrique enim opinioni patrocinari vi-  
 detur experientia. 1. Duo materiæ electricæ ri-  
 vuli oppositi, qui in aliis phænomenis electri-  
 cis tam aperte se produnt, & quos defendit D.  
 Noller, in Leidensi non minus sunt manifesti,  
 ut probat experimentum quod ita describit D.  
 Brisson: *Dans un cahier de papier de 18, ou 20.*  
*feuilles, plus ou moins, mettez trois lames min-*  
*ces de l'étain dont on se sert pour étamer les*  
*glaces, savoir une au milieu, & une de chaque*  
*côté après la première ou seconde feuille. fai-*  
*tes passer la commotion au travers de l'épaisseur*  
*de ce cahier ainsi garni. Vous trouverez, si*  
*la commotion n'est pas trop forte, les deux*  
*lames d'étain extérieures précées, & celle du*  
*milieu ne le sera pas. On conçoit aisément*  
*qu'il est impossible qu'un seul courant produise*  
*ces*

est effect. (*Dict. de Phys. tom. 1. page 597.*)

2. Quod docet D. Francklin, nempe unicum existere rivulum, & in una lagenæ superficie coacervari fluidum electricum, dum eo prorsus destituta est altera superficies, id etiam indicare videtur istud experimentum: fluidum electricum in lagenam transmittas per ipsius uncinum, ita ut conductor cum interiori illius superficie communicet. Deinde tollatur uncinus (*le crochet*) & quidem cum ceræ Hispanicæ radio (*bâton de cire d'Espagne*) ut nihil ex sua electricitate amittat. Lagenam supra machinæ pneumaticæ orbem æneum (*la platine*) colloques eamque excipulo contegas, unde aerem educes. Si experimentum in obscuro loco fiat, ignem electricum videbis ex ore lagenæ copiose exeuntem: & plurimos in jactus divisum, qui sese inflectentes ad lagenæ alvum (*la panse*) properabunt. Experimentum iteres, cum eo tamen discrimine quod lagena per ipsius alvum virtute electrica imbuetur: tunc videbitur ignis electricus ex vasis alvo erumpere, in multos rivulos distrahi, qui sese incurvabunt ut lagenæ orificium subeant. Hæc omnia nonne probant superficiem quæ conductori jungitur (*qui communique*) nimiam acquirere ignis electrici copiam, dum altera minus habet quam ipsi opus est.

Hæc facta quæ secum pugnare videntur, non parum negotii faciunt, ubi agitur de explicando Leideni experimento. Unde colligere est, nondum satis nobis exploratum esse modum, quo stupenda hæc lagena commotionem excitet.

Quæres 2. an aqua, vel minutum plumbum, aliave corpuscula, quæ in lagenam excitandæ commotioni destinata intromitti solent, electricitatem in seipsis recipiant; an vero sint mera vehicula, quibus electricitas in superficiem lagenæ interiorē deferatur.

Resp. hujusmodi corpora in se fluidum electricum non retinere, sed *conductorum* vices gerere, quorum ope electricitas in interiorē lagenæ

genæ

genæ superficiem deducatur. Id enim testari videtur experientia. Ejusmodi lagenam minuto plumbo semiplenam, postquam electricitate donata fuerit, supra fulcrum vitreum constituas, ut ipsius uncinum (*crochet*) eripere possis, sine ulla fluidi electrici jactura. Deinde eam manu comprehendas, & alteram lagenam similem, sed vacuum supra idem fulcrum colloques; in istam infundibulum vitreum intromittas, cujus ope in eam effundes quidquid minuti plumbi continet prior phiala.

Secundæ lagenæ aptentur prioris obturamentum & uncinum. Quo facto eam una manu corripas, & altera ipsius uncinum tangas; nullam experieris commotionem, & ne unam quidem scintillam inde obtinebis. Unde merito colligitur, nec uncinum, nec plumbum prioris lagenæ electricitatem in se retinuisse.

His peractis, ad priorem lagenam vacuum, cui primum communicata fuit electricitas, redeas. Hanc supra fulcrum vitreum colloques. Ope infundibuli vitrei in eam demittas minutum aliud plumbum, nulla electricitate imbutum. Cum eo semiplena fuerit, tolle infundibulum, in ejusque locum substituas obturamentum & uncinum, quibus primo instructa fuerat. Hanc lagenam una manu teneas, & alteram ad ipsius uncinum admove; tunc commotionem accipies majorem vel minorem, pro fluidi electrici quantitate, quæ in eam fuerat intromissa.

Inde manifestum est electricitatis copiam lagenæ communicatam, ut excitandæ commotioni idonea sit, intra superficiem ipsius interiorem recipi; minorem vero plumbum, aliæque corpora in lagenam introducta, meros esse conductores, qui in internam ipsius superficiem fluidum electricum deferunt.

## PARAGRAPHUS V.

*De proprietate quam habent cuspidēs (les pointes) materiam electricam hauriendi.*

**D**eprehendit D. Francklin, summa in tractandis rebus electricis sagacitate notissimus, eam cuspidibus inesse proprietatem, ut *conductori* materiam electricam copiosius subtrahant, & majorem ad distantiam, quam corpora obtusa. Rem illo confirmavit experimento:

Aliquis supra fulcrum vitreum positus maneat tenens virgam ferream, cuius rotunda sint duo extrema. Alterutrum *conductori* obiciat ad unius pedis distantiam; tunc vel nullo modo, vel non nisi tantillum fiat electricus. Si vero virgam ferream adhibeat, quæ in apicem desinat, tunc probe electricus evadet, non tantum ad unius pedis a *conductore* intervallum, sed majori etiam in distantia.

Quæres an cuspidēs metallicæ totam *conductori* electricitatem subducere valeant.

Resp. a cuspidibus metallicis totam exhausti *conductoris* electricitatem, & quidem tacite, ac sine ullo strepitu. *Conductori* enim quomodam ad distantiam obiectis acutissimam metalli cuspidem; ipsius electricitatem ita subtrahet, ut languida tantum scintilla ex eo eliciantur. Metallum acuminatum propius admove, tunc adhuc remissiores erunt scintillulae. Tandem prorsus evanescent, ubi ad *conductorem* satis accesserit; materiam igitur electricam ad ipsum affluentem subducit, eamque tota ejus virtute electrica exuit.

Præterea *conductorem* tacite spoliatur, ut demonstrat sequens experimentum: mucronem metallicum, & quidem non segregatum, (*non isolat*) *conductori* satis admoveas, ut ipsi materiam ejus electricam subripiat; ex eo nullam obtinebis scintillam, nullum audies crepitum: in

acu-

acumine autem punctum quoddam tenue & lucidum observabis, quo indicatur fluidi electrici ex *conductore* in cuspidem transitus.

Quantum sit in metallicis acuminibus virtutis, ad ignem fulmineum e nube procellosa eliciendum, alibi exponemus.

## PARAGRAPHUS VI.

### *De Causis virtutem electricam minuentibus.*

**P**lurimæ sunt causæ quæ virtuti electricæ noceant, & impendant ne suum omnem effectum obtineat. Hujusmodi sunt atmospheræ temperies quædam, animalium exspiratio, (*transpiration*) exhalationes e pulmonibus adstantium exeuntes, flammæ quæcumque. Omnia hæc aliaque nondum cognita partem electricitatis subtrahunt, quam *conductivibus* transmittere conamur.

1. Experientia constat vapores aqueos electricitati via communicationis excipiendæ esse maxime idoneos, optimumque illius vehiculum. Quapropter ut funis virtutem electricam insigniter concipiat, ad notabilemque distantiam transmittat, humectari solet, & cum spongia madefacta perficari. Inde sequitur humorem aeris *conductores* ambientis, ipsis fluidi electrici partem suffurari, & traducere in humorem aeris vicinæ; ita ut e proximo in proximum (*de proche en proche*) hæc electricitas in commune receptaculum referatur.

Cui incommodo si velis, quantum fieri potest, occurrere, dissipandus est humor qui *conductivibus* adhærescit, & maxime corporibus quæ iis segregandis (*à les isoler*) inserviunt. Quam ob causam, ubi cælo humido, remissiones sunt electricitatis effectus, ut eorum virtus excitetur, apparatusi admoventi solent foculi (*des rechauds de feu*) cum pannisque calidis exterguntur globi, *conductor*, & sulcra crystallina quibus innititur.

Sed

Sed quæcumque adhibeantur cautiones, aer atmosphære qui apparatus involvit, aqueis semper commiscetur particulis, quæ fluidum electricum plus minusve subripiunt, eoque sensim conductorem omnino spoliant. Quamobrem corpus post acceptam electricitatem, sub excipulo unde exhaustus fuit aer constitutum, eam longe diutius retinet, quam in alia qualibet circumstantia.

2. Quando experimentis electricis adest magnus spectatorum numerus, ex eorum expiratione & anhelitu humidior fit aer, sicque vim electricam non parum imminuit. Id constanti experientia sibi exploratum esse testatur D. Sigaud de la Fond. Quæ in re, ut in aliis plurimis, non consentit cum D. Noller, cujus ista sunt verba: *Quand j'électrise avec un globe par un temps favorable, quelque nombreuse que soit la compagnie, l'électricité, bien loin de s'affoiblir, n'en devient que plus forte, si on en juge par les aigrettes & par les étincelles qui sortent, ou de la barre de fer, ou d'une personne électrisée, jamais ces effets ne sont aussi beaux, qu'en présence d'une nombreuse assemblée . . . ce fait est si constant, que quand je veux animer les émanations lumineuses, ou exciter celles dont la lumière s'affoiblit, je fais approcher du monde, & cet expédient me réussit.* Uterque ille Physicus experientiam in suæ opinionis præsidium allegat; sed prioris sententia magis consentanea est proprietari, quam humoribus aqueis inesse constat, ut scilicet conductoris electricitatem plus minusve intercipient.

3. Effectibus electricis nocet etiam calor. Majorem enim attollit vaporum copiam, qui corporibus eam quam acceperant electricitatem auferant. Quapropter experimenta electrica per hiemem, dum viget accerrimum gelu, feliciter succedunt, quam per æstatem. Ea de re consentiant Physici.

4. Flamma, sive candelæ, sive lampadis, si-



ve alia quæcumque, effectibus electricis plurimum affert obstaculi. Narrat enim D. Nollet, cum tubo vitreo uteretur ad exponenda electricitatis phænomena, rem sibi non prospere cessisse, quoties lumen aderat. Istud alterum experimentum memorat: triginta, inquit, candelas cereas (*bougies*) ita disposui, ut circulum efficerent, cujus diameter erat octo fere pedum. Illius centrum occupans, tubum vitreum diu & totis viribus perfricavi: attamen tenuissimam duntaxat electricitatem acquisivit, quæ etiam brevi tempore sese dissipavit. Postquam vero extinctæ fuissent candelæ, electricitatem multo vegetiorem accepit, eamque diutius retinuit. Ut ergo ejusmodi experimenta felicem habeant exitum, quam paucissimis utendum est luminibus, ab iisque removendum corpus quod electricum fieri volumus.

Ne tamen cum quibusdam Physicis, & ipso Nollet existimes, flammam ita esse electricitatis inimicam, ut eam in aliis corporibus destruat, nec unquam in se admittat. Certum quippe est flammam via communicationis electricam fieri, ideoque fluidum electricum ad conductorem adveniens subripere. Cum vero flamma singulis momentis dissipetur & renovetur, novum continuo electricitatis sortum conductoribus facit, in atmospheramque transmittit: Eo tantum sensu effectibus electricis nocet.

A flamma electricitatem via communicationis suscipi, & deinde transmitti hoc experimento constat, cujus auctor est D. Waitz. Ut obscuritatem effugiamus. Illud gallicè referemus.

*Posez sur deux pains de résine une règle de bois, ou une planche qui ait environ six pieds de longueur. Placez aux deux extrémités de cette règle deux bougies allumées & dans leurs flambes. Suspendez à des cordons de soie deux verges de fer de trois à quatre pieds de longueur, & que l'un des bouts de chaque verge soit élevé de sept à huit pouces au dessus de la bougie cor-*

respondante. Électrifiez ensuite l'une des verges que vous ferez communiquer avec le conducteur de la machine électrique, & vous observerez que l'extrémité opposée de l'autre verge sera pareillement électrisée, malgré la distance qui les sépare. L'électricité excitée dans la première verge passe donc à la seconde, & elle n'y passe que par l'intermède des deux lumieres, qui se chargent & qui transportent au loin le fluide électrique, & en distribuent une partie à la seconde barre isolée.

En veut-on la preuve la moins équivoque? il suffit d'éteindre les deux bougies, & de laisser les choses dans le même état où elles étoient précédemment, ayant soin toutefois d'enlever aux deux barres de fer, ou au moins à la seconde, l'électricité qu'elle auroit conservée. Cela fait, électrifiez de nouveau la première barre, celle qui communique avec le conducteur, elle se chargera plus puissamment d'électricité, que dans le premier cas; & la seconde barre ne donnera plus alors aucun signe d'électricité; preuve incontestable qu'elle n'avoit acquis cette propriété dans le premier cas, que par le ministère de la flamme, & conséquemment que la flamme s'électrifie par communication, qu'elle transmet même à une grande distance le fluide électrique qu'elle dérobe au corps électrisé. (Précis historique & experim. des Phénom. élect. pag. 224.)

## PARAGRAPHUS VII.

*De Materia electrica variis corporibus  
applicata*

**E**LECTRICITAS diversis corporibus, & maxime organicis, applicata, mirabiles quosdam effectus procreat qui Physicorum attentione sunt dignissimi.

1. Succî nutritiî in plantis circulationem accelerat, ut testantur plurimæ Physicorum observationes.

servationes. D. Jallabert clarissimus apud Gene-  
venses Philosophiæ professor, experimentum fa-  
cit in bulbis (*oignons*) junquillæ, (*hyacinthe*)  
& narcissi, qui lagenis (*carafes*) aqua plenis  
impositi erant. Plerique enim radices & folia,  
nonnulli gemmas etiam egerant. Radicum, cau-  
lium & foliorum longitudinem accurate dimen-  
sus est. Deinde lagenas super fulcra resinacea  
collocavit, & interpositis æreis staminibus,  
(*filz d'archat*) communicationem instituit in-  
ter lagenarum aquam & conductorem.

Per decem dies, & quotidie 8. vel 9. horis  
virtutem electricam his bulbis transmissit. Quo  
tempore elapso, longe major fuit hujusmodi  
bulborum progressus, quam aliorum ejusdem  
speciei, licet prioribus, excepta electricitate,  
omnino similium. In bulbis virtute electrica  
imbutis, visa sunt folia sese latius expandere,  
caules magis augescere, flores celerius sese ex-  
plicare.

Eidem experimento quædam subjecit semina  
quæ, juvante electricitate, paulo citius germi-  
nantur, quam alia ejusdem generis, in simile  
solum jacta, sed electricitatis subsidio destituta.  
Vide opus D. Jallabert, cui titulus, *Expériences  
sur l'électricité*.

2. Fluidorum quæ in vasis capillaribus conti-  
nentur, motum insigniter accelerat electricitas;  
ut probat istud experimentum: sit vas metalli-  
cum *A* (*fig. 101.*) suo in fundo plurimis pertu-  
sum foraminibus, iisque aptentur tubuli capilla-  
res *a, a, a*. Vas illud aqua impletum, per suum  
uncinum *B* (*son crochet*) suspendatur conductori  
machinæ electricæ. Aqua guttatim & ægre ex  
iis canaliculis defluat, & singulas inter guttas  
quædam observabitur interruptio. Deinde in con-  
ductore, ideoque in vase *A* vim electricam ex-  
cites; aqua illico e tubulis erumpens, ad distan-  
tiam usque notabilem rapido jactu profiliet.

3. Ex prædicto phænomeno certum est, ele-  
ctricitate accelerari fluidorum per tubos capilla-  
res.

res motum. Major esse debet effectus ille in corpore humano, cujus vascula sunt magis capillaria. Inde conjecerunt multi Physici quibusdam in morbis utiliter adhiberi posse virtutem electricam, & maxime ad motum membrum paralyti torpentibus restituendum. Id non pauci tentarunt Physici, & quidem interdum feliciter. Non desunt enim paralyticorum exempla, qui electricitatis beneficio convalescere. Plurima hujusmodi facta narrantur in operibus D. Sigaud de la Fond, quorum tituli sunt, *Traité de l'Electricité; -- Précis historique & expérimental des phénomènes électriques.*

Ex multis unum duntaxat felicitius exemplum quod legere est in opere D. Jallabert, cui titulus, *Expériences sur l'Electricité.* Faber ferrarius Genevensis, cui nomen Noguez, homo tenui infirmaque corporis valetudine, annos natus 52., dum ferrum caderet, exeunte mense junio anni 1732., frustrato ictu (*par un coup porté à faux*) homi prostratus est, omni motu & sensu destitutus. Quamvis diversa adhibuisset remedia, nihilominus tota brachii dextri pars inferior remanserat paralytica, & præterea ex eodem latere claudicabat. Quo in statu D. Jallabert sese obtulit die 26. decemb. an. 1747. Egregius ille Physicus ægrum diversis operationibus electricis subiecit, ad diem usque 28. mensis febr. an. 1748.; quo tempore omnino convaleuit ægrotus. In operibus modo indicatis videas claudos electricitatis beneficio ambulantes, surdos audientes, mutos loquentes, aliaque ejusdem fluidi prodigia.

Ubi completa est paralytis, quando scilicet æger sensu & motu simul destituitur, tunc commotioni electricæ eum frequenter subijci necesse est, ad nervos vehementius concutiendos, & motum in partes paralyticas revocandum. Cum autem ex crebris & violentis illis concussibus laceretur pectus ægrotantis, ita dirigendus est impetus electricus, ut eas tantum partes qua-

quas, quibus restituendus est motus. Quo pacto id fieri possit indicat D. Sigand de la Fond in operibus supra citatis.

### ARTICULUS III.

#### *De Terræ Motu.*

**E**X omnibus naturæ phaenomenis nullum est cujus magis terribiles sint effectus, latiusque pateant, quam terræ motus. Hinc globo terrestri contigerunt tot tantæque rerum conversiones. Mare suis e sedibus excitum; urbes subversæ; montes diffusi; alio translati, corruentes; provinciae integræ altissimo terræ hiatu absorptæ; immensæ regiones & continente avulsæ, aliæ in aquis demersæ, aliæ vero imis ex fluctibus emergentes; insulæ e fundo maris illico prodeuntes; rivi in alium cursum detorti: en horrenda spectacula quæ nobis exhibet terræ trepidatio.

Articulum istum duos in paragraphos dividimus; in priori quibusnam causis tribuendi sint terræ motus exponemus; in posteriori quasdam de his præponemus quæstiones.

### PARAGRAPHUS I.

#### *Quibus causis tribuendi sint terræ Motus.*

**T**Riplex causa est, ignis scilicet, aer & aqua: 1. quidem ignis. Cum terra in intimis etiam suis penetrabilibus concussa videretur, tantam quassationem non aliunde oriri existimatum fuit, quam ex immensa ignis congerie, qui in terræ sinu semper incensus erat; quem ignis *centralis* nomine Physici quidam designarunt. Præcipuas in hoc phaenomeno partes ignem sibi vindicare non equidem negaverim; sed minime necesse est ad ignes confugere, in centro terræ humanis oculis impervio constitutos.

In terræ visceribus passim reconduntur corpo-

ra ad conflagrationem paratissima . Cujusmodi sunt carbonēs fossiles, bitumen, sulphur, alumen, pyritæ, &c. quæ omnia incendiis tum excitandis, tum nutriendis maxime sunt idonea . Docet enim experientia substantias bitumineas, & aluminosas, postquam congestæ fuerunt, & aliquandiu soli & imbribus expositæ, ignem sponte sua concipere, verasque edere flammās . Constat præterea fodinas, præsertim carbonis fossilis, plurimis prægnare vaporibus, qui facile in ignes erumpunt, tantumque fragorem, ut subterraneum quoddam tonitru efficiant .

Denique compertum est sulphure & limatura ferri simul permixtis & fermentescentibus ignem procreari . D. enim *Lemery* ex æqualibus limaturæ ferri, & sulphuris in pulverem comminutis partibus, aqua dilutis, & simul commissis massam composuit 50. librarum; eam deinde in vase posuit, quod terræ ad unius pedis altitudinem infodit . Elapsis novem horis, observavit humum huic vasi incumbentem intumescere & dehiscere, multosque emittere vapores quibus flamma successit; cum ergo in cavernis subterraneis congerantur succi sulphurei & particule metallicæ, fieri potest ut simul fermentescendo ignem concipiant .

2. Quovis modo intra terram ignis excutitur, id sine aeris contactu fieri non posse certum est; ingentem vero illius fluidi copiam in terræ cavernis contineri dubitare non licet . Quæ enim fodinis operam dant, dum rupes suis instrumentis verberant & aperiunt, aerem interdum audiunt cum vehementi stridore exsurgentem, sæpe etiam quibus utuntur lampades extinguunt . Satis igitur aeris in terræ specubus includitur, ut substantiæ ad inflammationem idoneæ ignem concipere queant . Ubi vero ignes in antris subterraneis accenduntur, aer interior & captivus plurimum dilatatus, undequaque sese explicare, viamque sibi eluctari nititur . Eo vehementior est nixus ille, quo majora sunt & materiæ inflamm.

flammatae copia, & aeris expansi volumen, & obstacula quae ipsi opponunt rupes circumpositae, in quibus veluti incarceratur; quantus vero sit aeris ita comparati impetus neminem latet.

3. In excitandis terrae motibus suas etiam partes habet aqua. Ingentem illius copiam in terrae visceribus includi nemo dubitaverit. Quo enim altius in loca subterranea descenditur, eo major occurrit aquae quantitas. Non semel accidit ut, dum fodinarum operarii rupes perforant, inde subito erumpat tanta aquae vis, ut suffocentur. Duplici autem potissimum modo excitandis terrae motibus aqua inservit. 1. Ignibus in vapores resolvitur, quam antem stupendus sit vaporum sese expandere nitentium impetus, ex postea dicendis compertum erit. Aqua igitur subterraneas intra cavernas in vapores resoluta, ut suo e carcere exeat vim omnem suam adhibet: cum autem nullus ipsi pateat exitus, in rupes, quibus coercetur impetum facit, easque vehementer succutit. Inde nascitur commotio quae remotissima in loca transmittitur. 2. Terribiles sunt aquarum in materiam inflammatam decidentium effectus. Id enim violentae eruptioni locum praebet. Quae veritas ex eo patet quod evenire consuevit, cum aquae gutta in metallum liquefactum incidit. Tunc enim summum est periculum ne subvertatur officina (*l'atelier*), opificumque vita in apertum discrimen adducitur.

### COROLLARIUM.

Ex dictis sequitur 1. in terrae visceribus delitescere substantias ad inflammationem expeditas, quae ignem aliquando concipiunt; 2. aerem ibi inclusum, iisque ignibus maxime dilatatum, vehementer eniti ut amplius spatium sibi vindiceret; 3. aquam subterraneis incendiis in vapores conversam, vim incredibilem exerere, ut ea omnia superet, quae obstant ne sese expandat.

His ita constitutis, varia terræ motus phœnomena satis facile explicantur. Terra tremiscente, plerumque accidit nuptare ædificia, vehementes surgere ventos, horribicos audiri fragores, civitates corruiere, montes subsidere, valles assurgere, novas insulas e mari emergere atqui omnia hæc phœnomena ex dictis sponte defluunt.

1. Scilicet aer interior & vapores ignibus subterraneis dilatari, & coerceri impatientes, ut sibi exitum moliantur, antrorum in quibus continentur latera alternis quasi vicibus diverberant & succutiant; unde fit ut superposita ædificia, modo in unam, modo in alteram partem inclinentur. 2. Aer & vapores captivi, tandem sibi viam aperiant, qua parte debilior est caverna. Illico suis e claustris erumpunt, & aerem sibi obvium maximo impetu propellant: hinc venti. 3. Suis e carceribus exentes, aerem externum vehementer comprimunt; iste vero, utpote vegero præditus elaterio, in priorem statum sese restituere nititur; in eumque sese restituendo, horrendum hunc fragorem excitat, qui terræ fremitum comitari solet. 4. Si aer & vapores simul in antris subterraneis tumultuantes, eorum fornicem ita concutiant & sejungant, ut in fundum præceps ruat, tunc ipsi imposita tellus statim absorbetur. Quo in loco si qua civitas jaceat, eadem opprimetur ruina. Ubi vero fornici incumbit mons aliquis, deprimitur & solo poterit adæquari. 5. Quando terra partem cavernæ superiorem contegens, sulphurea est, vel bituminea, vel argillacea, si vaporum aerisque impetum sustineat, tunc subjectis ignibus plurimum dilatata, intumescet & attolletur; inde mons novus extabit. 6. Tandem aere & vaporibus internis fundus maris aliquando suscolletur, & statim ex aquis emerget; tunc novam apparere insulam miraberis.



PARAGRAPHUS II.

*Proponuntur nonnullæ quæstiones ad terræ motum pertinentes.*

**Q**UÆRES 1. quænam phænomena terræ motum præcedant.

Resp. 1. Non semel observatum fuit, inquit D. Briffon, post annos pluvios contingere terræ motus; unde conjicere licet aquam pluvialem, dum terram diluit, rimas & aperturas occludere, quæ aeri & ignibus subterraneis exitum permittebant. 2. Ignes erratici (*feux follets*), vapores qui sulphureum spargunt odorem, cælum rubicundum, nubes nigræ & densæ, tempus grave & molestum, plerumque signa sunt hujus calamitatis prænuntia. Aliquando tamen eam præcedit tempus omnino serenum & placidum. 3. Videntur animalia terrore perculsa, quem suis mugitibus vel ululatibus significant; aves huc, illuc volitant inquietæ, eamque præ se ferunt sollicitudinem, quam ostendere solent, ubi imminet tempestates; 4. sæpe auditur fragor, quasi tonitruum cujusdam subterranei, vel tormentorum bellicorum; effectus est aeris in sese millies redeuntis & volutari, priusquam exitum invenerit; 5. multis in locis fontium & puteorum aquæ evadunt turbulentæ, sulphureum emittunt odorem, vel etiam ebullire videntur; quæ omnia tribuenda sunt vaporibus sulphureis qui subter humum incalescunt, sibi que exitum parant.

QUÆRES 2. Cur loca mari vicina & montana terræ motibus magis obnoxia sint, quam alia.

Resp. Illud inde oritur quod regiones mari proximæ magis abundant bitumine, & aliis corporibus inflammationi idoneis, quæ tantas in terribili hoc phænomeno partes habent. In locis etiam montuosis vastissimæ reperiuntur cavernæ, & immensa receptacula, in quibus plerumque

congeruntur substantiæ sulphureæ, bituminosæ, & aliæ quæ ignem facile concipiunt, & terræ quassationem provocant.

Quæres 3. quo pacto fieri possit ut terræ motus ad loca maxime dissita propagentur.

Resp. Partes ex quibus constat globus noster secum invicem intimè colligatæ sunt. Terra autem diameter non habet nisi circiter tria leucarum millia; fieri igitur potest ut in terræ viscibus spatiosa quædam sit caverna, quæ tantam contineat sulphuris, bituminis aliarumque huiusmodi substantiarum copiam, ut sua inflammatione commotionem excitent, qua concutiat universa terræ moles.

Præterea docent rerum naturalium investigatores (*lex Naturalistes*), teste D. Sigaud de la Fond, plurimas esse in terræ sinus cavernas, quæ secum invicem per rimas quisdam & fissuras communicant, & easdem continent substantias ad inflammationem expeditas: potest igitur cavernæ primo loco incensæ ignis, per cæcos illos meatus in alias serpere, & sic de aliis ad remotiorem usque cavernam. Unde fieri potest, inquit, ut longissime transmittantur internæ illæ conflagrationes, & proinde terræ motus.

Non dissimulandum est tamen, vix ac ne vix quidem concipi, inflammatione successiva, tam subito, tam longe propagari posse terræ quassationem. Quæ enim Ulyssiponensem (*Lisbonne*) prima die Novembris an. 1755. subvertit, eodem tempore vim suam in America exeruit. Idcirco electricitatem in terræ motibus primas partes agere putant multi recentiores Physici.

Materia enim electrica ubicumque diffunditur. Quando certis causis, quas assignare difficile est, excitata fuit, tunc inflammatur, vique sibi propria moles vastissimas & maxime remotas succutit, & quidem instanti fere indivi-  
duo.

Quæres 4. qua ratione a terribili hoc phœnomeno sese defendere possint homines.

Resp.

Resp. quovis tempore remedium investigasse Physicos, quo funellis terræ motibus occurrerent. Id aliquatenus affecuti sunt Veteres. Quædam scilicet adhibebant spiramenta (*soupiraux*), altos fodiebant puteos in locis quæ terræ trepidationi maxime erant obnoxia. Testatur Plinius exinde rarius accidisse hanc calamitatem. Eodem modo ab illa clade suum capitolium defenderant veteres Romani; ea Romæ pars nihil damni passa est a terræ motibus, qui alias sui ambitus (*de son enceinte*) partes vexarunt.

Post luctuosum terræ fremitum qui die 20. Aprilis anni 1721. Taurisum urbem Persidis (*Tauris*) vehementer afflictauit, & ubi antea frequens erat illud infortunium, idem adhibitum est remedium. Plurimi effossi sunt putei; ex eo tempore non audivimus civitatem hanc ullum terræ motum expertam fuisse. In eo sita est hujus remedii efficacitas, quod illi putei in altum fossi, materiæ intra globum interiorem accensæ liberum præbeant exitum. Facile autem concipitur materiam hanc, quamdiu per hujusmodi spiramina effugere poterit, nec fuerit nimium accumulata vel copiosior, plurimum damni non esse allaturam.

Nonnullæ tamen esse possunt circumstantiæ, in quibus aperturæ illæ, non satis tutum sint adversus terræ quassationem præsidium. 1. Enim contingere potest, ut substantiæ quæ terræ motibus dant causam, iis in locis congerantur & inflammentur, quæ ab hujusmodi putei nimium distent. 2. Tanta esse potest materiæ subito deflagrantis copia, ut non satis amplam in iis terræ excavationibus exitum inveniant. Quibus in circumstantiis putei effossi nos parum a periculo defenderent.

Quæres 5. utrum; præter puteos, quæsitum fuerit efficacius aliquod remedium.

Resp. Aliud, & quidem ingeniosum excogitavit D. Bertholon S. Lazari Presbyter, in rebus physicis versatissimus; quo in genere pluri-

mas variis in Academiis palmas tulit. Quod proposuit remedium, malum suis in principiis aggreditur. Observationibus nititur quas in dubium revocare non possunt, qui materię electricę vim præcipuas in terrę motibus partes habere existimant, & qui leges norunt quibus illius materię motus obsequitur. Ea de re dissertationem vulgavit, quam insertam videas Diario Physico (*Journal de Physique*) D. Rozier, pro mense Augusto anni 1779.

Eo spectat auctoris consilium, ut suam terrę quasi fulminantem materiam subtrahat, sicque repentinum ipsius ex globo terrestri exitum impediat. Ita enim funestis quos descripsimus effectibus occurreretur. Rem isto modo posse obtineri auctor existimat: altius, quantum fieri potest, in terra defigendę sunt longissimę virgę ferreę, quarum duo extrema, alterum sub terra reconditum, alterum supra globi terrestris superficiem eminens, plurimis armentur *verticillis*, sive cuspidibus acutissimis & divaricatis (*divergentes*). *Verticilli* inferiores, quidquid materię electricę in terrę sinu redundabit, subtrahent. Fluidum illud per totam virgarum longitudinem sese transmittens, deinde in aerem atmosphærę per cuspides, seu *verticillos* superiores, dissipabitur.

Suadet auctor ut virgarum inferior extremitas, plurimos in ramos dividatur longissimos, & a se invicem disjunctos (*divergens*), ut simul conspirantes materiam electricam potentius subducant. Eodem armari debet modo extremitas superior, ut canales per quos effluens materia electrica in auras dilabitur, iis saltem æquales sint, a quibus ab imo sursum deducta fuit.

Auctor plurimas exigit virgas electricas, quia non sufficit una. *Conductorum* metallicorum numerus proportionem habeat necesse est, 1. cum materię electricę terrestris copia; 2. cum loci amplitudine, cujus incolumitati consultum voluit.

latus. Eorum vero intra terram longitudo, major vel minor, pro loci (*du foyer*) altitudine esse debet. Quæ omnia, inquit, rectius æstimari non possunt, quam ex præteritorum hujusmodi eventuum experientia.

## ARTICULUS IV.

*De Montibus Vulcaniis (des Volcans).*

**E**O nomine intelliguntur ii montes, qui certis temporibus fumum, flammæ, cineres, & materiæ liquefactæ torrentes evomunt. Terribile illud phænomenum eandem habet originem, ac motus terræ. Utrumque scilicet nascitur ex conflagrationibus subterraneis aere excitatis, & quarum impetus aqua plurimum augetur. In articulo præcedenti ostendimus in terræ sinu plurimas contineri substantias ignibus excitandis & nutriendis aptissimas. Quæ ibi jam diximus repetere supervacaneum est.

Vulcanii montes quasi terræ spiramenta (*les soupiraux*) habendi sunt, vel tanquam camini per quos erumpunt materiæ accensæ, quæ ipsius sinum voracibus flammis absumunt. Nisi enim hujusmodi canales offenderent, aer & aquæ vapores, igne subterraneo vehementer dilatati, longe majores in globo nostro clades agerent; iis enim semper funditus subverterentur regiones quibus subessent. Naturæ igitur beneficia reputandi sunt montes ignivomi, qui liberum substantiis inflammatis præbent exitum. Idcirco in diversis orbis partibus divina providentia hujusmodi spiramina collocavit. Tria nostris temporibus præcipua numerantur in Europa; nimirum *Etna* in Sicilia, mons *Vesuvius* in regno Neapolitano, *Hæcla* in Islandia.

Ignium vulcaniorum eruptionem prænuntiare solent subterranei sonitus, tonitruum fragoribus similes, & horridi quidam stridores; terra suis in fundamentis concuti videtur. Quæ phæno-

mena permanent, donec aer & vapores satis vi-  
rium acquiescent, ad vincenda quæ eos capti-  
vos tenent obstacula. Tunc autem fit explosio  
ea longe vehementior, quam efficere solet quæ-  
libet tormentorum bellicorum emissio (*décharge  
d'artillerie*). Materia inflammata tubulis ignitis  
volatilibus (*fusée volantes*) similis, circumqua-  
que ad incredibilem distantiam vibratur, per-  
que montis verticem subito impetu exsilit. In-  
de exire videas stupendas rupium moles, quæ ad  
maximam altitudinem in aera elatz, deinde re-  
cidunt, & per montis declivia volvuntur; agri  
circumjecti cinerum, arenæ ardentis & pumi-  
cum acervis obruuntur. Sæpe montis latera  
subito dehiscunt, unde fluunt materię liquidæ  
& incensæ torrentes, qui arboribus, ædificiis &  
agris obviis horrendam cladem inferunt. Ab hi-  
storia discimus in duplici Vesuvii eruptione,  
tantam ex eo monte erupisse cinerum copiam,  
tantoque impetu, ut in Ægyptum, Lybiam &  
Syriam delati fuerint.

Observatum fuit plerosque montes vulcanios  
in maris vicinia positos esse. Ad augendam eru-  
ptionum violentiam situs ille plurimum confert:  
aqua enim per montis fissuras in materię inflam-  
matæ acervos delapsa, vehementissimam, explo-  
sionem procreet necesse est. Magis autem ter-  
ribiles esse debent effectus, cum aqua illa bitu-  
minea est; salinisque particulis onusta. Quam  
veritatem testatur vulgare experimentum: coqui  
scilicet, ut prunas ardentiores efficiant, in eas  
salis pugillum (*une poignée de sel*) conjiciunt:  
unde longe vividior fit ignis.

Aliquando contingit ut, postquam montes vul-  
canii per longam sæculorum seriem varias  
eruptiones ediderint, tandem conquiescant.  
Illud inde fit, quod materię quæ ipsorum con-  
flagrationes excitabant, vel penitus exhaustæ  
fuerint, vel aliam inierint viam. Enim vero  
non semel deprehensum fuit, cum montes qui-  
dam ardere desierint, alios fieri vulcanios, & i-  
gnem

gnem pari, imo etiam majori impetu evomere. Ex. gr. mons *Hæcla* in Islandia plurimis ab annis flammam emittere cessavit, sed alius ejusdem insulæ mons factus est ignivomus. Variæ orbis partes viatoribus multis offerunt montes, qui olim *Vulcanis* fuerunt, ut probant pumices, saxa calcinata, sulphur, cineres, alumen, sal ammoniacus, quibus abundat tellus circumjacens. Non solis e montibus exennt ignes subterranei: aliquando enim e fundo maris visa sunt emergere ignes, saxa incensa, pumices, immensaque arenarum, cinerum aliarumque substantiarum congeries, nede novæ existerent insulæ. Sic anno 1720., mense decembri, prope insulam *Sancti Michaelis*, unam ex *Azoribus* (des *Açores*), ab idmo pari statim erupit immensis lapidum, arenarum, aliorumque corporum acervus, qui novæ insulæ omnem dedit repentinum.

## C A P U T II.

*De Phænomenis aquis.*

**D**icitur sumus 1. de natura & proprietatibus aquæ; 2. de actu maris reciproco; 3. de illius salsetine; 4. de fontium & fluminum origine.

## ARTICULUS PRIMUS

*De natura & proprietatibus Aquæ.*

**Q**uæres 1. quænam figura tribuenda sit aquæ partibus.

Resp. Juxta Cartesium partes sunt oblongæ, flexibiles, angustis similes, & motu intestino quaquaversum agitatur. Censent autem alii Physici aquæ particulas toridem esse globulos exiguos, maxime leves, multisque interstitiis a se invicem disjunctos. Quæ sententia plurimas ob rationes videtur probabilior.

stat aquam, quantum fieri potest, purissimam, odoris & saporis esse expertem; porro id oriri verisimillimum est ex eo quod ipsius particulæ sint teretes. Si enim aliam haberent figuram, sive angulosam, sive oblongam, ideoque ex utraque parte acuminatam, organa vellicarent, ac proinde odoris & saporis sensus quosdam excitarent. 2. Aqua est admodum fluida & mobilis; atqui nulla est figura ad motum aptior, quam sphaerica. 3. Eæ sunt aquæ dotes, ut partes corporis, vel maxime delicatas, innoxia contingat, ut vulneribus lavandis adhibeatur; quia scilicet ob figuram suam rotundam, supra illas partes facillime & sine ulla offensione volvitur. 4. Constat innumeros esse aquæ pores; atqui id aliunde non contingit, nisi ex eo quod particulæ, utpote rotundæ, multiplex inter se inane spatium necessario relinquant; quod certe non fieret, si aquæ partes essent quasi toridem angullæ, ut docet Cartesius.

Quæres 2. quænam sit aquæ utilitas.

Resp. Numero propemodum infinitæ sunt aquæ utilitates: 1. ad servandam sanguinis fluiditatem in homine & ceteris animantibus plurimum confert. 2. Ciborum in stomacho coctionem mirum in modum adjuvat. 3. Plurimas in se continet virtutes medicas, & sanandis quibus applicatur vulneribus non mediocriter inservit. 4. Aqua vigent arbores & plantæ. 5. Ad hominum nutritionem non parum conducit; experientia enim compertum est posse homines per 20., imo per 40. dies, ab omnibus alimentis abstinere, & tamen vivere, modo aqua non careant. 6. Maxima est aquæ in extinguendis incendiis efficacia. 7. Cum partes aquæ facile pannorum aut linteorum pores trajiciant, possunt hujusmodi corporum sordes diluere. Eam vero non habent soliditatem, qua valeant linteorum sordes oleosas incidere; idcirco in lixivis adhibentur cineres, qui multos sales continent; eos sales a cineribus aqua elicit, iisque



veluti armatur; rigidis illis ac penetrantibus corpusculis instructa; pinguedinem pannis & linteis implicitam divellit. Quamobrem cineres ligni in fluviis diu jactati, cujus sales fere omnes dissoluti fuerunt, in lixiviis parum sunt utiles.

Quæres 3: utrum aqua comprimi possit?

Resp. Aqua non potest eo modo comprimi, qui oculis deprehendatur, ut constat experimento a Physicis Florentinis, & deinde ab aliis tentato: includatur aqua pura in globis aureis vel argenteis, plumbeis vel stanneis, qui deinde agglutinentur (*que l'on soude ensuite*); si globos illos vel prælo comprimere, vel repetitis mallei ictibus complanare aggrediaris, comperies aquam vix ac ne vix quidem densari; per metallorum enim *poros*, instar roris, ea proportionem effluet, qua interiorem globorum capacitatem minues, eos vel comprimendo, vel percutiendo; nec aliquid discriminis deprehendes, siue aquam communem, siue aquam aere expurgatam adhibeas.

Inde colligendum est durissimas esse aquæ particulas, nec facile figuram mutare, nec impleri spatia inter eas interjecta. Ex illa duritie fit, ut non sine vivido sensu doloris, aquam expansa manu violenter percutias: quando fistula ferrea (*un fusil*) glandibus plumbeis instructa, oblique in aquam disploditur, ex ea parte complanari solent, qua feriunt aquam, quasi adversus lapides immissæ fuissent. Quinimo si plurimum pulveris pyrii contineat fistula, tunc glandes in fragmenta dissilient, ob nimiam qua in aquam impelluntur celeritatem. (*Hist. Acad. Scient. Paris. anno 1705.*)

Ex iis tamen ne concludas aquam nullo modo comprimi posse. Ex præfato enim Physicorum Florentinorum experimento id unum sequitur, nempe liquores non nisi tantulum comprimi, ita ut ipsorum voluminis iramminatio sub obtutum non veniat. Præterea aqua, etiam

aere expurgata, sonum transmittit; ergo vi elastica pollet; ideoque comprimi potest.

Quæres 4. quæntam corpora dissolvendi vim habeat aqua, cum in vase accurate occluso vehementer calefit.

Resp. Eam in immensum crescere probat experimentum, ope cujusdam vasis tentatum, quod gallice vocitatur *le Digesteur de Papin*: quædam est olla, quæ densitatem 8. linearum undequaque habet, & cujus opertorium pariter spissum applicatur ope cochleæ & retinaculi (*d'une bride*) solidissimi & ferrei. Inter partes quæ sese jungunt interponuntur plurimi annuli chartæ madefactæ, ut vas accuratius claudatur. Ad dodrantem usque (*jusqu' aux trois quarts*) aqua impletur, in eaque includuntur ossa densissima & durissima.

Deinde hæc olla fornaci imponitur, eumque acquirit calorem, vi cujus ossa canescant, & ita emolliantur, ut levi digitorum attritu comminuantur, quasi in calcem redacta fuissent. Aqua refrigerens eandem habet firmitatem, eundemque saporem, ac jus e carnibus elixis concretum (*une gelée de viande*.)

Cum aqua in eo vase solido undique & accurate includatur, ignis qui eam sustollere non potest, ut exitum sibi eluctetur, majori copia sese agglomerat. Liquidum plurimo igne sætum vi maxima sese explicare connitens, quidquid cum eo includitur penetrat. Ossa ipsa vehementissimo calore dilatata, fiunt multo magis penetrabilia; in eorum igitur meatus aqua sese insinuat, ex iisque succos omnes extrahit, qui jungendis partibus inserviebant. Unde fit ut lamellæ ossæ, vel minimo conatu disjungantur.

Hujus machinæ subsidio facile esset, brevi tempore, & cum modica carbonis copia, 1. succos extrahere e substantiis tum animalibus, tum vegetabilibus; 2. eas quæ alimento sunt sine evaporatione coquere; 3. optimum gelu glaciatum (*de la bonne gelée*) conficere cum ossibus bo-

villis,

villis, quæ nullius sunt usus; 4. ligna durissima & ipsum ebur ita emollire, ut iis imprimi possent numismata (*des médailles*), &c.

Quæres 5. quandonam aqua in vapores resolvatur.

Resp. Cum aqua vasis aere eam ambiente calidior est, tunc ignis ex ipsa exiliens, secum partes aquæ sibi obvias abripit. Tennes illæ massulæ sic distractæ, sese efferunt aut explicant, tum propter impulsam sibi impressam, tum propter aeris suctionem, qui spongiæ vires gerit, sicque efficiunt fumum quem vaporem dicimus. Ille vero eo densior est ac opacior, quo frigidior est aer in quo recipitur, ad illumque densandum aptior. Sic hieme fumantem videmus aquam, e puteo recens eductam. Idem effectus per æstatem locum non habet. Quando enim major est atmosphæræ, quam putei calor, tunc ignis nedum ex aqua exeat, in eam contra delabitur. Licet vero ex ea vapor quidam evolaret, calor qui in aere viget, eum tenuiorem duntaxat efficeret, & oculis nostris inconspicuum.

Quæres 6. quantum amplificetur volumen aquæ in vapores resolutæ.

Resp. Adeo stupenda est hæc amplificatio, ut fidem superaret, nisi comperta esset experimento, summa cum diligentia & sagacitate tentato. In globum scilicet vitreum infusa est aqua gutta, cujus volumen se habuit ad volumen globi, sicut 1. ad 14000. rigni subjectus est globus, ut aqua in vapores converteretur. Tunc observatum fuit hanc guttulam calore dilatatam, quidquid aeris cum ipsa inclusum erat depulisse, ita ut sola totam globi capacitatem impleverit; ipsius igitur volumen spatium 14000. majus occupavit.

Quæres 7. quid valeant vapores, quando spatium non habent, in quod sese expandere possint?

Resp. Quanta sit vaporum vis, cum ipsis non suppetit locus, in quem libere exspatiantur, ma-

maxime patet ex machina D. Papin. Teste enim D. Musschenbroek, si in eo vase includatur aqua, & igni imponatur, ita potest incallescere, ut in ea liquefiant plumbum & stannum; quod se expertum fuisse asserit. Ipsa, inquit, aqua forte inflammaretur, si vasa haberemus satis valida ut in iis contineri posset. Illud inde oritur, quod vapores in partem vasis superiorem incumbentes, aquam sua vi elastica vehementer comprimant. Unde fit, ut plurimis quasi atmosphæris deorsum urgeatur, ideoque impediatur ne ignis sursum sese attollat. Quamobrem in hujusmodi aqua colligitur & coacervatur tanta ignis copia, ut stannum & plumbum liquefacere valeat.

Ex eo quod vapores mirum in modum sese dilatent, quorundam effectuum, qui aliter essent inexplicabiles, causa deduci potest: ex. gr. quando tormenta bellica, post multas emissiones (*après plusieurs coups tirés*) refrigerantur, sæpe accidit ut instrumentum gallice dictum *l'écouvillon*, quod in tormenti capacitatem ad eam madefaciendam intromittitur, subito fortiterque repellatur. Ratio est quia metallum calefactum, in vapores convertit aquam intra ipsum delatam. Ubi vero instrumentum refrigeratorium accuratius tormenti capacitatem implet, tunc vapor undequaque sese dilatare enitens, illud statim resilire vi maxima compellit.

Quando coquus in oleum calidissimum injicit aut pisces, aut legumina quædam humida, statim audiuntur crepitus, & oleum ebulliens in eorum, qui propius accedunt, manus & faciem insilit. Hæc phænomena inde oriuntur, quod materiæ pingues multo plus caloris concipiant, quam fere possit aqua. Cum igitur aquæ partes oleum subeunt, in vapores illico resolvuntur, qui vi subita sese dilantes, oleum ipsis involutum circumquaque dissipant. Cum autem vehementer illa explosio fiat inter fundum sartaginis (*de la poêle*) & aerem ipsi incumbentem, utrumque ea violenter percutitur, ideoque crepitat.

Hinc

Hinc existimant Physici non pauci, stupendam pulveris pyrit. vim minus ab aere quem continet, esse repetendam, quam ex propria ipsius materiz vaporibus. Quando enim igne incenditur pulveris illius acervus, statim & sulphur, & salsipetræ in vapores abeunt. Li vero dum sese dilatare vi maxima nituntur, quidquid sibi obstitit, quaquaversum disjiciunt & dissipant.

Quæres 8. utrum quædam sit aqua purissima,

Resp. cum aqua variis sese oneret corpusculis quæ suo in cursu offendit, eam numquam esse purissimam. Variis autem modis detegi potest, quodnam alienæ materiz genus sibi permixtum habeant aquæ nonnullæ, quarum dotes cognoscere interest. Si, v. gr. in aquam affundas gallarum dilutum (*infusion de noix de galles*), & colorem rufum, fuscum aut violaceum induat, hinc colligere est eam ferri aut vitrioli particulis prægnare. Hoc artificio exploratur utrum aquæ metallicæ (*minérales*) sint ferrugineæ. Quando, post injectum in aquam oleum tartari, eam deprehendes lacteam aut subcæruleam fieri, inde conjicies hujusmodi aquam salinis aut terrenis corpusculis abundare. Di. enim Nollez paululum olei tartari aquæ immiscuit, in qua dissolutus fuerat sal marinus, & statim lactea evasit. Hæc aqua vocitari solet *cruda* (*eau crue*). Hoc vitio laborare aquam cognoscitur, cum dissolvendo saponi, vel coquendis leguminibus parum est idonea.

Quæres 9. quænam ex omnibus aquis sit purissima.

Resp. aquam esse pluvialem: cum enim naturæ veluti manibus stillata fuerit, nihil fere alieni continere potest, nisi quod atmosphæram trahendo sibi adscivit. Cum vero corpuscula quæ in aere fluitant, sint maxime volatilia, ex aqua sese facile expediunt, ubi in vase clauso non continetur; non parum igitur utiles sunt cisternæ in quibus colligitur & servatur aqua pluvialis.

Plurimis vulgo sordibus inficiuntur aquæ stagnan-

gnantes. Ipsarum enim fundus plerumque est solum pingue & bituminosum. Præterea serpentes bestię (*les reptiles*) insecta & varię plantę, quę ibi nascuntur, intereunt & putrescunt, plurimum falis volatilis continent, qui aquis commiscetur, unde multum vitii contrahunt. Idcirco maxime curandum est, ut mundi sint lacus (*les mares*) adaquandis pecoribus destinati; exellendum quidquid plantarum in eorum marginibus nascitur, prohibendum ne in iis immergatur cannabis aut linum. Alioqui periculum erit ne pecora gravibus morbis afficiantur.

Puriore sunt aquę fluviales, quia perpetuis agitantur motibus, unde fit ut dividantur & atterantur corpuscula iis admista. Minus autem sincerę sunt aquę puteales. Cum enim iisdem corporibus incumbant diutius, horum particulas majori copia dissolvunt sibi quoque adiungunt.

Quæres 10. quomodo purgari possit aqua quam in potum adhibemus.

Resp. Id duplici modo fieri potest; alter magis est usitatus, nimirum percolatio (*la filtration*); alter autem efficacior, nempe stillatio (*la distillation*).

Aquę percolator 1. in fontibus ubi plurimum arenę congeritur. Dum enim aqua sinuosos inter arenarum anfractus sibi viam molitur, crassiores quibus sociata erat partes deponit; 2. si ponatur in quibusdam lapidibus teneris & molliculis. Eorum quippe meatus (*pores*) subeundo & trajiciendo, ab alienis corpusculis sese eximit. Efficacior est stillatio; sed tamen per eam non semper obtinetur aqua purissima. Si enim extraneę quas continet substantię, vaporationi non minus accommodatę sint, quam ipsa, cum ea simul avolabunt in capitellum cucumellę stillatorię (*dans le chapiteau de l'alambic*); sicque quęvis stillata, non magis puraverit quam antea.

## ARTICULUS II.

*De Æstu maritimo.*

**Æ**stus maritimus in duplici motu situs est : per alterum maris Oceani aquæ versus littora ab æquatore diffusa fluunt, eaque latissime occupant ; per alterum vero ex iisdem littoribus refluent, eaque sicca deferunt. Horum motuum primus dicitur *fluxus* vel exundatio ; secundus autem vocitatur *refluxus*. Appellatur etiam *æstus reciprocus*, quia maris aquæ alternis vicibus ad littora accedunt ibique intumescunt, & ab iis recedunt detumescentes. Ex maritimi æstus phœnomenis, alia sunt diurna, alia menstrua, alia tandem annua.

Phœnomena diurna in eo consistunt, quod aquæ maris unoquoque die per sex horas accedant ad littora, ibique turgescant, deinde per 12. circiter minuta maneant suspensæ ; quo tempore elapso, incipiunt per sex horas refluxere. Postquam omnino defluxerunt, antequam iterum affluant, stant adhuc quasi pensiles per 12. minuta ; ita ut duas inter ejusdem diei exundationes, alteram scilicet matutinam, alteram vero ferotinam intercedant 12. horæ cum 25. circiter minutis ; & duas inter exundationes matutinas numerentur 24. horæ, cum 50. fere minutis. Quamobrem si hodie hora sexta matutina aquæ ad portum Depensem allabi incipiant, crastina die ad eum non revertentur, nisi hora sexta matutina cum 50. circiter minutis.

Phœnomena menstrua ita se habent ; æstus maritimi versus novi & plenilunia majores sunt, quam versus quadraturas ; ita ut eo majores sint, quo magis ad novi & plenilunia accedunt, minores autem, quo sunt ab iis remotiores.

Phœnomena annua in eo sita sunt, quod maris exundationes sint majores versus æquinoctiorum, quam versus aliarum tempestatum novi & plenilunia.

Cum

Cum æstus maritimus motum lunæ religioſe ſequatur, & cum eo ſit colligatus, inde concludunt ſere omnes Phyſici recentiores, illum a luna præſertim pendere. Verum qua ratione luna, vel etiam ſol æſtum maritimum procreet, & moveretur definire, hoc opus, hic labor eſt. Phœnomenum illud Cartefiani a preſſione lunæ, Newtoniani a lunæ & ſolis attractione repetunt.

### SENTENTIA CARTESIANORUM.

1. Ideo luna lineam curvam deſcribit circa terram, quia transfertur vortice materiæ æthereæ, ſive cæleſtis, quo terra cingitur. Ubi autem per meridianum noſtrum tranſit, materiæ cæleſtis rivuli, qui in partem lunæ inferiorem impingunt, cum celerius ipſa moveantur, partim ſupra, partim infra lunam fluere coguntur, materiæ igitur æthereæ lunam inter & terram interfluentis alveus coarctatur: id fieri non poteſt, quin materia illa magis preſſa, viciffim aquas ſibi ſubjectas comprimat; idcirco excavari debent aquæ, & verſus littora, ubi minor eſt preſſio, afluere, & ceſſante preſſione refluere.

2. Cum luna quotidie in meridiano noſtro bis verſetur, nempe ſemel in parte ſuperiori, & ſemel in parte inferiori, ſingulis diebus bis contingere debet æſtus maritimus.

3. Ideo autem ſimul & apud nos, & apud antipodas noſtros accidit æſtus maritimus, quia duplex eodem tempore fit preſſio, altera ſcilicet in loco cui luna immediate incumbit, altera vero in loco directe oppoſito. Cum enim terra in ſuis vorticis centro poſita ſit in æquilibrio, preſſioni lunæ cedat neceſſe eſt, ac depri-matur verſus partem e diametro oppoſitam; ex-gr. ſi luna premat in topico cancri; terra premi debet verſus tropicum capricorni, ac proinde materiæ cæleſtis huic topico reſpondentis alveus coarctabitur; aquas igitur ſubjectas comprimet, quæ idcirco verſus littora impellentur, ibi.



ibique intumescunt; eodem ergo tempore, & apud nos & apud antipodes nostros continget æstus maritimus.

4. Æstus singulis diebus tardius 50. circiter minutis recurrit, quia luna quovis die ad meridianum nostrum non redit, nisi 50. circiter minutis tardius quam pridie.

5. Tandem varia æstus maritimi discrimina ex eo nascuntur, quod materiæ cælestis alveus, pro vario lunæ situ, modo magis, modo minus coarctetur. Idcirco nunc majores, nunc minores esse debent maris exundationes.

Quæres quid de opinione Cartesiana sentiant Physici.

Resp. Varias ob causas eam rejiciunt, ex quibus paucas seligemus.

1. Pensilem vorticum structuram, qualem excogitavit Cartesius, ingeniosam quidem, sed falsum esse figmentum ex antea dictis satis patet.

2. Quis concipiat alveum materiæ cælestis a luna satis coarctari, ut inde nascatur æstus maritimus? Spatium enim lunam inter & terram interjectum, ac proinde materiæ æthereæ alveus, est plus quam 80000. leucarum. Cum autem lunæ in aqua actio ad proportionem decreascit, quæ crescit distantia, sequitur minimam esse eam actionem.

3. Lunam lentius moveri quam materiæ æthereæ rivulos supponit, non probat Cartesius. Suam enim opinionem præsertim firmare studet comparatione quam instituit cum navicula, quæ secundo amne delata, aqua lentius progreditur: in ea vero comparatione nihil est solidi. Causa enim propter quam cymba tardius aqua transferatur, in planeta locum non habet. Ideo quippe navicula lentius aqua promovetur, quia par ipsius quæ extra aquam posita est, in aere obvio & resistente aliquid obstaculi offendit. Nihil autem simile reperias in planeta, qui totus in materia cælesti immergitur; in ipso igitur nihil.

nihil est, quod motum inhibeat a fluido, quo involvitur, acceptum.

### SENTENTIA NEWTONIANORUM.

Newtoniani æsum maris reciprocum repetendum existimant a lunæ solisque attractione; sed ita ut luna, utpote terræ vicinior, præcipua sit illius causa. Quo posito, feliciter explicari putant æstus maritimi phænomena, tum diurna, tum menstrua, tum annua.

1. Quidem diurna, cur nempe singulis diebus aquæ maris bis intumescant & detumescant: luna, inquit, aquas maritimas plus minusve directe attrahit pro diverso earum situ, plus minusve efficaciter, pro majori vel minori illarum distantia. Dum aquas positas in quadraturis, sive 90. gradibus ab ipsa remotas, oblique attrahit, illarum versus terram gravitatem auget, minuit vero aquarum gravitatem, quæ ipsi directe respondent. Ad servandum igitur inter maris partes æquilibrium, necesse est aquas lunæ subiectas attolli, ut aquas laterales, in quadraturis positas, sua altitudine tantum superent, quantum ab illis gravitate vincuntur. Aquæ vero eandem ob causam efferentur in parte hæmisphærii oppositi respondente. Illæ enim aquæ a luna minus attrahentur, quam terræ centrum, propter majorem suam distantiam. Eadem igitur proportionè vi terræ attrahenti subducuntur, in eamque minus gravitant. Idcirco necesse est ut attollantur aquarum lateralium præssione, quarum gravitas augetur. Duplex idcirco fit aquæ veluti promontorium, alterum ex parte lunæ, alterum ex parte hæmisphærii oppositi respondente. Jam ergo intelligitur qua ratione fluxus simul apud nos & antipodas nostros eveniat, bisque debeat quotidie contingere cum luna singulis diebus per meridianum nostrum bis transeat.

Refluxum autem sic explicant: cum terra quotidie circa suum axem revolvatur, aquæ

Ocea-

Oceani, quæ prius lunæ directè subiacebant, post sex horas a luna distant 90. gradibus, sicque respectu planetæ versantur in quadraturis: Tunc ergo nonnisi oblique a luna attrahuntur, ac proinde augetur eorum gravitas: ergo deprimi debent. Inde oritur reflexus, qui quotidie bis contingit, quia diebus singulis eadem aquæ respectu lunæ in quadraturis bis reperiuntur.

Supponamus, inquit Newtonianæ opinionis defensores, lunam in puncto  $L$  (fig. 102.) centrum terræ in  $T$ , & aquas marinas terram circumcingentes, & ultra globum terrestrem ad eam altitudinem sese attollentes, quæ exhibetur per circulum  $CF$ ,  $OF$ . Quibus positis, aquarum portio  $C$  erit in conjunctione, pars  $O$  in oppositione, & partes  $F$ ,  $F$  in quadraturis respectu lunæ  $L$ . Manifestum autem est, inquit, a luna potentius attrahi aquas in  $C$  positas, quam centrum  $T$  globi, & centrum illud magis, quam aquas in  $O$  constitutas.

Non minus apertum est lunæ attractionem iuxta directionem perpendicularem exerceri in puncta  $C$ ,  $T$ ,  $O$ , dum in partes  $F$ ,  $F$  non agit nisi oblique. Hæc autem actio perpendicularis lunæ in puncto  $L$  versantis, eo tota spectat, ut aquas attollat in  $C$ , earumque versus  $T$  gravitatem imminuat. Pariter actio perpendicularis lunæ in centrum  $T$ , totam vim suam adhibet, ut illud attrahat. Unde fit, ut centrum illud minus premat aquas in  $O$  sitas, quæ idcirco sunt leviores.

Longe autem aliter se habet actio, qua luna aquas in  $F$ ,  $F$  jacentes oblique attrahit. Hæc enim in duas resolvitur, (se décompose) quarum alia perpendicularis juxta directiones  $AF$ ,  $BF$ , qua maris aquæ in  $F$ , & in  $G$  posita, non minus versus lunam attrahuntur, quam centrum  $T$ , alia est horizontalis juxta lineas  $FT$ ,  $FT$ , quæ eadem aquæ versus terræ centrum  $T$  premuntur, ideoque sese ferunt versus puncta  $C$  &  $O$ , ubi minor est resistentia. Ergo maris aquæ supra libellam suam (au dessus de leur

*leur niveau*) sese attollent in punctis C & O, sive in hemisphærio tum superiori, tum inferiori; ergo intumescunt non solum quando in conjunctione; sed etiam ubi sunt in oppositione cum luna.

His constitutis, inquiunt, facile exponitur cur maris aquæ intra 24. horas bis intumescant & detumescant. Terra scilicet circa suum axem volvitur, eamque conversionem intra 24. horas absolvit; aquæ igitur marinæ quas in puncto C supposuimus, unoquoque die semel in conjunctione, semel & in oppositione sunt cum luna; ergo singulis diebus bis attolluntur. Idem contingit aquis in puncto O positis.

Propter eandem terræ circa suum axem conversionem, aquæ in punctis C & O constitutæ, singulis diebus in quadraturis cum luna reperiuntur; bis igitur quotidie detumescunt; in hemisphærio proinde tum superiori, tum inferiori, aquæ bis attolluntur & deprimuntur intra 24. horas.

2. Sic explicant phænomena menstrua, cur scilicet in novi & pleniluniis exundationes sint majores, quam ubi luna versatur in quadraturis, sive a sole distat 90. gradibus. In novi & pleniluniis, inquiunt, lunæ & solis vires in attollendis aquis amice conspirant, easdem enim aquas juxta eandem lineam attrahunt; in quadraturis vero solis & lunæ vires sibi mutuo sunt oppositæ. Quas enim sol attollit aquas, easdem luna deprimere nititur; in eas quippe agit per lineam obliquam; ejus proinde actio in duas distribuitur, quarum altera est horizontalis, altera vero perpendicularis, quæ versus terræ centrum dirigitur.

3. Sic exponunt phænomena annua, cur scilicet maris exundationes sint majores in novi & pleniluniis æquinoctiorum, quam in aliis; ratio est, quod tunc luna æquatori terrestri respondeat. Porro æquator terrestris supra ceteras superficiesi terræ partes eminet; in eo igitur aquæ sunt levio-

viores, quam in aliis terræ locis; tum quia a terræ centro magis distant; tum quia majorem habent vim centrifugam, ex terræ circa suum axem conversione oriundam. Porro quo leviores sunt aquæ, eo minus lunæ attrahenti resistunt, eoque altius evehuntur.

Quæres quid de opinione ista sentiant multi Physici.

Resp. Eam rejiciunt non pauci; tum quia ipsis displicet *attractio* quam occultas Peripateticorum qualitates redolere existimant; tum quia difficultatibus obnoxia est, ex quibus feliciter sese non expediunt Newtoniani. Istam, v. gr. proponit auctor libri jocularis cui titulus, *Amusemens physiques sur le système Newtonien*.

Calculons, puisqu'on nous rappelle si souvent au calcul. Distance des mers à la terre, 0; distance de mers à la lune, environ 100000. lieues; donc l'attraction des mers par la lune, nulle en comparaison de l'attraction des mers par la terre; donc l'attraction des mers par la lune ne doit produire aucun effet sensible.

Ce raisonnement n'est pas juste, disent les Newtoniens; c'est du centre de la terre jusqu'aux eaux de la mer, qu'il faut mesurer cette distance; or cette distance du centre de la terre jusqu'aux eaux de la mer, bien loin d'être nulle, peut fort bien être de 1400. à 1500. lieues environ.

Mais si l'on parle conséquemment dans ce système, ce n'est point le centre seul de la terre, qui doit attirer les eaux, mais toute la masse de la terre qui les attire au centre en les attirant vers elle-même. Autrement il ne faudroit plus dire, que l'attraction est en raison directe des masses, puisqu'un centre n'offre point de masse, plus ou moins grande; de sorte qu'il n'attire véritablement avec plus ou moins de force, que parce qu'il est environné de masses plus ou moins fortes, qui attirent toutes à elles-mêmes & vers ce centre; à moins que ces parties environnantes, réunies au centre, ne lui fassent présent de toute

se la vertu qu'elles auroient d'attirer, si elles en étoient séparées; nouveaux égards de toutes ces portions de matière pour le centre commun, qui surpasseroient bien tout ce qu'on a jamais pu dire des qualités occultes de nos anciens.

Quisquis opiniones ad explicandam maritimi æstus causam excogitatas, diligenter perpenderit, cum Lucano dicet:

*Querite quos agitat mundi labor; at mihi  
semper*

*Tu quæcumque moves tam crebros, causa,  
meatus,*

*Ut superi voluere late.*

Quæcumque sit causa, quæ alternas fluxus & refluxus vices operetur, quid utilitatis ex iis deriveretur, paucis exponendum est. 1. Ad illud inservit æstus maritimus, ut fluviorum aquas repellat, easque longe retroagat. Unde fit ut propter aquas in sese redeuntés, fluviorum alveus profundior sit, parqûe invehendis intra ipsas urbes mercibus, quarum immensæ moles, sine illo subsidio, vix ac ne vix quidem transferri possent.

2. Perpetuo illo aquarum libramine cautum voluit Deus, ne aquæ desidendo & stagnando corrumperentur. Cûram hanc ventorum inconstantiæ commissam noluit. Non semper enim venti aquas perflant & commovent; sed aliquando omnis eorum flatus diu residit. Unde periculum esset, ne putresceret maris alveus, in quem, tanquam in commune receptaculum, confluant omnia terræ purgamenta. Quamobrem incertis, & sæpe interruptis ventorum spiramentis, Deus æstum maris reciproci adjunxit, sive quotidianos aquarum itus & reditus, ne fieret in mari sordium congeries periculosa. Nèdum autem illa terræ purgamenta, quæ in mare fluvii deferunt, in eo congerantur, & putredinem inferant, alternus ascendentis & descendens aquæ motus, ea huc illuc dispergit,

ex-

extenuat, versus maris superficiem adducit, unde per evaporationem in auras sublata, in rores, pluvias, flores, fructus & alimenta convertuntur.

## ARTICULUS III.

*De Maris Salsedine.*

**Q**UÆRES I. Quænam sit marinæ salsedinis causa.

Resp. Plerique Physici existimant maris salsedinem oriri ex fodinis & rupibus salium, in maris alveo depositis, eosque sales ita dissolvi, ut variis tempestatibus, & motu maris reciproco, per totam illius immensitatem pene æqualiter diffundantur. Terra, inquiunt, mari cooperata, ejusdem est materiæ, ac ea quæ aquis non tegitur, ut patet ex insulis quæ non ita pridem e mari emerferunt: atqui plurimæ salium fodine in diversis terræ siccæ locis reperiuntur; suas, v. g. habent Polonia, Prussia, India, &c. e quibus sal extrahitur marino persimile. Imo quædam insulæ nihil aliud pene sunt, quam sales congesti: sic tota fere insula *Ormuz*, nihil est præter durum & candidum salem, ex quo domus ipsæ conficiuntur; cur ergo similes fodinæ in maris alveo non existerent?

Nec illam opinionem evertunt, qui obijciunt, a perpendiculo nautico (*la Sonde*) nullo modo indicari hujusmodi fodinas: instrumentum enim illud non semper ad fundum usque maris pervenire potest; & licet eum attingeret, fieri potest ut salium rupes non minus duræ sint, quam alia corpora bene multa, quorum nullam decerpit particulam.

At, inquires, si maris salsedo suam originem a salium rupibus duceret, jamdudum aquæ maris suam exuissent salsuginem; rupes enim ex tot sæculis penitus dissolutæ fuissent.

Respondent iidem Physici, aquas marinas  
*Physica Tom. VI.* K *suam*

suam non amittere salsuginem, sive quia sal in terræ sinu recens generatur; sive quia varii sales hinc & inde supra terram, vel in ipsius quasi visceribus dispersi, in mare ab aquis redeuntibus advehuntur. Præterea dum vapores e mari continuo in sublime efferuntur, in eo remanent salis particulae quæ, utpote graviore, in mare recidunt.

Quarés 2. quibusdam causis tribuenda sint varia marina salsuginis discrimina. Constat enim aquas maris eo minus salsas deprehendi, quo magis ad polos acceditur; ita ut sub æquatore & zona torrida longe vegetiorem salis referant saporem.

Resp. Plurima esse illius discriminis causas. 1. Cum multo vehementior sit calor solis in zona torrida, majorem suscitatur vaporum copiam, quam in plagis septentrionalibus: vapores autem illi nihil aliud sunt, quam aqua dulcis; salis enim particulae, utpote graviore, non ita facile in vapores adeunt; aqua igitur quæ in Oceano superest, salsior esse debet sub æquatore, quam versus polos, ubi minor aquæ copia in vapores solvitur, quia ibi debilior est solis calor.

2. Non mediocre salsedinis discrimen afferunt calor & frigiditas aquæ. Eadem enim aqua, eadem alimenta salsa majorem salsuginis sensum excitant, quando calida sunt, quam ubi frigida. Calor quippe, vel ignis corpuscula, salis particulas exagitant, acuunt, aliasque ab aliis disjungunt, ita ut linguam vividius afficiant & vellicent, quod quisque facile experiri potest. Cum igitur aqua maris calidior sit sub æquatore, quam versus polos, etiam si in omnibus Oceani partibus eadem supponeretur salium quantitas, salsiores percipi debent sub æquatore, quam versus polos.

3. His accedit major vel minor salis copia, qui in mari alveo residet: quemadmodum enim in terræ penetralibus ubique non reperiuntur sa-



lis fodinæ, & ubi existunt, non æqualem continent salis quantitatem; idem licet de Oceano conjicere, cujus partes quædam salibus magis abundant, quam aliæ. Idcirco quibus in locis uberior occurrit salium copia, ibi aquæ saliores sint necesse est. Eam ob causam prope insulam *Ormus* dictam, quæ nihil aliud est, quam salium congeries, aqua maris summopere salsa deprehenditur.

4. Salsedinis varietas a pluviz & nivis raritate aut frequentia plurimum pendet. Utraque in plagis septentrionalibus est frequens; in zona vero torrida per quasdam anni tempestates non pluit, aliis autem temporibus continuus est imber. Oceanus igitur in ista zona mensibus pluviosis minus habet salsedinis, quam temporibus siccis. Quin etiam in littore Malabarico (*la Côte de Malabar*) temporibus pluviosis, Oceani aqua pene dulcis percipitur, propter ingentem aquæ copiam, quæ ex montium jugis delabatur. Quam ob causam eadem Oceani partes, variis anni temporibus, diversos suscipiunt salsedinis gradus: cum autem in locis borealibus per totum fere annum decendant pluviz & nives, ibi minus salsum est mare, quam versus zonam torridam.

5. Salsuginis discrimen inde etiam repetendum est, quod aqua calida plus salium dissolvat, quam frigida. Quapropter etiam in Oceano eadem esset salis quantitas tum prope polos, tum versus æquatorem, aquæ sub zona torrida, utpote magis calefactæ, majorem salium copiam exsolvent, quam versus polos ubi magis frigescunt.

Quæres 3. Cur in fundo maris reperiantur aquæ dulces.

Resp. Eas ortum habere a fluviis quibusdam in mari scaturientibus, & quidem tanta vi, ut suas aquas nec facile nec subito permisceant; quod sane non repugnat. Experientia enim compertum est, ubi flumen aliquod in aliud magno cum impetu influit, ipsorum aquas per

aliquod tempus fluere inconfusas. Ingens fluvius dictus *Rio de la Plata*, qui in Oceanum se exonerat, illius aquam sic temperat, ut aquæ marinæ ultra 15. leucas a littore dulces videantur.

Quæres 4. An repertum fuit quoddam artificium, quo maris aqua distillata fiat dulcis, omnemque suam falsedinem exuat.

Resp. A Chymicis, vel peritissimis, nullum hætenus inventum esse distillandi modum, cujus ope ex unda marina extraheretur aqua dulcis, quod tamen navigationi summæ esset utilitatis. Quamvis enim post distillationem, in immo vase sal remaneat, aqua nihilominus suæ falsedinis partem aliquam contumaciter retinet; cujus rei causam hanc afferunt illustriores Chymici: duplex, inquiunt, est salis genus in aqua marina, sicut & in aliis corporibus, aliud scilicet fixum, aliud volatile, quod spiritus salis etiam dicitur. Sal fixum ob suam gravitatem, in vapores per distillationem non solvitur, sed in fundo vasis subsidit. Sal autem volatile igne modico facile vaporatur, cum aqua simul ascendit, cui sese admiscet & implicat. Sal illud volatile, id est, spiritum salis ab aqua sejungere, hoc opus, hic labor est. Id assequi variis modis sed nequicquam, hætenus tentarunt Chymici vel peritissimi.

Quæres 5. Cur aqua pluvialis quæ vaporibus e mari solis calore sublatis constat, sit dulcis, dum aqua maris arte distillata, suam omnem falsuginem non deponit.

Resp. multiplicem esse illius discriminis causam. Prima est vaporatio lenta & placida, per quam ex Oceano non attollitur nisi pars subtilissima, quæ spatium quidem salis etiam continet, sed longe minus, quam ubi vaporatio igne vehementi excitatur. Secunda causa est longum iter quod vapor ille conficit, prius quam ad regionem ætheream perveniat; quo in spatio decurrendo, fieri potest ut spiritus salinus sensim a par-

particulis aqueis sese expediat; tertia est permixtio cum aliis aquæ dulcis particulis quæ in ære fluctuant; quarta denique est vaporis refrigeratio & densatio: ex Oceano quippe sese efferentes, vapores illi magis ac magis gradatim frigescent, cum aliis quos offendunt sese permixcent, densantur in nubesque concrepescunt. Dum vero refrigerantur & densantur, spiritus salini cum particulis avolant in altissimamque aeris regionem affurgunt.

At, inquires, cur idem non accidit, quando distillatur aqua marina? Vapores enim dum sese attollunt frigidiores evadunt & densiores. In promptu est responsum. 1. Brevius est spatium quod decurrunt vapores, quam ut spiritus salis possit a particulis aquosis sese expedire. 2. Vapor in vase retinetur, quod nullum spiritui salino exitum permittit. Ita D. Brisson, (*Dict. de Phys.* tom. 2. pag. 549. & *suiv.*)

### SCHOLIUM.

Nonnulli Physici quibus displicet opinio quam exposuimus de maris salitudine, putant non minus ridicule inquiri unde oriatur maris salitudo, quam unde nascentur lux & calor solis. Scilicet, inquiunt, ut soli lucem & calorem, sic aquis marinis salitudinem indidit, ab ipso rerum exordio, Deus summe sapiens & providus; tum ut nutriendis piscibus aptæ forent; tum ne putrescerent aquæ maris stagnantes; tum ut nimia non esset aquarum marinarum evaporatio, sicque rariores essent fluminum exundationes, quibus devastantur agri fertiles; tum ut aquæ salibus permixtæ & inde graviiores factæ, ferendis navibus forent magis idoneæ; tum propter alias causas quæ nos latent.

## ARTICULUS IV.

*De Fontium & Fluminum origine.*

**I**N eo Physici consentiunt unanimes, quod fontes & flumina suam a mari ducant originem; nisi enim res ita esset, cum fluvii omnes, ac proinde rivuli, in maris alveum confluant, brevi mare redundaret, in totamque terræ superficiem sese effunderet. Necessse est igitur mare fontibus eas sufficere aquas, quæ in ipsum redeunt, & istas quodam veluti circuitu ita perpetuo fluere, ut maris alveum in quem referuntur ultra modum non impleant.

Quanam autem via aquæ maris ad fluminum & fontium originem adducuntur? an per cæcos terræ canaliculos; an per aera, dum scilicet in vapores sursum sublata, in nubes coalescant, atque in pruina, nivem, grandinem, & pluviam convertuntur? Qua de re tres in opiniones scinduntur Physici.

Prima est Cartesii, qui docet aquas marinas in totam terræ molem diffundi, ita ut per occultos canales ad montium radices perveniant, ubi ingentes cavernas nactæ, vi caloris subterranei in vapores attolluntur; ii vero in illarum specuum fornacem, tanquam in alembici cujusdam capitellum, cœuntes per ejusdem latera defluunt, & qua parte versus terræ superficiem exitum reperiunt, tandem in auras prodeunt, & fontes efficiunt.

Secunda sententia eorum est qui putant aquas maris per cæcos terræ meatus, & angustissimos arenarum canaliculos, quasi per totidem tubos capillares, percolari; ita ut, dum iter sibi eliciantur, & paulatim ad montium radices adrepunt, per sinuosos illos anfractus suam omnem falsedinem exuant.

Tertia, generatiorque sententia fontium originem repetit ex pluviis, nivibus, &c., quarum

rum guttulæ terram subeuntes, in receptaculis a natura præparatis colliguntur. Ex iis deinde per quasdam rimulas stillatim effluentes, & per montis declivia delabentes, versus montis radicem scaturiunt, & fontibus dant originem.

## PROPOSITIO I.

*Fontes immediate non oriuntur ab aquis marinis, siue calore subterraneo distillatis, ut voluit Cartesiani; siue per sinuosos terre & arenarum flexus percolatis, ut placet aliis.*

Prob. prima. **Q**uia fictitii sunt illi canales subterranei, per quos maris aquæ ad alembicos in montibus dispositos advehuntur. Quotquot enim sub terra reperiuntur canales, ii aquam ad mare deferbant, non vero a mari ad montes deducebant.

2. Mera etiam signa sunt illi alembici, quorum ne ullum quidem vestigium in montibus unquam detectum fuit, e quibus fontes scaturiunt.

3. Gratis supponitur subter illis alembicis, tanquam ex condito, paratos esse ignes, quorum calore aquæ in vapores sursum efferantur; imo falsum est igni subterraneo eam inesse vim, quæ aquas in vapores convertere valeat.

4. Etiam si hæc omnia ad arbitrium Cartesii essent disposita, manifeste patet fore ut illæ montium cavernæ immensa salium tot a sæculis depositorum mole complerentur, & proinde fontes omnes & fluvii ab ipsis oriundi, jamdudum penitus exaruiscent.

5. Experientia compertum est, pluviis jamdudum desinentibus, siue per æstatem, siue per hiemem, plerosque fontes exarescere: atqui in hypothesi Cartesiana id nunquam contingeret, ut eleganter sic demonstrat scriptor gallicus. *Qu'importe à l'eau souterraine qu'il pleuve ou non, pour s'élever en vapeurs? son operation*

en est indépendante. L'eau est dans l'alambic, le couvercle est mis, le fourneau est allumé à l'ordinaire. Pourquoi la distillation ne se fait-elle plus ? Si ces distillations étoient la cause des fontaines, comme cette cause seroit toujours subsistante, l'effet n'en manqueroit jamais ; la sécheresse du dehors n'y pourroit rien déranger, ce qui est bien contraire à l'expérience. (Spekt. de la Nature, tom. 3. pag. 109.) Ergo 1. fontes immediate non oriuntur ab aquis marinis calore subterraneo distillatis, ut fingit Cartesius.

Prob. secunda pars. Nempe fontes immediate non oriuntur ab aquis marinis, per varios terræ & arenarum anfractus percolatis. 1. quia aqua marina, quantumvis per arenas trajecta, nunquam suam omnem salcedinem exuunt, ut testatur experientia.

2. Si aqua illa per angustos terræ & arenarum anfractus transiunda, ibi suos penitus sales deponerent, ipsa sibi viam omnem præcluderent, ut aquis fontanis contingit, quæ ita sibi aditus obstruunt intra quoddam temporis spatium, ut novos canales substituere necesse sit.

3. Fundus maris ubique quodam glutine & visco tenaci obducitur: atqui illud obstat, ne maris aquæ cecos terræ meatus subeant. In ipsum enim dejicias lignum, funem, vas, & quidquid tibi libuerit; elapsis aliquot mensibus, quod projectum fuerit ex undis extrahe; illud deprehendes quadam pellicula vel glutine obvolutum, quod sensim densatur: atqui prohibet hujusmodi glutinum, ne aquæ subter terram irrepant.

4. Si mari vis inesset suum permeandi fundum, & terras trajiciendi, ut sese ad loca remotissima conferret, utque deinde ad fontium receptacula in altis montibus posita sese attolleret, nonne etiam regiones quas perlustrat inundaret? numquid enim majus obstaculum ipsi opponerent, quam terræ strata (couches de terre) quæ penetrare cogeretur in montium radicibus, ut ad eam receptaculorum altitudinem sese

cf.

effleret, quo ipsum transferri volunt adversarii ?  
ergo 2. fontes non oriuntur ab aquis marinis  
per angustos terræ meatus percolatis ; aliunde  
nec ab iisdem calore subterraneo distillatis ; ergo  
fontes suam ab aquis marinis originem immediate  
non ducunt.

*Salvantur objecta.*

Objic. 1. Repertæ sunt aquæ dulces in mon-  
tium fornicibus, instar lacrymarum peniles ; de-  
prehensi etiam sunt rivuli, qui illas cavernas  
præterfluebant ; denique detectæ sunt concretiones  
lapideæ fornicibus adhærentes ; ergo merito sup-  
poni potest aquas in montium cavernis in vapo-  
res ab ignibus subterraneis attolli.

Resp. Neg. conseq. Ista enim omnia ortum  
habent ab aquis pluvialibus, quæ scilicet terram  
subeunt, & per fornicum rimas guttatim stillant :  
si aquæ ille sales & arenas secum non deferant,  
in imam cavernam decidunt, ibique præfatos  
rivulos efficiunt ; si vero salibus & arenulis per-  
misceantur, tunc montis fornici adhærent, &  
elapsu temporis indurescunt.

Responsum illud ex eo confirmatur, quod ri-  
vuli in cavernis desipientes, siccis temporibus  
exarescant, ut contingit in specubus subterraneis  
quæ turri speculatoriæ Parisiensi Regiæ subjacent :  
atqui id non accideret, si rivuli illi ab undis ma-  
ris suam originem immediate ducerent, defi-  
cientibus enim pluviis, non deficit mare.

Objic. 2. Prope mare reperiuntur fontes &  
putei aquæ dulcis ; ergo quidam saltem fontes a  
mari proxime oriuntur.

Resp. Neg. conseq. Illi enim fontes & putei  
post diuturnam siccitatem, vel sensim minuan-  
tur, vel potius inarescunt ; quod certe non eve-  
niret, si e mari immediate prodirent ; cessanti-  
bus enim pluviis, aquæ marinæ nunquam defi-  
nunt. Præterea illæ aquæ non possunt in terras

vicinas irrepere, quia viscus quo fundus maris obducitur, ipsi aditum in arenas & terras omnino præcludit. Deniquæ si aquæ marinæ tam breve terræ spatium trajiciendo dulces fierent, tunc facile esset suam ipsis auferre falsuginem, eas scilicet trans longos arenarum acervos percolando: atqui tamen contrarium testatur experientia; ergo, &c.

Objic. 3. Quidam sunt fontes & putei salii; quidam alii reciprocum maris æstum sequuntur; ita ut per *fluxum* intumescant, & per *refluxum* detumescant; ergo, &c.

Resp. Neg. conseq. 1. Re quidem vera quorundam fontium & puteorum aquæ percipiuntur salæ; sed eas a mari devenire nulla ratione probari potest. Ex. gr. aquæ Salinenses (*de Salins*) sicut & aliæ omnes puteorum & fontium salforum, nihil aliud sunt quam aquæ pluviales, quæ dum fodinas salis permeant, aut supra salium strata volvuntur, eorum particulas corrodunt, dissolvunt, & secum devehunt. Quod adeo verum est, ut longe altius nunc, quam olim, effodienda sit terra, ut aquæ salæ inveniantur; unde patet aquas illas a mari non provenire.

2. Ea eo quod fontes & putei quidam cum *fluxu* & *refluxu* maris intumescant & detumescant, minime sequitur ipsorum aquas a mari dimanare. Dum enim per fluentia subterranea fontes illi, aut potius putei, in mare sese exerant, affluentibus aquis marinis debent turgescere, quia scilicet ocurso maris versus originem suam repelluntur; aquæ sic epulsæ, in sese redeunt, agglomerantur, & intumescunt. Re-fluentibus autem aquis marinis, debent iidem putei deturgere, quia scilicet fluentia per quæ in mare influunt, tunc libero cursu in illud devolvuntur. Sic etiam cum ipso mari intumescere & detumescere solent flumina, quæ suas in mare aquas devehunt.



## PROPOSITIO II.

*Fontes a pluviis nivibusque solutis oriuntur.*

Probat. 1. **Q**uia aqua ex pluviis nivibusque solutis oriunda, plus quam satis est, aquas fluminibus subministrant. 1. Enim viri peritissimi iteratis observationibus compertum habuerunt, mediam aquae ex pluviis nivibusque prodeuntis altitudinem Parisiis esse 15, in Italia 40, in Zona torrida 60 vel etiam 80 pollicum. 2. Re ad calculum revocata, cognovit D. *Marione* aquas Sequanae Parisiis sub ponte regio intra annum defluentes, efficere aquae pedes cubicos 20512000000. Si vero per 15 pollices multiplicentur superficies agrorum, quos Sequana & rivuli in eam influentes ad Parisios usque alluunt, id est 60 leuca juxta longitudinem, & 40 juxta latitudinem, summa inde coalescens dabit 71415000000 pedum cubicorum: atqui posterior iste numerus aquae copiam exprimens, quae in terras Sequanae vicinas per annum decedit, sexies saltem major est, quam prior numerus aquam degignans, quae intra annum per alveum Sequanae defluit; ergo pluviales aquae longe sunt copiosiores, quam necesse sit ut aquae fluminibus subministrantur.

Prob. 2. Haec vera effectus causa habenda est, qua posita vel sublata, aucta vel imminuta, ponitur vel tollitur, augetur vel minuitur effectus: atqui pluviae fontibus & fluvii sic originem & incrementa praebent, ut quo uberius decedit imber, eo largior & altior sit fontium & fluminum alveus; & quo rariore sunt pluviae & nives, eo magis decrevant & detumescant fontes & flumina. Sic tempore hiemali, quo frequentius & copiosius pluit & nigit, fontes & fluvii saepius redundant; tempore autem aestivo, ob pluviarum penuriam, vel exarescunt, vel plurimum minuuntur; ergo, &c.

ut non magis *Soluntur objecta* quae in eis  
 in eisq; momentis his evolvit nunc.

**Objic. 1.** Juxta istam opinionem, pluviae se-  
 xies copiosiores sunt aqua per Sequanam alveum,  
 intra annum decurrente; si ergo certis in re-  
 gionibus sint flumina, quae Sequanam plus quam  
 sexies superent, pluviae quotannis decedentes,  
 iis fluminibus non sufficient: atqui plurima sunt  
 hujusmodi flumina, ut Niger in Africa, fluvius  
 Amazonidum in America, fluvius sancti Lau-  
 rentii in nova Francia; ergo, &c.

**Respon. Dist. maj.** Quantitas pluviae quotannis  
 decedentis, iis fluminibus non sufficiet, si cete-  
 ra sint paria, concedo, nego.

**Porro** si praedictis in regionibus, altitudo plu-  
 viae pro singulis annis esset, autaxat, ut in Gal-  
 lia, 15. vel 20. pollicum, & nisi praeterea sup-  
 peteret ingens nivium copia, quae solis calore in  
 aquam resoluta, pluviae defectum compensaret,  
 certe quibus quotannis decedentes, fluminibus  
 Sequana longe majoribus non sufficerent: at ve-  
 ro si pluviae quantitas in nonnullis Africae &  
 Americae regionibus sit 60. vel etiam 80. polli-  
 cum, siquidem accedat ingens nivium copia,  
 quae in aquas resoluta in praedictos fluvios devol-  
 vantur, nemo non videt tunc uberiores esse a-  
 quas, quam necesse sit, ut fluvii illi pleno sem-  
 per alveo decurrant: atqui res ita se habet. Ex-  
 perimentis enim constat in Zona torrida, quam  
 Niger & fluvius Amazonidum praeterfluunt,  
 pluviae altitudinem esse quotannis 60. aut 80. pol-  
 licum. Constat praeterea ex arduis Aethiopiae &  
 Persiae montibus, unde nascuntur illa flumina,  
 in ea confluere maximam nivium solutarum co-  
 piam. Quod pertinet ad flumen sancti Lauren-  
 tii, compertum est Novam Franciam, quam in-  
 terfluit, esse per menses plurimos altis coopertam  
 nivibus, quae dissoluta alimentum plus quam suf-  
 ficiens huic fluvio suppeditant.

**Objic. 2.** Ut fontes ab aquis pluvialibus o-  
 rian-

riantur, eas necesse est altius terræ penetralia pervadere: atqui pluvialis aqua terram non subit ultra unum duosve ad summum pedes, ut multis constat experimentis; ergo, &c.

Resp. Dist. min. Aqua pluvialis terram non subit ultra unum duosve pedes, quibudam in locis, conc. in omnibus, neg.

Nonnullæ quidem sunt terræ densiores, quæ aquis pluvialibus difficiliter aditum præbent; nec mirum est quod pluvia hujusmodi solam non pervadat ultra unum alterumve pedem: sed aliæ sunt terræ arenosæ, variis meatibus perviæ, quæ pluvias statim admittunt, suisque visceribus absorbent. Deinde certum est humum, quando est arida, innumeris rimis dehiscere, & quidem profundioribus, per quas pluviae in terræ sinum penetrant. Porro per istos aliosque veluti canales aquæ in intimam tellurem illabuntur, perguntque semper altius descendere, donec ad strata argillacea perveniant, quibus retinentur, donec tandem scaturiant, qua liber patet exitus.

Rem aperte declarat experientia: certum est enim ex imbribus fontes crescere, turbulentos fieri, postque pluvias aliquandiu fluere copiosius: atqui res non ita contingeret, nisi aquæ pluviales per varios terræ meatus illapsæ, ad ea usque receptacula descenderent, quæ fontibus aquas subministrant.

Montes præsertim ita sunt ab Auctore naturæ comparati, ut imbres, nebulæ, nivesque solutæ facile admittant, & retineant; eorum quippe superficies crassiori arena constat, inter cujus particulas viam sibi faciliem aperit aqua. Intus præterea ingentes sunt cavernæ, vastæ receptacula, & strata lapidea ubique dehiscencia; idcirco plerique fontes e montibus scaturiunt.

Obj. 3. Si fontes ortum haberent ex aquis pluvialibus, quæ ex montium cacumine defluerent per strata lapideum & argillæ inclinata, deberent illi fontes in altum erumpere & profili-

re,

re, ut solent aquæ per canales ex locis editioribus in hortos subjectos deductæ: atqui tamen res aliter evenit; ergo, &c.

Resp. Neg. maj. Aquæ enim superiores vix premunt inferiores. Dum quippe unaquæque guttula inter arenas viam sibi eluctatur, ab iis sustinetur, & nonnisi lentissime in receptacula delabitur ad momium radices posita. Ex eo quod aquarum superiorum vis ab arenis obviis debilitetur, illud sequitur commodi, quod scilicet aquæ promptius non dissipentur, ita ut per multos menses siccos in hominum & pecudum usus desibere pergant.

Obj. 4. Fontes aquæ dulcis reperiuntur in insulis, licet careant montibus, qui pluvias & nives colligant; ergo fontes illi ab aquis pluvialibus non oriuntur.

Resp. Neg. conseq. 1. Enim vix fieri potest ut aliqua sit insula, in qua nullus extet collis in quo colligi possint. 2. Dicitur etiam potest fontes illos suam ducere originem ab aquis continentis, quæ per canales quosdam subter maris alveum dispositos, ad illas usque insulas deferuntur.

Quæres 1. Cur ex aquis mineralibus, aliæ proficiunt, aliæ noceant.

Resp. Diverse sunt fontium dotes, aliæ salubres, aliæ noxiæ pro diversa particularum natura, quas tecum permixtas aquæ devehunt. Hinc fontes alii frigidi propter admixtos sales, qui frigus aquis impertiunt; alii calidi ob particulas minerales & metallicas, quæ aquis adjunctæ simul tumultuantur & fermentescunt; alii ferruginosi propter dissoluta vel decerpta ferri corpuscula.

Quæres 2. Cur multa flumina auri, argenti, aliorumque metallorum particulas secum devolvant.

Resp. Ratio est, vel quia aquæ subterraneæ quæ fluminum fontibus dant originem, fodinas metallicas interfluendo, ex iis sensim particulas de-

detrahunt, & secum asportant; vel quia terræ illis fluminibus subjectæ nonnullas continent venas metallicas, quæ perpetuo arenarum & aquarum fluentium attritu abraduntur, & tandem divelluntur.

Quæres 3. Cur fontes quidam lignum in lapidem, in ferrum, ipsumque ferrum in cuprum convertere videantur.

Resp. Fontes quidam innumeras secum deferunt arenularum particulas, quæ meatus ligni subeuntes, ejusque partibus adhærentes, ibi tanta copia congeruntur, ut tota ligni superficies iis cooperiatur, sicque in lapidem converti videatur. Hinc etiam facile est intelligere, cur lignum in ferrum, aut ferrum in cuprum appareat transformatum. Id pendet ex variorum metallorum corpusculis, quæ e fodinis divulsa secum asportant aquæ fontium.

Quæres 4. Cur aquæ nonnullæ flammam igne admoto concipiant in ipso fonte, non vero extra fontem translata; cur fontes quidam supra sint frigidi, & infra calidi; cur nonnulli caleant noctu, & per diem frigeant.

Resp. ad primum: Ideo nonnullæ aquæ admoto igne flammam concipiunt, quia ex iis continuo erumpunt vapores sulphurei, qui per obivium ignem, instar spiritus vini, inflammantur. Eadem vero aquæ ex fonte haustæ, & alio translata non exardescunt, quia translationis motu & agitatione dissipati sunt halitus sulphurei.

Resp. ad secundum: Quidam fontes sunt supra frigidi, & infra calidi, quia partes igneæ quæ superficiem occupant, ab aere facile dissipantur; quæ vero fundum obtinent, intra fontem retinentur, ob partium aquæ superiorum, quæ ipsis incumbunt, pressionem.

Resp. ad tertium: Quorundam fontium aquæ frigent per diem, calent vero per noctem, quia æstus diei partes igneas nimium dilatat & dissipat, quam ut calorem sensibilem excitare valeant; contra vero eadem noctis frigore colle-

etæ & densatæ, sua conjunctione calorem procreant, quem disjunctæ efficere nequeunt. Forte etiam illi fontes per noctem ideo sentiuntur calidi, quia tunc sanguis noster minus quam per diem agitur.

*Experimentum*: Exorientē sole, humi procumbas, mento supra solum erecto, & oculorum aciem defigas in terræ superficiem vel paululum supra; aliquando vaporem humidum videbis sese undatim (*en ondoyant*) attollentem.

*Explicatur*: Constat experientia phænomenum illud ad fontem ibi delitescentem esse referendum; si ergo velis fontem detegere tuæ villæ perutilem, quod in prædicto experimento descriptum fuit exequaris; deinde sodi locum jubeas, unde vaporem humidum in auras sese efferentem videris: brevi te admonebunt fossores eo in loco repertam fuisse aquam.

### C A P U T III.

*De Phænomenis æreis, quæ Meteora dicuntur.*

**M**ETEORUM apud Græcos idem sonat, ac *in sublimi loco apparens*. Meteora hoc nomen inde habent, quod sint phænomena quæ in aere sublimi generari & conspici solent. Suum ortum ducunt vel ex particulis corporum terrestrium sursum evectis, quæ dicuntur exhalationes; vel ex partibus aqueis in aera sublatis, quæ appellantur vapores.

Mirum sane quanta copia vapores & exhalationes sursum indefinenter efferantur; ex singulis enim corporibus supra terræ superficiem positæ, quædam continuo divelluntur corpuscula, quæ per atmosphæram disperguntur, donec nonnullis circumstantiis in terram recidere cogantur. Corpus quodlibet terrestre aliquas suæ substantiæ particulas sensim amittit. Plantæ odorifera emittunt corpuscula, animalia expirant, mineralia sese dissipant. Si camphoræ frustulum, instar nucis

tenue, aeri exponas, post 15. dies totum evanesceat, omnia insensibili quadam expiratione frustatim absumuntur, & per aera dilabuntur.

Ex variis autem illis exhalationibus quæ in vastissimo atmosphære oceano fluctuant, præcipuæ sunt particule salariæ cujuscunque generis, vitrioli, aluminis, salis marini, &c. Observat etiam clarissimus *Boyle* plurimos in aere esse posse sales compositos, quorum nullum in terra vestigium deprehendimus, cui scilicet ex diversis spiritibus salinis simul permixtis coalescunt. Sic veterum ædificiorum vitra corrosa & pertusa videas, quamvis ex iis quos novimus salibus nullus sit, qui id efficere valeat.

Quænam autem causa vapores & exhalationes sursum impellat, definire difficile & arduum est. Juxta sententiam magis receptam, ideo vapores ascendunt, quia sive solis, sive ignis subterranei calor aquæ guttulas ita rarefacit, ut pari volumine aeris leviores factæ attollantur, sicut corpus pari volumine aquæ levius sursum evehitur.

Verum cum aquæ moles se habeat ad molem aeris sub æquali volumine, ut 800. ad 1., quis concipiat aquæ particulas, præsertim hieme, satis rarefieri, ut pari volumine aeris leviores fiant?

Quamobrem putant alii, inter quos *Nollet*, aerem respectu corporum quæ immediate contingit, esse veluti spongiam, & illius columnas efficere quasi tubos graciles & capillares, per quos assurgit aqua. At vero si aeris columnæ tuborum capillariorum vices gererent, numquid vapores aquei ad tantam altitudinem in atmosphæra pervenirent, maxime cum aqua, licet rarefacta, multo sit aere gravior?

Alii denique vaporum ascensionem ex eo repetunt, quod aqua in aere dissolvatur, sicut sal aqua gravius ab ea sic dissolvi solet, ut ejus particule ad summam usque superficiem aquæ attollantur. Si enim, inquiunt, æstate & tempore sereno glacies in vase sicco & vitreo po-

natur, vas brevi obscurabitur; externisque ejus parietibus adhærebunt innumera aquæ guttulae. Hæc igitur aqua in aere vas ambiente suspensa, erat dissoluta.

Aer eam tantum in statu dissolutionis aquæ copiam retinere potest, quæ ipsius calori sit attemperata, ita ut si refrigescat, tunc aquæ quam dissolutam continebat partem demittit. Si vero ipsius calor augeatur, tunc majorem dissolvat aquæ copiam. Quam veritatem sic demonstrat D. Leroy ex Academia Montispeffulani. Ineunte, inquit, mense augusto, tempore fereno, lagenam ex vitro candido rotundam accurate obturavi. Non aliud continebat, quam aerem cujus calor erat 20. graduum. Ea supra fenestram collocata, post aliquot dies mane observavi, liquorem thermometri, proter noctis frigus ad gradum decimum quintum descendisse. Eo frigore jam præcipitata fuerat pars aquæ in aere vasis in interiori prius dissoluta. Hæc aqua guttularum formam induerat in parte lagenæ superiori quæ, utpote magis exposita, prima frigescere inceperat. Deinde lagenam transtuli in planam nostræ turris speculatoriæ superficiem (*sur la plate forme de l'Observatoire*) cum matutinis omnibus hanc reviserem, deprehendi, quando liquor thermometri ad decimum quintum gradum delapsus erat, formari rorem tenuem intra vasis capacitatem, in ipsiusque parte superiori. Ros ille eo copiosior erat, quo inferius descenderat liquor thermometri. Ubi satis erat calor, aer in lagenâ inclusus per diem aquam dissolvebat, quæ nocturno tempore sese præcipitaverat.

Ex ingeniosis illis experimentis compertum quidem est aerem plus minusve aquæ dissolvere, prout magis vel minus calidus est; numquid vero idem ceteris in corporibus efficit, ut eorum exhalationes sorsum impellantur?

Quæcumque autem illa sit causa, quæ nondum satis explorata est, id certo constat in atmosphæ-



sphæram confluere ingentem vaporum & exhalationum copiam, quibus generantur meteora. Hæc autem multiplicis sunt generis, alia scilicet humida sive aquea, alia volatilia, alia tandem ignea, de quibus totidem in articulis differendum est.

## ARTICULUS PRIMUS.

### *De Meteoris humidis, sive aqueis.*

**M**eteora humida sunt aura serotina, ros matutinus, nebula, nubes, pluvia, vortices turbinei, nix, grando.

### *De Aura Serotina (le Serein.)*

Quæres 1. quoduplex sit aura serotina.

Resp. Duplex, alia nempe ascendens, & alia descendens.

Quæres 2. Quomodo formetur aura serotina ascendens.

Resp. Ex iis vaporibus nascitur, qui post solis occasum evehuntur: postquam enim sol ab horizonte recessit, terra, utpote densior, calorem a radiis solaribus acceptum diutius retinet, quam aer; fluidum igitur igneum e terra erumpens, ut cum igne in aeris atmosphæra contento sese in æquilibrio componat, secum vapores devehit, quibus camporum pratorumque gramina humectantur. Quamdam esse auram serotinam, quæ ab imo sursum petat, experimentum sequens demonstrat.

Quo tempore datur roris copia, plurimas, opercularæ, vitri lamine vespere in situ horizontali ita disponas, ut aliæ aliis, interposito quodam intervallo, impositæ sint. Quid eveniet? lamellæ terræ propioris superficies inferior prius rore humectatur, & deinde pars illius superior, sed minus. Lamella sequens pariter paulo tardius madefiet, sicque deinceps; ita ut quo.

quo laminæ vitreæ a terra sunt remotiores, eo minus & tardius humescant: atqui contrarium procul dubio contingeret, si roscidus humor, ab atmosphæra in terram delaberetur.

Quæres 3. quomodo generetur aura serotina descendens.

Resp. Aura serotina descendens sic gignitur: quando vehemens fuit calor diurnus, & occidente sole aer frigescit, vapores cum exhalationibus permixti, certo post solis occasum tempore descendunt. Aere enim frigefcente, sunt densiores, sicque in guttulas aere graviore, licet oculis incompuestas, collecti decidunt, vestesque madefaciunt.

Quæres 4. cur aura serotina nonnullis in locis & temporibus valetudini noceat, minime vero in aliis.

Resp. Sic explicatur hæc effectuum diversitas: cum nihil aliud sit ros, quam vapor & substantiis mineralibus aut vegetabilibus extractus, mirum non est, ipsi qualitates bonas vel malas inesse, pro natura corporum e quibus emanavit. Cum vero diversis in locis diversæ nascantur plantæ, nec minus variis sint alie naturæ foris: cum etiam calor, quo excitantur exhalationes, quolibet tempore & loco non idem sit, verisimile est pro locorum & temporum diversitate, variari dotes roris. Sic Romæ locisque vicinis periculosum esse ajunt, labente die, aperto aeri sese exponere, dum Parisiis illud impune fieri potest. Ratio est, quod Lætici ros serotinus nihil aliud sit quam humor aqueus; in Italia vero exhalationes contineat, cum natura soli cognatas, & quarum copia regionis calori responderet. Ideo circa materiam hanc nulla statui potest regula generalis. Quandoquidem pro varia soli natura, variæ sint roris proprietates, ideo si diversis in regionibus ros colligatur, & chymicæ dissolutioni subiectus fuerit, maxima erit effectuum diversitas. Eam ob causam circa roris dotes plurimum dissentiant artis chymicæ periti. Chymicus quidam post distillationem

nem roris quem collegerat, liquorem obtinuit, qui vitro iridis colores sic tenaciter imprimebat, ut neque frictionibus, neque aqua forti deleri potuerint. Liquor ille non minus erat ad inflammationem promptus, quam spiritus vini. (*Repub. des Lettres, tom. 1. pag. 590.*)

Clarissimus *Grimm* rorem in nova Hollandia collectum percolavit (*filtra*) in vaporesque solis ope caloris balnei (*chaleur de bain*), inde liquorem obtinuit flavum & gravem, quo solvebatur argentum, imo & ipsum aurum, quanquam difficiliter. Eidem liquori vis inerat cuprum, plumbum, stannum & marmor dissolvendi.

Ea est roris utilitas, ut plantas humectet & nutriat, præsertim in regionibus ubi non pluit, & quarum solum maxime est arenosum. Observatum enim fuit in iis locis subter humum plurimum esse humoris, & inde sese attollere uberrimam roris copiam. Roscidum humorem excipiunt folia & exsugunt, unde in ceteras plantarum partes transmittitur. Hinc intelligere est, quomodo plantæ in rupibus defixæ nutririque queant & angelcere,

*De Rose matutina*

Ros matutinus ille est, qui ante solis ortum in terram delabitur; suam habet originem a vaporibus, qui die antecedente ad certam altitudinem calore sublati fuerant, & qui frigore densati recidunt. Cum sol oriens aeris particulas multo celerius calefaciat & dilatat, quam vapores, tunc illi ab aere suslineri desinunt, ideoque statim decidunt & dissipantur.

Hujusmodi rorem ab atmosphæra decidentem, cave ne confundas cum alia roris specie, quæ consistit in iis guttulis quæ ante solis ortum conspicuæ sunt in arborum & plantarum foliis & truncis. Ros quippe ille nihil aliud est, quam plantarum exspiratio, & veluti sudor. Quod phænomenum sic explicari potest.

Sol

Sol terræ succos ad plantas nutriendas destinatos calefaciendo & agitando, eos cogit intra radices sese insinuare, & inde per trunci tubulos ascendere; unde per ramos & folia sese diffundunt, & usque ad partes extremas perveniunt. Hinc quando fervet æstas, plantæ videntur languescere; quia succi nutritii, utpote nimium volatiles & calore agitati, dissipantur & avolant. Plantæ igitur suo fraudatæ alimento deficiunt. Verum per noctem succi & humores terræ, calore diurno calefacti, plantarum radicibus adrepere pergunt, eas subeunt, & deinde versus truncum, folia & alias partes impelluntur. Tunc autem plantas circumcingit aer frigidior, qui humores minus siccat. Succi itaque qui e plantarum tubulis gallice dictis, *vaisseaux excrétoires*, exeunt, nec exsiccantur, sensim collecti simul coeunt, & guttularum formam induunt; quæ manè oculis sunt conspicuæ, nisi a ventis flantibus dissipatæ, vel solis orientis calore exsiccata fuerint. Ros igitur plantarum nihil aliud est, quam earum expiratio, non autem vapor, qui ex aere in ipsas defluerit.

Veritatem hanc diversis experimentis comprobata habuit D. *Musschenbroek*, ex quibus unum dontaxat referemus. Duas adhibuit plumbi laminas, ex quibus semicirculum incidit; ita ut in illis juxta se invicem positis esset foramen, quo includi poterat caulis (*la tige*) papaveris. Deinde quidquid inter duas laminas erat intervalli cera diligenter obduxit, ut omnem humiditatis terræ transitum intercluderet. Denique plumbi laminas & ipsum papaver cooperuit campana vitrea, ne quid humidi ex aere in plantam decideret. Cum eam identidem inviseret per noctem, observavit hanc majori roris copia esse conspersam, quam alia ejusdem speciei ac ætatis papavera, quæ prope in aperto aere consista erant. Deprehendit etiam, quando siccus spirabat ventus, plantam inclusam semper esse rore onctam, dum aliz plantæ eo prorsus erant destitutæ.

Idem

Istud experimentum in pratorum herbis & urticis ( *orties* ) tentavit, idemque iis contingens exploravit.

In rore tum festivo, tum matutino qui ab atmosphaera delabitur, illud praesertim mirabile est, quod nonnulla corpora veluti refugiant, dum aliis facile adhaerent. Vitrum, porcellanae & aliae diversi generis materiae rore plurimum madefiunt, dum metalla bene teria & polita suam constanter retinent siccitatem, quamvis eidem loco exponantur. Certe *espece de préférence*, inquit Nollet, *est si marquée, qu'un peu placé au milieu d'un grand plat de faïence ou de verre, ne reçoit pas la moindre humidité, quoique le reste du vaisseau soit tout mouillé.* ( *Tom. 3. pag. 377.* )

Ea de re multa sunt experimenta a D. Fay excogitata, qualia sunt ista: duo sumpsit vitra concava, iis similia quae in manualibus horologiis ( *montres* ) adhibentur. Alterum argenteo & polito circulo erat circumdatum. Istud supra laminam argenteam posuit, ita ut in sua parte concava rorem excipere posset. Aliud supra vasis porcellanei fragmentum collocavit. Quo in posteriori collecta est roris copia septies major, quam in altero. Animadvertit praeterea rorem ab annulo argenteo repulsum fuisse ad quinque linearum distantiam, ita ut ad illud usque intervallum sicca permaneret vitri circumferentia.

Deinde laminam adhibuit cupream & politam, cujus longitudo sex, & latitudo trium erat pollicum. Eam posuit supra trabem ( *poutre* ) prope vitri fragmentum cujus eadem erant dimensiones. Observavit autem vitreae laminae rorem insedis: dum in cuprea nullum esset ipsius vestigium. Denique utramque hanc laminam cooperuit cum alia vitrea. Quid autem contrigit pars laminae vitreae quae cupream obtegebat, nihil roris excepit, dum altera ipsius pars plurimum collogerat; tanta est igitur inter cuprum & ro-

& rorem veluti discordia, ut etiam trans vitæ crassitudinem (*épaisseur*) sese exeruerit.

### De Nebula.

Nebula (*le brouillard*) est vaporum & exhalationum congeries crassiorum, quæ suam ob gravitatem, vel frigus quo statim densantur, altius non assurgunt, sed non procul a terra in aere suspenduntur. De nebula hæc præsertim occurrunt observanda: 1. rarius æstate post solis occasum apparet, quam vere & autumnò, quia iis temporibus calor aeris vespere satis imminuitur, ut vapores & exhalationes fiant sensibiles; aliter vero se res habet æstate; tunc enim non tantum est discriminis inter diæi & noctis calorem. 2. Nebulæ per hiemem sunt frequentiores, quam aliis anni tempestatibus, quia tunc remissior est vis solis, & frigus atmosphæræ vapores e terra assurgentes statim condensat. Eandem ob causam brumali tempore spiritus ex hominum & animalium ore emissus, nubeculæ formam exhibet, quod æstate non accidit. 3. In montium declivitate & apice interdum subito formantur nebulae. Ratio est, quia venti minutissimis & in aere dispersis vaporibus occurrentes, eos secum rapiunt, & versus montium latera vel apicem propellunt, ibique collectos condensant. 4. Ubi nebula ex vaporibus aqueis tantum coalescit, minime perniciofa est; sed aliquando pravis & malignis exhalationibus constat, tumque plantas tenellulas, flores nascentes, fruges lactentes enecat, & animantium valetudini plurimum nocet. Inde etiam nascuntur vitia tritico (*froment*) & secali (*seigle*) satis communia, quæ vocitari solent *la nielle* & *la rouille*. Iisdem causis tribuunt quidam Physici, quod nonnullis in spicis deprehenditur, quarum granum nigrescit, & instar cornu in longitudinem excrescit, ab agricolisque dicitur *ergot* ou *bled cornu*. Valetudini exitiosa est farina ex huiusmodi granis confata.

De

*De Pruina.*

Pruina (*la gelée blanche*) nihil aliud est, quam roris guttulæ aere frigidiori densatæ, ita ut aliæ aliis breviorum instar filorum adhærescentes, varias induant formas. Vitro potissimum sese agglutinat pruina. Per hiemem, ubi clausæ sunt fenestræ, vitrum interius obducit. Ratio est, quia aer in cubiculo contentus, aere externo calidior est. Cum autem fluidum igneum sese expandere perpetuo nitatur, ut sese in æquilibrio componat, meatus vitri permeat, eosque trahendo vapores sibi admistos deponit, utpote crassiores, quam ut eisdem poros subeant. Hinc mane in fenestris diversæ apparent figuræ, quasi penicillo delineatæ.

Observationibus constat plantas virides pruina cooperiri, dum aliæ nullam aut fere nullam admittunt. Ratio est, quod plantæ virides exsudent (*transpirent*) quæ exspiratio frigore corripitur; siccæ vero & aridæ non expirent. Si quid pruinæ posteriores suscipiant, id oritur ex vaporibus e terra sublatis.

*De nubibus.*

Nubes, perinde ac nebulæ, ex vaporibus & exhalationibus constanter, at subtilioribus, ideoque altius in aere suspenduntur. Cum autem plurimi, & maxime adolescentes, nubes sibi fingant tanquam solida corpora, quæ nostris imminet cervicibus, ut ab illo errore liberentur, quædam sunt observanda.

1. Si fumum attente inspexeris ex carbone terrestri, vel stipula accensa erumpentem, dum placidus est aer, & silent venti, tunc eum videas intra partes aeris sese insinuantem, donec quandam nubis speciem efficiat, quæ ab aliis nec opacitate, nec colore differat. Hæc tamen præter fumum tenuissimum nihil est. Ubi

emigus in urbem amplissimam oculi conjiciuntur, eam circumvolvere videtur nubes densissima, quæ suam tamen habet originem ex fumis in sublimem erectis.

2. Multi sunt viatores qui montes altissimos superarunt, qui Alpium & Pyrenæorum juga, conscenderunt: atqui ii testantur omnes se, postquam ad nubium regionem pervenissent, in spissam & opacam nebulam ingressos esse, quæ ipsis cæli conspectum eriperat.

3. Si nubes in solida corpora converterentur, tunc pari aeris volumine essent graviores, ac proinde a summo deorsum ruerent præcipites; eas tamen videmus in aere penfiles.

Nubes ad eandem altitudinem omnes non perveniunt. Necessè est enim ut sese in æquilibrio constituent cum aere in quo fluctuant. Illud autem fluidum eo rarius est, quo magis a terra distat. In ea igitur sublimi aeris regione sustineri non possent vapores crassiores, in qua suspenduntur subtiliores.

Nubes varios exhibent colores, prout hos vel illos radios transmittunt, aut reflectunt. Ubi nivibus constant, tunc omnes luminis radios regerunt, & albo colore tinguntur. Si nubes in exiguas aquæ guttulas convertantur, tunc lumen absorbent, ideoque videntur nigrescere. Hinc nubes nigrae imminuentem pluviam prænuntiant. Ubi solem inter & oculos nostros interpositæ, radiis tantum rubris transitum permittunt, tunc rubeum induunt colorem.

Ventus aliquando tanta vi, tantoque impetu nubes impellit, ut varias in partes discerptæ huc illuc dispergantur, & omnino evanescant. Idcirco sæpe accidit, ut cælum sit perlucidum ac serenum, dum violenta sævit tempestas. Dissipantur etiam nubes, cum aer, in quo sunt penfiles, fit gravior. Tunc enim, ut æquilibrio cum eo retineant, altius assurgere coguntur. Dum vero trans aerem puriorem sese attollunt, aer ille varias ipsorum particulas dissolvit, eis  
que



que sese permiscet : unde sensim decreſcunt, & penitus diſſipantur.

Nutriendis fontibus non parum inſerviunt nubes, etiam quando non pluit. Qui enim per montes altiffimos, quales ſunt Alpini & Pyrenæi, iter faciunt, ſæpe nubes denſiſſimas trajiciunt, quæ terram ipſorum oculis eripiunt. Non ſemel autem obſervarunt, in editis iis locis terram ſemper plurimum humeſcere, propter nubes quæ ad rupes illas alliduntur ; quod ſane non parum confert ad ſubminiſtrandas fluviis & fontibus aquas, qui ex illis montibus ſcaturiunt. Quamobrem, etiam quo tempore non pluit, nubes totidem ſunt aquæductus, qui a ventis huc illuc circumferunt ; & a montibus hauriuntor, unde aquæ in campos per canales a natura diſpoſitos ſeſe effundunt.

In S. Thomæ inſula nunquam pluit ; ſed media in regione eminet mons altiffimus, arboribus coopertus, qui ſemper nubibus die noctue involvitur. Harum nubium vapores terram ſubeunt & humectant ; ita ut ex monte rivi deſuant, qui irrigandis agris ſufficiunt.

### De Pluvia.

Pluvia eſt guttularum aquæ congeries quæ ex atmophæra in terram decidunt. Sic autem formantur huiusmodi guttulæ : nubes ſæpiſſime comprimuntur tum a ventis eas in ſeſe invicem impellentibus, tum aeris in quo fluctuant denſatione. Tunc enim earum particulæ ſimul collectæ ſut guttas coeunt, ſicque pari aeris volumine gravioreſ factæ, ab eo ſuſtineri nequeunt ; in terram igitur deſcunt neceſſe eſt.

Quæres 1. quænam ſint pluviarum cauſæ.

Reſp. Præcipua pluviarum cauſa eſt ventus :

1. Enim quando fiat a ſummo deorſum & nubem offendiſſet, eam comprimit, ejus partes in maſſam compingit, ideoque in pluviam convertit. 2. Cum venti ex partibus oppoſitis in nubem

incurrunt, tunc eam condensant. 3. Quando venti ex occidente vel meridie spirant, nubes vaporibus marinis scetas adducunt: nam versus occidentem & meridiem latius patet mare, quam versus alias terræ partes. 4. Cum venti in montes & nemora nubes impellunt, eas comprimunt & densant, ita ut ipsarum particulæ simul junctæ in guttas coeant, & proinde in pluviam convertantur. Quam ob causam pluvias magis obnoxii sunt loci montuosi, quam planæ regiones.

Præterea silvæ plurimam imbribus dant occasionem. Arbores enim ingentem vaporum copiam expirant, unde formantur nubes aquis affluentes. Quapropter observatur in Suecia copiosiores esse pluvias, quæ terram nimium diluentes, ipsius fertilitati nocent. Cui incommodo ut aliquatenus occurrerent incolæ, necesse fuit imthenforum saltuum, partem evertere. Idem remedium adhibere coacti sunt Galli & Hispani in insulis dictis *les Antilles*, quæ olim longe magis uliginosæ erant, quam hodiernis temporibus. Idem confirmatur D. Bouguer, dum in Peruviam peregrinaretur, observationibus. Notavit creberrimas & copiosissimas esse pluvias a fluminis *Guayaquil* ostio (*embouchure*) usque ad *Panama*, quod 300. milliariorum longitudinem efficit, quia tota hæc regio tegitur nemoribus.

Quæres 2. cur aliquando tenuis, aliquando largior sit imber; cur per æstatem guttæ pluviales magis a se invicem disjungantur, & majores sint, quam per hiemem.

Resp. 1. Quando nubis densatio fit lente, vel ubi vapores non decidunt, nisi quia aer a quo sustententur, rarefit, ut interdum post nebulam matutinam contingit, tunc guttulæ sunt tenuissimæ & pluviam efficiunt minutissimam, quæ appellari solet *pruina*. Idem accidit cum nubes lente in pluviam mutatur, & per suam partem inferiorem. Tunc enim particulæ inferiores prius decidunt, superiores etiam lente & paulatim

tim delabuntur, nec proinde inter descendendum alias guttas offendunt, quibus sese adjungant, ideoque tenuis est pluvia. Ubi autem nubis in pluviam conversio incipit a parte superiori, tunc largior defluit imber. Guttulæ enim ex parte superiori delabentes totam nubem trajiciunt, guttis inferioribus occurrunt, iisque consociatis suam molem amplificant.

2. Per æstatem guttulæ pluviales, cum decidunt, magis a se invicem disjunctæ sunt, quam per hiemem. Ratio est, quod æstate vapores & nebulæ multo sint rariores; longius ergo temporis spatium requiritur, ut vapores in guttulas coeant satis graves ut decendant.

3. Guttæ æstivo tempore sunt mole majores, quia cum aer sit multo rarior, quam per hiemem, vapores altius evehuntur, ac proinde e loco sublimiori descendunt. Id autem fieri non potest, quin incidant in multas alias vaporum particulas sibi obvias, quarum conjunctione augentur. Eam ob causam, qui in valle positi sunt, crassiores imbris globulos excipiunt; si vero in montem ascendant, tunc longe minores esse aquæ guttas deprehendunt.

Quæres 3. utrum admittendæ sint pluviae arenarum, sulphuris, sanguinis, & basonum (*crapauds*).

Resp. Multi popularibus delusi præjudiciis, ita præfatis pluviis fidem adhibent, ut ab ea persuasionem dimoveri se non pariantur. Qui vero philosophicis oculis rem inspiciunt, hujusmodi pluvias mera esse figmenta facile deprehendunt.

1. Verum quidem est in locis a mari non mediocriter diffitis visas interdum fuisse quasdam pluviae arenosæ species; sed ventis & tempestatibus tribuendæ sunt, non vero credendum arenas in nube contineri & inde in terram delabi. Ventri enim procellosi effectus producant longe magis stupendos, & qui vim multo majorem postulant. Nonne ventorum impetu eradicantur

tur arbores crassissimæ, & solumque avulsæ alio transferuntur? nonne domorum tecta rapiantur? numquid ergo mirum est, quod venti arenas leves huc illuc disjiciant, & longe transferant?

Variis in regionibus venti eam secum abripiunt arenarum congeriem, quæ totos exercitus contegere valeat, ut accidit exercitui quem Cambyses ad locum Jovi Ammoni consecratum miserat. In Arabia & Ethiopia non semel excitantur tempestates, quæ immensam arenarum copiam in terram & mare effundunt, quæ viatores opprimuntur. In America loco cui nomen *Vera Cruz*, interdum domorum tecta sabulis obstruntur, quæ vento boreali huc transferuntur. In Armorica inferiori (*Basse-Bretagne*) prope urbem Leonam (*St. Pol de Léon*) regio est quæ ante annum 1666. habitata fuit, nunc vero circiter arenarum pedibus cooperitur. Ibi etiamnum conspiciuntur quidam campanalium (*clochers*) apices, & nonnulla caminorum fastigia, quæ ex sabulorum acervo emergunt. Plaga quæ tantam arenæ copiam suppeditavit, ad quatuor saltem leucas excurrit. Locorum situs ejusmodi est, ut arenæ in terras deferri non possint, nisi a ventis gallice dictis *Est-Nord-Est*. Ita D. Sauri. (*Cours de Physique tom. 3. pag. 537. & 538.*)

2. Non minus fictitia est sulphuris pluvia. Anno 1677. Tigurii apud Helvetios (*Zurich en Suisse*) decidit ingens pulveris flavi copia, quem pro sulphure habuit plebs credula; verum multitudinis judicio non fuit abreptus D. Scheuchzer. Re diligenter inspecta, deprehendit id nihil aliud esse quam pulvisculum staminum (*poussière des étamines*) e junioribus pinis ablatum, quæ circa lacum erant frequentissimæ. Bordigalæ paucis ab hinc annis contigit simile phenomenon. Ibi etiam delapsus est pulvis flavus, & quidem copiosus, qui sulphuris speciem præ se ferebat. Plurimi hujus fasciculi ad Regiam Scientiarum Academiam Parisiensem delati sunt; quæ in iis facile agnovit pulverem staminum.

minum e pinis, quæ in ea regione maximo sunt numero, decussum.

3. Pariter fabulosa est pluvia tritici. Verum quidem est aliquando, post imbrem densissimum, visam fuisse terram ingenti minutorum granorum multitudine coopertam, quæ ad tritici similitudinem accedebant: iis vero diligenter inspectis, animadversum est grana ista nihil aliud esse, quam bulbos (*bulbes*) quibus plurimum abundant radices cujusdam ranunculi (*renoncule*) qui dicitur *petite chélidoine*. Ii bulbi primum pulvere contexti, in conspectum non veniunt: sed aquæ pluviales eos abluendo faciunt conspicuos.

4. Pluere bufonibus arbitrantur plurimi, de quibus sic habet D. Brisson: *Il y a encore une grande quantité de gens, & j'en trouve souvent de cette espèce, qui ont la simplicité de croire qu'il pleut des crapauds, & il ne faut pas croire qu'on pourra les dissuader par des raisonnemens. On auroit beau leur dire que les crapauds ne sont crapauds, que lorsqu'ils ont un certain âge, qu'après avoir déjà long temps vécu sous une autre forme; qu'ils viennent d'un frai qui doit être déposé dans l'eau, & continuer d'y demeurer, sans quoi il se dessécheroit, & le germe ne pourroit se développer; que les petits animaux qui en proviennent, & que l'on connoît alors sous le nom de têtards; n'ayant point de pattes, mais une longue queue, sont contraints de continuer à vivre dans l'eau, jusqu'à ce que leurs pattes soient développées, & que leur queue soit entièrement, ou presque entièrement disparue; qu'alors ils sont trop pesans pour pouvoir être élevés jusqu'au nage, & y demeurer suspendus; qu'il est plus raisonnable de penser que ces petits animaux, qui étoient cachés sous des herbes, ou dans des trous sont déterminés par la pluie à sortir de leurs retraites: tout cela ne les fera point changer d'avis; ils ont vu les petits crapauds sur la terre après la pluie; donc, se-*

lon eux, ils font tombés du nuage. (*Dict. de Phys.* tom. 2. pag. 397.)

§. Pluvias instar sanguinis rubeas, tam frequenter commemorant scriptores antiqui & recentiores, ut ea de re nullum dubium esse debeat. Sæculo proxime elapso, in Provincia (*en Provence*) decidit imber rubicundus, qui rusticos sic territavit ut, desertis agris, in suis adibus sese trepidi recondere: doctissimus Petrase, qui tunc ruri habitabat, hujus phænomeni causa diligenter exquisita, deprehendit rubro quidem colore tinctas esse pluviae guttulas, sed eas insectis scatere rubris, quæ tunc innumera per aerem volitabant. Unde in promptu fuit concludere colorem rubrum oriri ex iis insectis cum aqua permistis. Præterea imber eodem tempore in urbe delapsus, nihil singulare habuit, quia ibi non aderant hujusmodi insecta.

Ex observationibus Swammerdam, in sua insectorum historia, compertum est plurima existere insecta rubea, quæ suo colore aquas inficiunt. Quidpiam simile olim civibus Lugduni Batavorum (*de Leyde*) terrorem injecit, quia persuasi erant aquam fuisse in sanguinem conversam. Philosophiæ professor D. Schuyt, hujus rei causam explorandi cupidus, in naviculam insiliit. Deinde hausta aqua in cyatho, eam vidit insectis rubris refertam; sunt pulices (*pucerons*) aquatici, qui tanta fecunditate per æstatem sobolescent, ut aquarum superficie rubrum colorem inducant, ii vero furentibus ventis rapti, & aquis pulvialibus permisti, imbrem rubicundum quibusdam in locis efficiunt. Interdum papilioes, dum suas deserunt chrysalides, excrementum quoddam rubeum supra domorum tecta & arborum folia deponunt. Ipsæ erucæ (*les chenilles*) ex iis papilionibus progeneræ, quando in chrysalides sese conversuræ sunt, excrementis etiam rubidis muros inspergunt, quæ pluviales guttas rubeo colore inficiunt. Hinc populus si

hi persuadet sanguineum imbrem decidisse. Errant igitur Veteres, qui pluvias colore rubro tinctas pro sanguine habuerunt; sanguis enim non existit, nisi in hominum & animalium corporibus.

Quæres 4. quotuplex sit pluviz utilitas.

Resp. Eam triplicem esse. 1. Atmosphæram purgat, dum exhalationes quæ in eam per siccum tempus coierant secum abripit & desicit; nimia quippe earum copia aerem corrumpere, & morbos populares importaret. Unde accidit ut, desinente pluvia, liberius spiremus. Aer præterea fit magis perlucidus, & objecta cernuntur distinctius; quæ omnia demonstrant aerem tunc a corpusculis alienis esse magis expeditum.

2. Aerem quem spiramus refrigerat pluvia, & calorem per quasdam anni tempestates nobis molestissimum temperat. Ratio est, quod æthereæ regio in qua fluctuant nubes, penè semper frigidior sit ea parte atmosphære in qua versamur. Altissimarum enim montium cacumina nive semper cooperta sunt, ipso etiam tempore quo in ipsorum radicibus viget calor fervidus. Illud factum iis omnibus compertum est, qui per eos montes iter fecerunt. Itaque pluvia per æstatem decidens, aqua est frigida quæ aerem ipsa multo calidiorē trajicit; iste igitur aquæ pluviali partem sui caloris non modicam impertit, ac proinde amittit.

3. Ad terræ fecunditatem plurimum conducit pluvia. Cum opportuno tempore advenit, & moderata est, terram emollit, ipsius particulas dividit, suam plantis servat flexibilitatem; succis nutritiis instar vehiculi est; ipsa quam subministrat aqua magnam in formandis vegetalibus partem habet; ea deficiente, languent & arescunt plantæ.

Quæres 5. quo pacto æstimeretur pluviz per annum deciduæ quantitas.

Resp. illum ad usum adhibetur vas quadratum vel cylindricum, cujus altitudo in par-

tes æquales interius dividitur. Vas illud aeri in loco aperto, sed ventis subducto, exponitur. Quoties pluit, in diario (*sur un Journal*) scribitur quot lineis aqua in vase sese extulerit. Elapso anno, sibi invicem adduntur omnes illæ quantitates, sicque innotescit tota aquæ pluvialis summa, quæ per 12. menses decidit.

### *De Vorticibus turbineis (Trombes)*

Vorticis turbinei nomine intelligitur vaporum coacervatio, densissimæ nubi similis, quæ per modum columnæ cylindraceæ aut coni inversi in longitudinem excrescit ab alto deorsum, vel ex imo sursum; sonitum edit a fremitu maris violenter agitati non absimilem; sæpe ingentem pluviam aut grandinis copiam circumquaque disjicit, naves obruit, arbores, domos & obvia quæque evertit. In terra quidem rari sunt hujusmodi turbines, sed in mari frequentiores. Quantam stragem inferre soleant, cum noverint qui mare frequentant, ut ab iis recedant nihil non moliantur; ubi vero non possunt ad eos non accedere, tunc fragosa tormentorum bellicorum emissionem turbinei rumpere & dissipare nituntur.

De terribili hujus meteoris causis variæ sunt Physicorum opiniones, quarum referendæ sunt præcipuæ.

Opinio I. Unde nascantur turbinei vortices sic exponit clarissimus Musschenbroek, in opere e lingua latina in gallicam converso: *Il arrive quelquefois que deux vents soufflent directement l'un contre l'autre, & que rencontrant des nubes dans leur chemin, ils les poussent l'une vers l'autre & les compriment, ce qui fait qu'elles se convertissent d'abord en eau. Si ces vents continuent d'avancer un peu à côté l'un de l'autre, ils font tourner avec rapidité les nubes qu'ils compriment, de même que deux puissances appliquées à la circonférence extérieure d'une roue,*



la feroient aussi tourner, si elles pressoient l'une contre l'autre, & dans des directions contraires. Une partie de la nuée condensée, se trouvant ainsi dans un mouvement circulaire, tombe par son poids de l'air en bas, prend la figure d'une colonne tantôt conique, tantôt cylindrique; mais elle tiene toujours en haut par sa base à l'autre partie de la nuée noire & épaisse, tandis que la pointe regarde en bas. On donne à ces colonnes le nom de trombes de mer.

On a observé que les colonnes sont creuses en dedans & sans eau, parce que la force centrifuge pousse hors du centre toutes les parties internes, qui se meuvent alors d'un mouvement rapide & circulaire, avec lequel le tourbillon est emporté; comme autour d'un axe . . . . Plusieurs parties aqueuses se détachent de la circonférence, & forment la pluie qui tombe autour du tourbillon . . . . Lorsqu'il se tient suspendu au dessus de la mer, & qu'il est presque descendu sur sa surface, il s'élève de la mer une autre petite colonne qui va à la rencontre de la supérieure. En effet, comme la trombe est creuse dedans, qu'elle ne contient qu'un air fort raréfié, puisque les parties aqueuses s'éloignent continuellement du centre, & que l'air fait aussi la même chose, l'air comprime alors la mer par son poids, & la fait monter vers la trombe qui se trouve suspendue immédiatement au dessus. C'est ainsi que l'eau s'élève dans une pompe, lorsqu'on agite le piston.

De là vient que l'air s'insinue dans ces cavités entre la mer & la partie inférieure du tourbillon, & qu'il emporte tous les corps légers, qu'il élève ensuite dans le tourbillon. Il en tombe alors une quantité prodigieuse d'eau, qui fait monter celle de la mer, de sorte qu'il se forme tout autour du tourbillon une épaisse brume . . . ; il cause des inondations & des ravages affreux par-tout où il tombe. Il arrache les arbres les plus gros, & renverse les vaisseaux avec autant

de promptitude que les vents les plus impétueux. Ces trombes continuent jusqu'à ce qu'elles soient entièrement tombées de l'air; on les voit souvent sur mer, mais plus rarement sur terre.

Si variaz quæ turbines sæpe comitantur circumstantiæ, & diverſi quibus generantur modis considerentur, facile erit deprehendere non sufficere opinionem mox expositam. 1. Enim aliquando contingit ut omnino ſileant venti, tempore & in loco ubi ſeſe prodiſt illud phænomenum. 2. Non ſemper e nube proficiſcitur turbo; ſed interdum e maris ſuperficie verſus nubem ſeſe attollit. Quæ duo conſtant ex hiſtoria Academiæ Regiæ Scientiarum Pariſienſis ad annum 1741., pag. 20., ad annumque 1742. pag. 25. Ex iis autem circumſtantiis aperte ſequitur vortices turbineos ex ſolo ventorum conſiſtu non oriri.

Opinio II. Putant nonnulli huiusmodi vorticum non aliam ſere ſemper eſſe cauſam, quam vaporum & ignium ſubterraneorum eruptionem ſubitanæ, quæ reiſſa interdum in maris & lacuum fundo locum habet. Par quidem eſſe poteſt hæc cauſa explicandis turbinibus qui ex aquarum ſuperficie verſus nubes ſeſe efferunt, & qui vocari poſſunt *turbines aſcendentes*; ſed eos nequit genere qui e nube in terram demittuntur, & quos appellare licet *turbines deſcendentes*. Inquirentes illi Phyſici eos poſteriores ortum habere ab aeris rivulis, qui nubem cogunt vorticis aquei formam induere, priores autem ex aliqua vaporum & ignium eruptione prodire? Quorum vero duas cauſas iis affectibus assignare, quibus procreandis ſatis eſt, unica? Nonne legum naturalium ſimplicitati magis congruum eſt, turbines ſive *aſcendentes*, ſive *deſcendentes* uni & eidem cauſæ adſcribere, quæ efficiendis utriſque ſufficiat?

Opinio III. Vortices turbineos, ſive *aſcendentes*, ſive *deſcendentes*, uni eidemque cauſæ, nempe electricitati, attribunt Phyſici quidam recentiores; quam opinionem primus in luculentis differ.

dissertatione exposuit D. Brisson (*Mém. de P' Acad. an. 1767.*) in qua mentem suam sic aperit.

Ubi duo corpora, quorum unum vi electrica imbutum est, minime vero alterum, ex adverso stant, ad sese invicem accedere quodam modo nituntur. Unde fit ut illud cujus liberior est motus, versus alterum plus minusve celeriter sese ferat. Inter hæc corpora duo interjecti sunt materiae electricæ rivuli, qui simul in partes oppositas abeunt, a clarissimoque Nollet vocantur *effluentes & affluentes simultaneæ*. Materia *effluens* e corpore electrico dimanat, & versus aliud minime electricum tendit: materia *affluens* e corpore nondum electrico derivatur, suumque cursum versus alterum electricum dirigit. Ex duobus his rivulis semper unum esse altero vegetiorem constat. Hæc facta iteratis experimentis comprobata, inquit D. Brisson, ad explicandos vortices turbineos sufficere mihi videntur.

Quando nubes egregie electrica ad terram, quantum satis est, accedit, tunc inter corpora in ipsius superficie posita & nubem interponuntur duo materiae electricæ rivuli, quos modo descripsimus. Nubes undequaque versus corpora terrestria materiae effluentis radios jaculatur, & simul corpora terrestria ejusdem generis materiam quam affluentem diximus, versus nubem immittunt. Si fortior sit materiae effluentis rivulus, tunc secum vaporum, ex quibus constat nubes, particulas abripit, quæ columnam efficiunt cylindræam aut conicam, in qua consistit vortex turbineus, quem vocamus *descendentem*. Ille eo majorem habebit diametrum, eo quæ longius procurret, quo vegetior erit nubis virtus electrica. Si contra plus virtutis habeat materia affluens, & nubes electrica iis corporibus immineat, quorum liber est motus, v. g. maris aut ingentis lacus superficie, tunc materia affluens eam particularum aquearum copiam secum rapit, quæ sufficiat ad formandam columnam

nam quam versus nubem sese attollere interdum videmus, & cui verticis *ascendentis* nomen dari potest.

Huic opinioni mire sese accomodat experientia: Aqua implevi, pergit idem Physicus, vasculum (*un dé à coudre*.) Ad ipsum admovimus tubum recens perfricatum; illico vasis aqua instar colliculi (*monticule*) sese extulit, donec inde scintillula eruperit. Tunc in vasculum recidit. Dum aqua sic erat suspensa, levis quidam fremitus audiebatur, & paries tubi qui vasi obversus erat, tenuibus aquæ particulis fuit omnino coopertus. Experimentum illud brevem mihi exhibuit vorticis turbinei *ascendentis* imaginem. Si corpus electricum quod vasi aqua pleno fuit objectum, ex particulis inter se mobilibus constitisset, procul dubio turbinei *descendentis* imaginem habuisset.

Præterea si attendamus ad circumstantias quæ illud experimentum comitantur, eas deprehendemus cum iis omnino consentire, quæ vorticibus turbineis sæpius adjunctæ sunt. 1. Enim aqua instar colliculi manet suspensa, donec exsilierit scintilla, tuncque relabitur. Ita sæpe contingit ut turbines fulgura emittant, & tonitruum fragorem edant, quæ omnia inter effectus electricos hodie numerantur; deinde dissipari solent turbines. 2. Levis fremitus qui in nostro experimento auditur, dum aqua manet suspensa, ex rivulorum materię effluentis & affluentis eruptione & collisu oritur; idem in vorticibus turbineis accidit, sed cum violentia quæ phænomeni illius magnitudini respondeat. Hinc prodeunt insanæ procellæ (*les ouragans*) & fragor huic similis quem edunt maris vehementer æstuantis fluctus. 3. In eodem experimento, prope superficiem aquæ vasculi, ubi materia affluens sat velocitatis habet ac densitatis, aqua ibi sustinetur in modum columellæ; alibi vero radii, utpote rariores, secum abripere non possunt, nisi particulas aquæ insensibiles, quæ in circumjecta  
loca

loca disperguntur, & quarum pars tubo adhæret: pariter in turbinibus, ubicumque materia effluens vel affluens aptam habet velocitatem & densitatem, vapores aqueos satis sibi invicem conjunctos retinet, ut eam columnam efficiant, in qua situs est vortex turbineus; alibi illius materię radii, utpote rariores facti, secum auferre, vel sustinere non possunt nisi vapores tenuissimos, ex quibus nascitur illa fumi opaci species, quę circa turbines sæpe observatur. Si vapores aquei ex quibus constat columna, satis fuerint densati, ut in guttas coeant; ubi sustineri cessant, tunc decidunt per modum vel pluvię, vel etiam grandinis, si frigore congelati fuerint; alioqui non efficiunt nisi quamdam nubis speciem, quam ventus abripit vel dissipat. Quas ob causas hujusmodi meteora aliquando sine pluvia desinunt, interdum vero imbrem effundunt copiosissimum.

Denique cur turbines coni inversi figuram sæpe induant, feliciter etiam explicari potest: constat enim materię electricę radios e corpore electrico effluentes, a se invicem esse disjunctos (*divergens*). Certum est etiam eosdem radios, ubi ad corpus minime electricum accedunt, a via sua deflectere, cursum suum versus illud corpus dirigere, & fieri *convergentes*, ad focumque communem tendere. Idem accidit materię effluentis radiis, e nube electrica erumpantibus, quę in apta e corporibus terrestribus minime electricis distantia constituitur; vaporum igitur particulę ab ea materia abreptę, hujus directioni sese accommodare debent; inde vero sequitur coni inversi forma, cujus apex ad corpora terrestria, basis autem ad nubem spectet.

Ex iis quę huc usque diximus facile est intelligere vortices turbineos. (*les trombes*). variasque eorum circumstantias, ab una eademque causa; nimirum ab electricitate, prodire. Ita D. Briffon.

## De Nive.

Nix congeries flocculorum est, qui florum instar alii aliis adhærescunt. Scilicet dum aquæ tenues guttæ e nubibus cadunt, quandoque incidunt in aerem frigidum, quo inter descendendum congelantur. Aer autem ille frigidus quem trajiciunt, simul densior est, ac proinde earum motum retardat; a guttulis igitur sequentibus attinguntur, quæ ipsis sese adjunctes in glaciem pariter concrescunt. Sic formantur illi flocculi qui nivis nomine donantur. Sæpe evenit ut in montium radice pluvia decidat, dum in vertice nix delabitur. Aer scilicet qui montium cacumini imminet, multo frigidior esse potest quam aer valibus incumbens; aquæ igitur guttæ, quæ aerem superiorem trajiciunt, congelari possunt, deinde in aerem inferiorem & magis calidum delapsæ, in aquam resolvuntur.

Quæres I. utrum, sæviente gelu, nix decidat, an aliquando cum tonitru conjuncta sit.

Resp. Ea est opinio popularis, scilicet minime ningere, dum sævit gelu. Sed error ille plurimorum & maxime D. Musschenbroek, observationibus refellitur. Testatur enim se nivem decidentem non semel vidisse, dum asperissimum esset gelu; imo etiam cum augeretur. Quamvis nive delabente, frigus remittere soleat, observavit idem Physicus contrarium aliquando contingere, postque delapsam nivem gelu interdum magis invaluisse.

Inter populares etiam fabulas rejiciendum est quod vulgo creditur, nivem nunquam esse cum tonitru conjunctam. Verum quidem est per hiemem cadere nivem, quo tempore rarum est audiri tonitruum; sed nihilominus constat utrumque interdum simul observari. Prima die januarii anni 1715., fulguravit & intonuit in urbe Montepessulano, dum ningeret. Superiori

ſæculo, Silvanecti (*Senlis*) Catalauni (*Châlons-sur-Marne*) in vicinisque urbibus, violentiſſima ſæviit procella in mediâ hieme; plurima in loca ruit fulmen, quo tempore ingens nivis copia decidebat.

Quæres 2. quænam ſit aliquando delapſæ nivis copia.

Reſp. Quibuſdam in locis incredibilis decidit nivium copia. In Diario quod inſcribitur *Journal des Savans*, narratur in Ferri inſula eam aliquando cadere nivis quantitatem, quæ vervecès qui in pascuis verſantur ita per unius menſis ſpatium cooperiat, ut ſub aſpectum non veniant, neque detegantur niſi ope denſi vaporis qui inde in auras ſeſe attollit. Anno 1729. in Sueciæ & Norvegiæ conſiniis tantum cecidit nivis, ut domos prope vicum dictum *Villaras* ſtatim obduxerit, & perierint quotquot in eas ſeſe receperant. Idem factum in Sileſia & Bohemia contigiſſe refert D. *Wolf*. Anno 1741. in novum Eboracum Americæ (*Nouvelle York de l'Amérique*), irruit tam ſtupenda nivis copia, ut terram ad 16. pedum altitudinem cooperuerit.

Quæres 3. quid mali interdum aſſerant nives e montibus ſeſe devolventes.

Reſp. Ex altiffimis montibus nive obſitis, aliquando parva primum quantitas delapſa excidit, quæ dum per declivia volvitur, in tantam molem excreſcit, ut monti ſimilis videatur. Domos in vallibus ſubjectas prorſus ſubruit. Immanes illæ nivium maffæ interdum in fluvios ſeſe dant præcipites, eorum curſum impediunt, ſicque horrendis inundationibus præbent occaſionem.

Poſtquam aliquandiu ſupra terram nix commorata eſt, ſuperficiem ipſius inferiorem liqueſciunt exhalationes e terra prodeuntes; reliqua vero illius moles veluti ſuſpenſa eſt, nec ſuſtinetur niſi implexis dumorum ramis, vel nonnullis rupium apicibus. Quamobrem vel brevioris

vioris sclopeti emissio (*un coup de pistolet*) aerem satis commovet, ut pendulam hanc nivium massam decutiat, a montiumque jugis agat præcipitem. Id mali ut effugiant qui per Alpes iter faciunt, exeunte præsertim hieme, feno implenda curant jumentorum tintinnabula; imo etiam ab omni sermone abstinere, dum incedunt per calles abruptos, quibus eminent immensæ nivium congeries, in lapsum proclives, ne scilicet periculosum in aere motum excitent. Quando sese offerunt viæ angustæ, in quibus plurimum est discriminis, priusquam eas ingrediantur, breviorum sclopetum displodunt (*il tirent un coup de pistolet*) ut aeris commotio nivis jamjam ruituræ lapsum acceleret.

Quæres 4. cur lacteo candore nix tincta videatur.

Resp. Id oritur ex eo quod ejus partes ita comparatæ sint, ut omnes luminis radios reflectant. Hinc oculorum aciem sæpe offendit. Xenophon refert, postquam Cyri exercitus multis diebus per montes nive candidos iter fecisset, plurimos milites oculorum morbo laborasse, & nonnullos visum prorsus amisisse. Narrat *Olaus Magnus* in plagis septentrionalibus, dum luna resulget, illiusque lumen a nive reflectitur, visitoribus sat lucis supetere, ut iter sine errore prosequantur, & satis e longinquo urfos feras detegant, a quibus præcavere debent.

Quæres 5. quænam sit nivis utilitas.

Resp. Multiplex est nivis utilitas. 1. A gelu defendit herbas, arborum gemmas quæ per autumnum natæ sunt; pariter servat plurimarum radices plantarum, bulbos (*les oignons*) & omnia generatim semina quæ adventante hieme, terræ commissa fuerunt, & germinare incipiunt. Aqua etiam in quam nix resolvitur in terram illapsa eam non parum fecundat, secum alienas particulas deferendo, ad eum effectum idoneas.

Experientia constat plantas in montium cacumini.



minibus, per anni dimidium nive coopertis, crescentes, esse vegetiores & magis sese explicare, quam eas quæ in locis depressioribus nascuntur. Nivis beneficio Helvetiæ (*les-Suisses*) ea debent pingua pascua, quorum succis copiosis nutriuntur pecora, in quibus præsertim sitæ sunt incolarum divitiæ. In *Canada*, statim atque solutæ sunt nives, terra herbis virentibus, arbores foliis & floribus sese vestiunt, semina incredibili quadam celeritate ex humo surgunt, quando subter nivem solum non fuit congelatum.

2. Nives calore liquefactæ, plurimas fontibus, rivis & fluminibus aquas subministrant, quæ sæpe adeo copiosæ sunt, ut inde nascantur exundationes: generatim quippe observatur in Europa rivus mensibus aprili & maio intumescere, ob nivium resolutionem quæ fit in altis montibus, unde ingens devolvitur aquarum copia.

3. Obstant ne dispergantur exhalationes quæ e terræ sinu sursum avolarent, nisi hujus superficiem nix contegeret. Non solum eas exhalationes retinet; sed præterea impedit ne dissipetur calor qui in inferiori globo residet, prohibendo scilicet ne altius tertam gelu subeat.

4. Irlandiæ incolæ nivem adhibent, ut suos pisces, suasque carnes a corruptione defendant. Ea scilicet nutrimenta subter nivem recondunt, ubi perinde ac in muria (*dans la saumure*) servantur integra. Qua de re videas *Diarium Doctorum* (*Journal des Savans* ad ann. 1675.)

#### De grandine

Quemadmodum nix, ita & grando suum ortum habet ex pluviz guttis, quæ congelatæ in globulos concrescunt, quorum non eadem semper est moles. Qui in parte nubis inferiore formantur, iis sunt minores, qui ex parte superiori decidunt. Illi enim posteriores totam nubem trajiciendo aliis aquæ guttis sese adiungunt, quæ in glaciem convertæ, earum molem amplificant.

Imo

Imo interdum contingit, ut grandinis massa, ovo gallinaceo sit magnitudine æqualis. Illud autem præcipue evenit, tempestate imminente, ubi tonitrua reboant. Tunc enim vehementes excitantur venti, qui nubem vi maxima comprimantes, eam condensant, & in aquæ guttas majusculas convertunt. Deinde guttæ illæ crassiores in aerem decidunt partibus foetum nitrosis & sulphureis, a quibus subito congelantur. Hinc grando tantæ est molis. Quandoquidem ubi scyphus aqua plenus immittitur in nivem aut glaciem contritam, cum sale marino vel ammoniaco permistam, aqua statim congelatur; hinc pronum est colligere spiritus salinos cum aere commistos, ad grandinem efficiendam plurimum conferre.

Sæpe in grandinis centro reperitur quædam nuclei (*noyau*) species, qui opacus est ac candidus, crustaque molliori & pellucida circumdatus. Nucleus ille primum in superiori regionis glacialis parte formatus fuit; deinde inter descendendum incidit in aquæ guttas quæ ipsi adhæserunt, & congelatæ sunt; cum vero in regione geris inferiori minus frigeret, hæc glacies adventitiæ ipso nucleo mollior est, magisque translucida. Fieri etiam potuit ut crusta nucleum ambiens formata fuerit glacie, quæ liquefieri incepisset, dum nucleus totam duritiem suam retinuit.

Quæres utrum noctu & per hiemem aliquando grandinet.

Resp. Insignes quidam Physici, & ipse *Hamberger*, quamvis suis in observationibus plerumque accuratissimus, contendunt nunquam per noctem grandinare. Quo in capite allucinati sunt. Rarum quidem est noctu, sicut & per hiemem, cadere grandinem; sed tamen utrumque aliquando contingere, ex testimoniis fide dignissimis constat. Refert, v. g. *Deratio*, sub ipsius oculis, die 30. mensis januarii an. 1741., hora nona vespertina cecidisse grandinem, & quidem  
ita

ia copiose, ut vix intra semihoram in vicis  
rues) & supra tecta, ad multorum pollicum  
litudinem accumulata fuerit. Quæ supra ædium  
sta erat congesta, non resoluta est, nisi post 24.  
oras. In Montepessulano, ubi factum accidit,  
emo erat qui miminisset, in ulla anni tempestate  
sa son) tantum grandinasse. Dum rueret grando,  
perpetuus fuit tonitruī fragor, ut æstivis in pro-  
cellis contingere solet.

## ARTICULUS II.

### *De Meteoris volatilibus.*

**M**Eteora volatilia appellantur venti qui huc  
& illuc quasi volitant. Ventus porro est aer  
agitatus, sive aeris ab una atmosphæræ parte in  
aliam translatio.

Quæres 1. quænam sint præcipuæ ventorum  
species.

Resp. Alii sunt generales, qui simul ad plures  
regiones pertinent; alii particulares, qui nonnul-  
lis duntaxat in locis obtinent; alii periodici, qui  
certis flant anni tempestatibus. Innumeri denique  
sunt venti, quia nullum est horizontis punctum,  
ex quo non spiraret ventus aliquis: attamen 32.  
tantum distinguere solent navigatores, ex quibus  
octo sunt præcipui. Quatuor ideo dicuntur *cardi-  
nales*, quod e quatuor horizontis punctis *cardina-  
libus* spirant, nempe boreas, sive septentrionalis  
(*le Nord*); auster, seu meridionalis (*le Sud*);  
eurus, sive orientalis (*l'Est*); favonius, sive  
occidentalis (*l'Ouest*.)

Quatuor alii mediam inter ventos cardinales  
sedem occupant, ideoque appellantur *collatera-  
les*. Illorum unusquisque nomen habet ex iis  
compositum vocibus, quibus designantur venti,  
inter quos medius est. Qui interponitur borea-  
lem inter & orientalem, dicitur *nord-est*. Qui  
inter borealem & occidentalem spirat, nuncupa-  
tur *nord-ouest*, qui austrum inter & ventum orien-  
talem

talem interjacet, vocatur *sud-est*; tandem qui inter austrum & ventum occidentalem medius est, appellatur *sud-ouest*.

Quæres 2. quænam sint ventorum causæ physicae.

Resp. Variz sunt ea de re conjecturæ, quarum verisimiliores exponemus: prima ventorum causa est solis calor. Quando enim radii solares notabilem atmosphæræ partem calefaciunt, eam simul dilatant; aer autem dilatatus majus sibi vindicat spatium; aerem igitur vicinum violenter repellit; quod fieri non potest quin ea excitetur agitatio, in qua fitus est ventus. Hinc explicari potest cur æstate mane spirare solet ventus orientalis: aer scilicet oriente sole calefactus sese expandit; dum autem sese explicat, aerem sibi proximum versus occidentem repellit. Propter rationem oppositam, sole occidente, ventum ex parte occidentali flantem sæpe experimur.

Secunda causa est aeris vis elastica, quæ in eo longe vegetior est, quam in plerisque aliis corporibus. Dum scilicet aer in aliqua terræ parte, v. g. boreali, sese dilatat, comprimit aerem in parte meridionali constitutum; aer iste compressus suam vim elasticam exerit, ut priorem in statum sese restituat; sic autem sese restituendo, aerem anteriorem in partem oppositam repellit, sicque alicui vento præbet occasionem.

Tertia causa est nubium descensus. Quando enim nubes in superiori atmosphæræ regione penilis, pari aeris volumine fit gravior, quid iode accidit? nubes motu accelerato delabitur, versus terram magno impetu decedit, aerem subiectum violenter exagitat. Hinc horrendæ in mari tempestates; hinc luctuosa in terris perniciës nascitur.

Quarta causa sunt varii sales in antris & cavernis permixti, qui secum invicem fermentescentes, aerem internum vehementer rarefaciunt. *Iste* vero, qua data porta, inde vix subita erumpens,

pens, aerem externum ad magnam usque distantiam aliquando propulsat; cuius rei plurima refert exempla D. Musschenbroek. Sic asserit Connor Philosophus Hybernus se accepisse a fossoribus, qui nonnullis Germaniæ sodinis operam dant, inde aliquando ventos proflire adeo vehementes, ut eos humi posternant, & casulas in ipsis sodinis exstructas evertant.

Quinta causa sunt diversi generis vapores & halitus, qui in atmosphæra commissi, simul fermentescunt, sese dilatant, & tandem erumpunt, multiplicique commotione aerem concutiant & agitant. Idcirco semper aliquis excitator ventus, cum tonat & fulgurat. Hinc explicat D. Musschenbroek, cur venti non tenore continuo, sed per temporis intervalla, nunc majora, nunc minora, spirare soleant. Modo enim major, modo minor exhalationum copia in aere permiscetur; & postquam facta est una coitio, aliquid temporis effluit, priusquam conflatur altera. Idcirco nunc magis, nunc minus vehementer fiat ventus: interdum subito remittit, & paulo post majori cum impetu firidebit.

Quæres 3. cur ventus meridionalis sit calidus, septentrionalis frigidus, orientalis siccus, occidentalis humidus.

Resp. Ventus meridionalis est calidus, quia e regionibus ejusdem nominis advenit, ubi aer radiis solaribus, maxime est calefactus. Septentrionalis est frigidus, quia e plagis glacialibus plurimas salis & nitri particulas secum asportat. Orientalis est siccus, quia spirat ab Asia in Europam, nec ingentem offendit aquarum copiam: pauca enim sunt maria in locis e quibus ad nos pervenit. Denique ventus occidentalis est humidus, quia multis vaporibus e mari sublatis onustus in regiones nostras devenit. In locis enim quæ percurrit ingentes sunt maris tractus.

Quæres 4. quænam sit ventorum utilitas?

Resp. Variæ sunt ventorum utilitates. 1. Purgant.

gando aeri in cujus ambitu vivimus, inserviunt. Eum quippe inficiunt exhalationes e corporibus nostris avolantes, unde valetudini non parum nocet. Sed exhalationes illas secum rapit ventus, novumque aera puriorem & magis salubrem advehit. Non semel observatum fuit, post longam aeris desidentis tranquillitatem, intervenire morbos contagiosos, febres perniciosas, ipsamque aliquando pestem.

2. Nimum aeris calorem temperant venti, sine quorum subsidio inhabitabiles prorsus fierent nonnullæ regiones, propter immodicos quibus obnoxiae sunt calores. In India enim, sive orientali, sive occidentali, multa sunt loca quæ diurno solis fervore adusta sunt. Sed labente die, spirat e regione maris ventus frigidulus, qui homines, jumenta & plantas recreat, simulque terram calentem & rivis refrigerat.

3. Nubes, præsertim e mari sublatae, a ventis circumquaque transferuntur, ut in pluvias resolutæ, terram, & quas enutrit plantas, humectent. Plurimum etiam ad vegetalium incrementa conferunt diversæ exhalationes, quæ a ventis ab una regione in aliam delatae, quoquoersum disperguntur.

4. Venti aquas Oceani, lacuum & stagnorum variis exagitant motibus, sicque obstant ne torpescendo corrumpantur, & pravis exhalationibus aerem inficiant.

5. Ars naturæ æmula nostros in usus ventorum flamina convertit. Inde vero quanta derivantur commoda! quam longe lateque excrevit commercium! enim vero angustissimos intra fines coerceretur navigatio, si naves remis duntaxat impellerentur. A longis itineribus prorsus abstinendum esset, tum propter nimiam tarditatem, tum propter ingentiores impensas. Famulanribus autem ventis, nautæ numero pauci, vel exercitum, vel immanes mercium moles, ab uno Oceani extremo ad aliud facile transferunt.

Quanta utilitatis sunt molæ vento versatiles  
ad

ad conterendum frumentum, ad extrahendum e variis seminibus oleum, ad densandos pannos (*pour fouler les draps*) ad defecanda ligna, &c. Quantus hominum vel equorum numerus adhibendus esset, ad efficiendam farinam, quæ diversis in locis auxiliante vento, paratur.

## ARTICULUS III.

*De Meteoris ignitis & lucidis.*

**D**E Meteoris ignitis nihil certo exploratum habere Physicos, etiam recentiores, sic ingenue fatetur naturæ sapientissimus interpres D. Nollet: *Nous n'avons sur les météores enflammés, que des conjectures; encore est-il plus facile de les attaquer par des objections sérieuses, que de les défendre par des raisons satisfaisantes en tout point; conjectures sur la vraie matiere de ces feux; conjectures sur la cause de leur inflammation; conjectures sur la manière dont ils operent les effets, qu'on est comme forcé de leur attribuer; incertitude par tout.* (Tom. 4. pag. 296.)

Verisimile tamen est materiam quam ad procreandos illos effectus adhibet natura, sitam esse in exhalationibus, quæ a terra, in atmosphæram evahuntur. Id enim concludere pronum est, ex eo quod frequentiores & majores, sint illi ignes in locis, eaque anni tempestate, quibus copiosiores sunt, exhalationes ad inflammationem idoneæ. In regionibus quippe calidis, & præsertim in iis ubi solum est magis bituminosum aut sulphureum, sæpius conspiciuntur ignita hæc phænomena.

Diæuri sumus 1. de tonitru; 2. de globis ignitis; 3. de stellis cadentibus & ignibus fatuis; 4. de halonibus, pareliis & paraselenis; 5. de i-side; 6. de aurora boreali.

## PARAGRAPHUS I.

## De Tonitru.

**I**N tonitru tria distinguenda, nempe fulgur, fragor & fulmen. Repentina luminis coruscatio, quæ ex rupta nube erumpens, oculos subito perfiringit, simul & evanescit, nomen habet *fulguris*. Sonus horridus qui post fulgurationem audiri solet, dicitur *fragor*: ignis vividissimus, qui sæpe cum ingenti strage ad terram usque vi subita desilit, vocatur *fulmen*.

Hæc diu communis fuit, quam nonnulli etiamnum defendunt, opinio, tonitruum illiusque phænomena, non aliunde generari quam diversis vaporibus & halitibus, qui in atmosphæram sublatis, simul commiscentur, fermentescunt, indeoque inflammantur. Si enim, inquiunt, simul permisceantur aqua, ferri limatura, sulphur, & massa inde coalescens terræ infodiatur, experientia constat molem hanc radiis solaribus calefactam ita fermentescere, ut post aliquot horas, humum sibi impositam attollat, eaque disrupta, flammam identidem emittat, tandemque cum ingenti strepitu erumpat. Quis autem negaverit ex corporibus passim avolare, & sursum evehi varii generis exhalationes, nitrosas, bitumineas, sulphureas, &c., easque in nube permixtas fermentescere? ex hujusmodi ergo nube, inquiunt, exire debent fulgura & fulmina, nec sine ingenti fragore, qui diversorum corporum occursum re-percussus, multoties iterabitur.

Recentiores autem Physici in eo fere omnes consentiunt, quod mirabiles tonitruum effectus materia electrica, tanquam causa præcipua, adscribi debeant, & tonitruum spectant velut immensam quandam electricitatem. Minime tamen negant alias causas in eo phænomeno suas habere partes, inter quas numerantur exhalationes



nes sulphuræ, bituminosæ & aliæ ejusmodi. Quæ enim regiones his plurimum abundant, ut Sicilia, Italia, ex tonitruis sunt magis obnoxia. Præterea constanter observatur loca fulmine tacta, gravem sulphuris & bituminis odorem spirare. Hinc putant hodierni Physici materiam electricam in tonitruo principem quidem locum obtinere; sed eam in vehementiores effectus erumpere, cum substantiis ad inflammationem paratissimis sociatur, quas in atmosphæra collectas reperit.

Dux erunt hujus paragraphi sectiones; in priori exponemus quo pacto nubes fieri possit electrica, & quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus analogia intercedat; in posteriori vero expendemus quænam loca fulmini plus minusve sint obnoxia, & quæ adversus illius ictum adhibendæ sint cautiones.

## SECTIO I.

*De modo quo nubes fieri potest electrica, & de analogia quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus intercedit.*

**C**orpora duplici modo fieri possunt electrica, quædam scilicet ex affricu, quædam ex communicatione. Quæ priori modo evaserunt electrica, vim eandem in alia transmittunt corpora, quæ huic suscipiendæ idonea sunt, nec longius distant. Aer autem ex illorum corporum numero videtur esse, quæ juvante frictione vim electricam concipiunt. Cum vero temporibus procellosis, aeris rivuli in partes contrarias ferantur, maxime verisimile est eos ex affricu mutuo fieri electricos, & deinde vim suam electricam obviis nubibus communicare. Præterea variæ exhalationes ad inflammationem expeditæ, in atmosphæram coeuntes, aliæ in alias a ventis oppositis impelluntur, sese mutuo collidunt, & sibi invicem affricant; inde vero

fieri possunt electricæ. Alterutro vel utroque modo in nube tonitruum deferente, excitari potest virtus electrica; nubes igitur procellosa spectari potest tanquam ingentissimus conductor, immensa fluidi electrici copia prægnans.

Nunc exponendum est quanta inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus intersit consensio.

1. Supra ædificii cujusdam altissimi tectum constituitur fulcrum resinaceum aut vitreum, in quo virga ferrea ad perpendicularum erigatur; experientia constat, si nubes fulmen in sinu suo deferens, huic virgæ immineat, ex illa scintillas exilire, eodem prorsus modo, ac si funiculis ferreis suspensa, cum electricæ machinæ globo communicaret.

Cui experimento nunc omnibus familiari affinia sunt nonnulla facta, quæ ita referuntur in historia Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis, ad annum 1764; pag. 2. : *César rapporte dans ses Commentaires, que pendant la guerre d'Afrique, après un orage affreux arrivé pendant la nuit, & qui mit en grand désordre toute l'armée Romaine, la pointe des dards de la cinquième légion brilla d'une lumière spontanée; quintæ legionis pilorum cacumina sua sponte arserunt. Au Château de Duino, situé dans le Frioul au bord de la mer Adriatique, il y a, de temps immémorial, sur un des bastions de la place, une pique plantée verticalement la pointe en haut. Quand le temps menace d'orage, la sentinelle qui monte la garde à cet endroit, présente au fer de cette pique celui d'une ballabarde qu'on laisse toujours là pour cette épreuve; & si le fer de la pique étincelle beaucoup à l'approche de celui de la ballabarde, ou qu'il jette par sa pointe une petite gerbe lumineuse, alors il sonne une cloche qui est auprès, pour avertir les gens de la campagne & les pêcheurs qu'ils sont menacés d'orage, & sur cet avis, tout le monde rentre.*

Hujus.

Hujusmodi phœnomenum hūc prorsus simile est, quod procreare solet electricitas globo perfricato excitata.

2. Ubi corpus minime electricum ad *conductorem* electricum admovetur, utrinque sese prodit crista quædam lucida; quo propius ad sese accedunt duo hæc corpora, eo magis in unam coeunt ambæ cristulæ, & tandem vividissimam in scintillam cum aliquo crepitu erumpunt; pariter quando nubes electrica aliam offendit minime electricam, ex utraque parte fluunt materiæ electricæ rivuli, qui in sese invicem incurrentes colliduntur; ex eo conflictu exilit ignis ille splendidus qui dicitur *fulgur*, neque ab ipso fulmine, nisi gradu impetus, discrepat. Aerem contiguum subito repellit fulguris eruptio; aer iste vicinum comprimit; qui sua vi elastica sese in priorem statum restituendo, fragorem excitat, quem boantem & reboantem audimus. Sonus ille intra nubium viscera quasi discurrere videtur, quia sæpe reflectitur vel a diversis nubium partibus, vel a variis montibus & cautibus.

3. Fulgur per sinuosos anfractus huc illuc discurret; quod phœnomenum ex variis pendet substantiis, quæ fulguri aera trajicienti obviæ sunt. Cum enim aliæ sint magis quam aliæ idoneum materiæ electricæ vehiculum, hæc sequitur corpora quæ ad eum effectum aptiora sunt. Hujus igitur luminis motus tam inæqualis & flexuosus esse debet, quam ipsa illorum corporum in aere fluctuantium dispositio. Idem observatur phœnomenum, quando e *conductore* materia electrica egregie imbuto elicitur scintilla, quæ ad certam propagetur distantiam. Tunc illam videas sinuosis flexibus ad corpus tendere quod ipsi objicitur.

4. Quædam corpora educendis e virga electrica scintillis aptiora sunt, quam alia. Sic corpus metallicum scintillas vegetiores & majori in distantia elicit, quam instrumentum ligneum. Pari-  
ter nonnulla sunt corpora fulmini provocando ma-

minam quam versus nubem sese attollere interdum videmus, & cui verticis *ascendentis* nomen dari potest.

Huic opinioni mire sese accomodat experientia: Aqua implevi, pergit idem Physicus, vasculum (*un dé à coudre.*) Ad ipsum admovimus tubum recens perfricatum; illico vasis aqua instar colliculi (*monticule*) sese extulit, donec inde scintillula eruperit. Tunc in vasculum recedit. Dum aqua sic erat suspensa, levis quidam fremitus audiebatur, & paries tubi qui vasi obversus erat, tenuibus aquæ particulis fuit omnino coopertus. Experimentum illud brevem mihi exhibuit vorticis turbinei ascendentis imaginem. Si corpus electricum quod vasi aqua pleno fuit objectum, ex particulis inter se mobilibus constitisset, procul dubio turbinei descendentis imaginem habuissem.

Præterea si attendamus ad circumstantias quæ istud experimentum comitantur, eas deprehendemus cum iis omnino consentire, quæ vorticibus turbineis sæpius adjunctæ sunt. 1. Enim aqua instar colliculi manet suspensa, donec exsilerit scintilla, tuncque relabitur. Ita sæpe contingit ut turbines fulgura emittant, & tonitruum fragorem edant, quæ omnia inter effectus electricos hodie numerantur; deinde dissipari solent turbines. 2. Levis fremitus qui in nostro experimento auditur, dum aqua manet suspensa, ex rivalorum materię effluentis & affluentis eruptione & collisione oritur; idem in vorticibus turbineis accidit, sed cum violentia quæ phænomeni illius magnitudini respondeat. Hinc prodeunt insanæ procellæ (*les ouragans*) & fragor huic similis quem edunt maris vehementer æstuantis fluctus. 3. In eodem experimento, prope superficiem aquæ vasculi, ubi materia affluens sat velocitatis habet ac densitatis, aqua ibi sustinetur in modum columellæ; alibi vero radii, ætate rariores, secum abripere non possunt, nisi particulas aquæ insensibiles, quæ in circumjecta  
loca

loca disperguntur, & quarum pars tubo adhæret: pariter in turbinibus, ubicumque materia effluens vel affluens aptam habet velocitatem & densitatem, vapores aqueos satis sibi invicem conjunctos retinet, ut eam columnam efficiant, in qua situs est vortex turbineus; alibi illius materie radii, utpote rariores facti, secum auferre, vel sustinere non possunt nisi vapores tenuissimos, ex quibus nascitur illa fumi opaci species, quæ circa turbines sæpe observatur. Si vapores aquei ex quibus constat columna, satis fuerint densati, ut in guttas coeant; ubi sustineri cessant, tunc decidunt per modum vel pluvie, vel etiam grandinis, si frigore congelati fuerint; alioqui non efficiunt nisi quamdam nubis speciem, quam ventus abripit vel dissipat. Quas ob causas hujusmodi meteora aliquando sine pluvia desinunt, interdum vero imbrem effundunt copiosissimum.

Denique cur turbines coni inversi figuram sæpe induant, feliciter etiam explicari potest: constat enim materie electricæ radios e corpore electrico effluentes, a se invicem esse disjunctos (*divergens*). Certum est etiam eosdem radios, ubi ad corpus minime electricum accedunt, a via sua deflectere, cursum suum versus illud corpus dirigere, & fieri *convergentes*, ad focumque communem tendere. Idem accidit materie effluentis radiis, e nube electrica erumpentibus, quæ in apta e corporibus terrestribus minime electricis distantia constituitur; vaporum igitur particularum ab ea materia abreptæ, hujus directioni sese accommodare debent; inde vero sequitur coni inversi forma, cujus apex ad corpora terrestria, basis autem ad nubem spectet.

Ex iis quæ huc usque diximus facile est intelligere vortices turbineos (*les trombes*), variasque eorum circumstantias, ab una eademque causa; nimirum ab electricitate, prodire. Ita D. Briffon.

*De Nive.*

Nix congeries flocculorum est, qui filorum instar alii aliis adhærescunt. Scilicet dum aquæ tenues guttæ e nubibus cadunt, quandoque incidunt in aerem frigidum, quo inter descendendum congelantur. Aer autem ille frigidus quem trajiciunt, simul densior est, ac proinde earum motum retardat; a guttulis igitur sequentibus attinguntur, quæ ipsis sese adjucentes in glaciem pariter concrescunt. Sic formantur illi flocculi qui nivis nomine donantur. Sæpe evenit ut in montium radice pluvia decidat, dum in vertice nix delabitur. Aer scilicet qui montium cacumini imminet, multo frigidior, esse potest quam aer valibus incumbens; aquæ igitur guttæ, quæ aerem superiorem trajiciunt, congelari possunt, deinde in aerem inferiorem & magis calidum delapsæ, in aquam solventur.

Quæres I. utrum, sæviente gelu, nix decidat, an aliquando cum tonitru conjuncta sit.

Resp. Ea est opinio popularis, scilicet minime ningere, dum sævit gelu. Sed error ille plurimorum & maxime D. Musschenbroek, observationibus refellitur. Tellatur enim se nivem decidentem non semel vidisse, dum aspernimum esset gelu; imo etiam cum augetetur. Quamvis nive delabente, frigus remittere soleat, observavit idem Physicus contrarium aliquando contingere, postque delapsam nivem gelu interdum magis invaluisse.

Inter populares etiam fabulas rejiciendum est quod vulgo creditur, nivem nunquam esse cum tonitru conjunctam. Verum quidem est per hiemem cadere nivem, quo tempore rarum est audiri tonitruum; sed nihilominus constat utrumque interdum simul observari. Prima die Januarii anni 1715., fulguravit & intonuit in urbe Montepessulano, dum ningeret. Superiori

saeculo, Silvanecti (*Senlis*) Catalauni (*Châlons-sur-Marne*) in vicinisque urbibus, violentissima saeviit procella in media hieme; plurima in loca ruit fulmen, quo tempore ingens nivis copia decidebat.

Quæres 2. quænam sit aliquando delapsæ nivis copia.

Resp. Quibusdam in locis incredibilis decidit nivium copia. In Diario quod inscribitur *Journal des Savans*, narratur in Ferri insula eam aliquando cadere nivis quantitatem, quæ vervecès qui in pascuis versantur ita per unius mensis spatium cooperiat, ut sub aspectum non veniant, neque detegantur nisi ope densi vaporis qui inde in auras sese attollit. Anno 1729. in Sueciæ & Norvegiæ consolis tantum cecidit nivis, ut domos prope vicum dictum *Villaras* statim obduxerit, & perierint quotquot in eas sese receperant. Idem factum in Silesia & Bohemia contigisse refert D. *Wolf*. Anno 1741. in novum Eboracum Americæ (*Nouvelle York de l'Amérique*), irruit tam stupenda nivis copia, ut terram ad 16. pedum altitudinem cooperuerit.

Quæres 3. quid mali interdum afferant nives e montibus sese devolventes.

Resp. Ex altissimis montibus nive obstitis, aliquando parva primum quantitas delapsa excludit, quæ dum per declivia volvitur, in tantam molem excrescit, ut monti similis videatur. Domos in vallibus subjectas prorsus subruit. Immanes illæ nivium massæ interdum in fluvios sese dant præcipites, eorum cursum impediunt, sicque horrendis inundationibus præbent occasionem.

Postquam aliquandiu supra terram nix commorata est, superficiem ipsius inferiorem liquefaciunt exhalationes e terra prodeuntes; reliqua vero illius moles veluti suspensa est, nec sustinetur nisi implexis dumorum ramis, vel nonnullis ruptum apicibus. Quamobrem vel brevioris

vioris sclopeti emissio (*un coup de pistolet*) aerem satis commovet, ut pendulam hanc nivium massam decuriat, a montiumque jugis agat præcipitem. Id mali ut effugiant qui per Alpes iter faciunt, exeunte præsertim hieme, feno implenda curant jumentorum tintinnabula; imo etiam ab omni sermone abstinere, dum incedunt per calles abruptos, quibus eminent immensæ nivium congeries, in lapsum proclives, ne scilicet periculosum in aere motum excitent. Quando sese offerunt viæ angustæ, in quibus plurimum est discriminis, priusquam eas ingrediantur, breviorum sclopetum discludunt (*il firent un coup de pistolet*) ut aeris commotio nivis jamjam ruituræ lapsum acceleret.

Quæres 4. cur lacteo candore nix tincta videatur.

Resp. Id oritur ex eo quod ejus partes ita comparatæ sint, ut omnes luminis radios reflectant. Hinc oculorum aciem sæpe offendit. Xenophon refert, postquam Cyri exercitus multis diebus per montes nive candidos iter fecisset, plurimos milites oculorum morbo laborasse, & nonnullos visum prorsus amisisse. Narrat *Olaus Magnus* in plagis septentrionalibus, dum luna resalget, illiusque lumen a nive reflectitur, viatoribus sat lucis supetere, ut iter sine errore prosequantur, & satis e longinquo urfos feras detegant, a quibus præcavere debent.

Quæres 5. quænam sit nivis utilitas.

Resp. Multiplex est nivis utilitas. 1. A gelo defendit herbas, arborum gemmas quæ per autumnum natæ sunt; pariter servat plurimarum radices plantarum, bulbos (*les oignons*) & omnia generatim semina quæ adventante hieme, terræ commissa fuerant, & germinare incipiunt. Aqua etiam in quam nix resolvitur in terram illapsa eam non parum foecundat, secum alienas particulas deferendo, ad eum effectum idoneas.

Experientia constat plantas in montium cacumini.



minibus, per anni dimidium nive coopertis, crescentes, esse vegetiores & magis sese explicare, quam eas quæ in locis depressioribus nascuntur. Nivis beneficio Helvetiæ (*les Suisses*) ea debent pingua pascua, quorum succis copiosis nutriuntur pecora, in quibus præsertim sitæ sunt incolarum divitiæ. In *Canada*, statim atque solutæ sunt nives, terra herbis virentibus, arbores foliis & floribus sese vestiunt, semina incredibili quadam celeritate ex humo surgunt, quando subter nivem solum non fuit congelatum.

2. Nives calore liquefactæ, plurimas fontibus, rivis & fluminibus aquas subministrant, quæ sæpe adeo copiosæ sunt, ut inde nascantur exundationes: generatim quippe observatur in Europa rivus mensibus aprilis & maio intumescere, ob nivium resolutionem quæ fit in altis montibus, unde ingens devolvitur aquarum copia.

3. Obstant ne dispergantur exhalationes quæ e terræ sinu sursum avolarent, nisi hujus superficiem nix contegeret. Non solum eas exhalationes retinet; sed præterea impedit ne dissipetur calor qui in inferiori globo residet, prohibendo scilicet ne altius terram gelu subeat.

4. Irlandiæ incolæ nivem adhibent, ut suos pisces, suasque carnes a corruptione defendant. Ea scilicet nutrimenta subter nivem recondunt, ubi perinde ac in muria (*dans la saumure*) servantur integra. Qua de re videas *Diarium Doctorum* (*Journal des Savans* ad ann. 1675.)

### *De grandine*

Quemadmodum nix, ita & grando suum ortum habet ex pluviae guttis, quæ congelatæ in globulos concrescunt, quorum non eadem semper est moles. Qui in parte nubis inferiore formantur, iis sunt minores, qui ex parte superiori decidunt. Illi enim posteriores totam nubem trajiciendo aliis aquæ guttis sese adjungunt, quæ in glaciem convertæ, earum molem amplificanti. Imo

Imo interdum contingit, ut grandinis massa; ovo gallinaceo sit magnitudine æqualis. Illud autem præcipue evenit, tempestate imminente, ubi tonitrua reboant. Tunc enim vehementes excitantur venti, qui nubem vi maxima comprimantes, eam condensant, & in aquæ guttas majusculas convertunt. Deinde guttæ illæ crassiores in aerem decidunt partibus sætum nitrosis & sulphureis, a quibus subito congelantur. Hinc grando tantæ est molis. Quandoquidem ubi scyphus aqua plenus immittitur in nivem aut glaciem contritam, cum sale marino vel ammoniaco permistam, aqua statim congelatur; hinc pronum est colligere spiritus salinos cum aere commistos, ad grandinem efficiendam plurimum conferre.

Sæpe in grandinis centro reperitur quædam nuclei (*noyau*) species, qui opacus est ac candidus, crustaque molliori & pellucida circumdatus. Nucleus ille primum in superiori regionis glacialis parte formatus fuit; deinde inter descendendum incidit in aquæ guttas quæ ipsi adhæserunt, & congelatæ sunt; cum vero in regione æris inferiori minus frigescat, hæc glacies adventitia ipso nucleo mollior est, magisque translucida. Fieri etiam potuit ut crusta nucleum ambiens formata fuerit glacie, quæ liquefieri incepisset, dum nucleus totam duritiem suam retinuit.

Quæres utrum noctu & per hiemem aliquando grandinet.

Resp. Insignes quidam Physici, & ipse *Hamberger*, quamvis suis in observationibus plerumque accuratissimis, contendunt nunquam per noctem grandinare. Quo in capite allucinati sunt. Rarum quidem est noctu, sicut & per hiemem, cadere grandinem; sed tamen utrumque aliquando contingere, ex testimoniis fide dignissimis constat. Refert, v. g. *Deratio*, sub ipsius oculis, die 30. mensis januarii an. 1741., horæ nona vespertina cecidisse grandinem, & quidem  
ita

copiose, ut vix intra semihoram in vicis  
(ruer) & supra tecta, ad multorum pollicum  
altitudinem accumulata fuerit. Quæ supra ædium  
tecta erat congesta, non resoluta est, nisi post 24.  
horas. In Montepessulano, ubi factum accidit,  
nemo erat qui miminuisset, in ulla anni tempestate  
(a'son) tantum grandinasse. Dum rueret grando,  
perperuus fuit tonitruï fragor, ut æstivis in pro-  
cellis contingere solet.

## ARTICULUS II.

*De Meteoris volatilibus.*

**M**eteora volatilia appellantur venti qui huc  
& illuc quasi volitant. Ventus porro est aer  
agritus, sive aeris ab una atmosphæræ parte in  
aliam translatio.

Quæres 1. quanam sint præcipuæ ventorum  
species.

Resp. Alii sunt generales, qui simul ad plures  
regiones pertinent; alii particulares, qui nonnul-  
lis duntaxat in locis obtinent; alii periodici, qui  
certis flant anni tempestatibus. Innumeri denique  
sunt venti, quia nullum est horizontis punctum,  
ex quo non spiraret ventus aliquis: attamen 32.  
tantum distinguere solent navigatores, ex quibus  
octo sunt præcipui. Quatuor ideo dicuntur *cardi-  
nales*, quod e quatuor horizontis punctis *cardina-  
libus* spirent, nempe boreas, sive septentrionalis  
(*le Nord*); ausler, seu meridionalis (*le Sud*);  
eurus, sive orientalis (*P Est*); favonius, sive  
occidentalis (*P Ouest*.)

Quatuor alii mediam inter ventos cardinales  
sedem occupant, ideoque appellantur *collatera-  
les*. Illorum unusquisque nomen habet ex iis  
compositum vocibus, quibus designantur venti,  
inter quos medius est. Qui interponitur borea-  
lem inter & orientalem, dicitur *nord-est*. Qui  
inter borealem & occidentalem spirat, nuncupa-  
tur *nord-ouest*, qui austrum inter & ventum orien-  
talem

talem interjacet, vocatur *sud-est*; tandem qui inter austrum & ventum occidentalem medius est, appellatur *sud-ouest*.

Quæres 2. quænam sint ventorum causæ physicae.

Resp. Variae sunt ea de re conjecturae, quarum verisimiliores exponemus: prima ventorum causa est solis calor. Quando enim radii solares notabilem atmosphære partem calefaciunt, eam simul dilatant; aer autem dilatatus majus sibi vindicat spatium; aerem igitur vicinum violenter repellit; quod fieri non potest quin ea excitetur agitatio, in qua situs est ventus. Hinc explicari potest cur æstate mane spirare soleat ventus orientalis: aer scilicet oriente sole calefactus sese expandit; dum autem sese explicat, aerem sibi proximum versus occidentem repellit. Propter rationem oppositam, sole occidente, ventum ex parte occidentali stantem sæpe experimur.

Secunda causa est aeris vis elastica, quæ in eo longe vegetior est, quam in plerisque aliis corporibus. Dum scilicet aer in aliqua terræ parte, v. g. boreali, sese dilatat, comprimit aerem in parte meridionali constitutum; aer iste compressus suam vim elasticam exerit, ut priorem in statum sese restituat; sic autem sese restituendo, aerem anteriorem in partem oppositam repellit, sicque alicui vento præbet occasionem.

Tertia causa est nubium descensus. Quando enim nubes in superiori atmosphære regione penilis, pari aeris volumine fit gravior, quid inde accidit? nubes motu accelerato delabitor, versus terram magno impetu decedit, aerem subiectum violenter exagitat. Hinc horrendæ in mari tempestates; hinc luctuosa in terris perniciës nascitur.

Quarta causa sunt varii sales in antris & cavernis permixti, qui secum invicem fermentescentes, aerem internum vehementer rarefaciunt. Ille vero, quæ data porta, inde vi subita erumpens,

pens, aerem externum ad magnam usque distantiam aliquando propulsat; cujus rei plurima refert exempla D. Musschenbroek. Sic asserit Connor Philosophus Hybernus se accepisse a fossoribus, qui nonnullis Germaniæ sodinis operam dant, inde aliquando ventos proflire adeo vehementes, ut eos humi posternant, & casulas in ipsis sodinis exstructas evertant.

Quinta causa sunt diversi generis vapores & balitus, qui in atmosphæra commissi, simul fermentescunt, sese dilatant, & tandem erumpunt, multiplicique commotione aerem concutiant & agitant. Idcirco semper aliquis excitator ventus, cum tonat & fulgurat. Hinc explicat D. Musschenbroek, cur venti non tenore continuo, sed per temporis intervalla, nunc majora, nunc minora, spirare soleant. Modo enim major, modo minor exhalationum copia in aere permiscetur; & postquam facta est una coitio, aliquid temporis effluit, priusquam constetur altera. Idcirco nunc magis, nunc minus vehementer fiat ventus: interdum subito remittit, & paulo post majori cum impetu stridit.

Quæres 3. cur ventus meridionalis sit calidus, septentrionalis frigidus, orientalis siccus, occidentalis humidus.

Resp. Ventus meridionalis est calidus, quia e regionibus ejusdem nominis advenit, ubi aer radiis solaribus, maxime est calefactus. Septentrionalis est frigidus, quia e plagis glacialibus plurimas salis & nitri particulas secum asportat. Orientalis est siccus, quia spirat ab Asia in Europam, nec ingentem offendit aquarum copiam: pauca enim sunt maria in locis e quibus ad nos pervenit. Denique ventus occidentalis est humidus, quia multis vaporibus e mari sublati onustus in regiones nostras devenit. In locis enim quæ percurrit ingentes sunt maris tractus.

Quæres 4. quænam sit ventorum utilitas?

Resp. Variæ sunt ventorum utilitates, r. Purgant.

gando aeri in cujus ambitu vivimus, interserviunt. Eum quippe inficiunt exhalationes e corporibus nostris avolantes, unde valetudini non parum nocet. Sed exhalationes illas secum rapit ventus, novumque aera puriorem & magis salubrem advehit. Non semel observatum fuit, post longam aeris defidentis tranquillitatem, intervenire morbos contagiosos, febres perniciosas, ipsamque aliquando pestem.

2. Nimum aeris calorem temperant venti, sine quorum subsidio inhabitabiles prorsus fierent nonnullæ regiones, propter immodicos quibus obnoxiae sunt calores. In India enim, sive orientali, sive occidentali, multa sunt loca quæ diurno solis fervore adusta sunt. Sed labente die, spirat e regione maris ventus frigidulus, qui homines, jumenta & plantas recreat, simulque terram calentem & rivos refrigerat.

3. Nubes, præsertim e mari sublatae, a ventis circumquaque transferuntur, ut in pluvias resolutæ, terram, & quas enutrit plantas, humectent. Plurimum etiam ad vegetalium incrementa conferunt diversæ exhalationes, quæ a ventis ab una regione in aliam delatae, quoquoersum disperguntur.

4. Venti aquas Oceani, lacuum & stagnorum varlis exagitant motibus, sicque obstant ne torpescendo corrumpantur, & pravis exhalationibus aerem inficiant.

5. Ars naturæ æmula nostros in usus ventorum flamina convertit. Inde vero quanta derivantur commoda! quam longe lateque excrevit commercium! enim vero angustissimos intra fines coerceretur navigatio, si naves remis duntaxat impellerentur. A longis itineribus prorsus abstinendum esset, tum propter nimiam tarditatem, tum propter ingentiores impensas. Famulantibus autem ventis, nautæ numero pauci, vel exercitum, vel immanes mercium moles, ab uno Oceani extremo ad aliud facile transferunt.

Quanta utilitatis sunt molæ vento versatiles  
ad

ad conterendum frumentum, ad extrahendum e variis seminibus oleum, ad densandos pannos (*pour fouler les draps*) ad desecanda ligna, &c. Quantus hominum vel equorum numerus adhibendus esset, ad efficiendam farinam, quæ diversis in locis auxiliante vento, paratur.

### ARTICULUS III.

#### *De Meteoris ignitis & lucidis.*

**D**E Meteoris ignitis nihil certo exploratum habere Physicos, etiam recentiores, sic ingenue fatetur naturæ sapientissimus interpres D. Nollet: *Nous n'avons sur les météores enflammés, que des conjectures; encore est-il plus facile de les attaquer par des objections sérieuses, que de les défendre par des raisons satisfaisantes en tout point; conjectures sur la vraie matière de ces feux; conjectures sur la cause de leur inflammation; conjectures sur la manière dont ils opèrent les effets, qu'on est comme forcé de leur attribuer; incertitude par tout.* (Tom. 4. pag. 296.)

Verisimile tamen est materiam quam ad procreandos illos effectus adhibet natura, sitam esse in exhalationibus, quæ a terra in atmosphæram evehuntur. Id enim concludere primum est, ex eo quod frequentiores & majores, sint illi ignes in locis, eaque anni tempestate, quibus copiosiores sunt, exhalationes ad inflammationem idoneæ. In regionibus quippe calidis, & præsertim in iis ubi solum est magis bituminosum aut sulphureum, sæpius conspiciuntur ignita hæc phænomena.

Dicturi sumus 1. de tonitru; 2. de globis ignitis; 3. de stellis cadentibus & ignibus fatuis; 4. de halonibus, pareliis & paraselenis; 5. de lide; 6. de aurora boreali.

## PARAGRAPHUS I.

## De Tonitru.

**I**N tonitru tria distinguenda, nempe fulgur, fragor & fulmen. Repentina luminis coruscatio, quæ ex rupta nube erumpens, oculos subito perstringit, simul & evanescit, nomen habet *fulguris*. Sonus horridus qui post fulgurationem audiri solet, dicitur *fragor*: ignis vividissimus, qui sæpe cum ingenti strage ad terram usque vi subita defilit, vocatur *fulmen*.

Hæc diu communis fuit, quam nonnulli etiamnum defendunt, opinio, tonitruum illiusque phænomena, non aliunde generari quam diversis vaporibus & halitibus, qui in atmosphæram sublatis, simul commiscentur, fermentescunt, indeoque inflammantur. Si enim, inquiunt, simul permisceantur aqua, ferri limatura, sulphur, & massa inde coalescens terræ infodiatur, experientia constat molem hanc radiis solaribus calefactam ita fermentescere, ut post aliquot horas, humum sibi impositam attollat, eaque disrupta, flammam identidem emittat, tandemque cum ingenti strepitu erumpat. Quis autem negaverit ex corporibus passim avolare, & sursum evehi varii generis exhalationes, nitrosas, bitumineas, sulphureas, &c., easque in nube permixtas fermentescere? ex hujusmodi ergo nube, inquiunt, exire debent fulgura & fulmina, nec sine ingenti fragore, qui diversorum corporum occursum percussus, multoties iterabitur.

Recentiores autem Physici in eo fere omnes consentiunt, quod mirabiles tonitruum effectus materiæ electricæ, tanquam causæ præcipuæ, adscribi debeant, & tonitruum spectant veluti immensam quandam electricitatem. Minime tamen negant alias causas in eo phænomeno suas habere partes, inter quas numerantur exhalationes



nes sulphuræ, bituminosæ & aliæ ejusmodi. Quæ enim regiones his plurimum abundant, ut Sicilia, Italia, ex tonitruis sunt magis obnoxia. Præterea constanter observatur loca fulmine tacta, gravem sulphuris & bituminis odorem spirare. Hinc putant hodierni Physici materiam electricam in tonitruo principem quidem locum obtinere; sed eam in vehementiores effectus erumpere, cum substantiis ad inflammationem paratissimis sociatur, quas in atmosphæra collectas reperit.

Dux erunt hujus paragraphi sectiones; in priori exponemus quo pacto nubes fieri possit electrica, & quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus analogia intercedat; in posteriori vero expendemus quænam loca fulmini plus minusve sint obnoxia, & quæ adversus illius idum adhibendæ sint cautiones.

## SECTION I.

*De modo quo nubes fieri potest electrica, & de analogia quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus intercedit.*

**C**ORPORA duplici modo fieri possunt electrica, quædam scilicet ex affricu, quædam ex communicatione. Quæ priori modo evaserunt electrica, vim eandem in alia transmittunt corpora, quæ huic suscipiendæ idonea sunt, nec longius distant. Aer autem ex illorum corporum numero videtur esse, quæ juvante frictione vim electricam concipiunt. Cum vero temporibus procellosis, aeris rivuli in partes contrarias ferantur, maxime verisimile est eos ex affricu mutuo fieri electricos, & deinde vim suam electricam obviis nubibus communicare. Præterea variæ exhalationes ad inflammationem expeditæ, in atmosphæram coeuntes, aliæ in alias a ventis oppositis impelluntur, sese mutuo collidunt, & sibi invicem affricant; inde vero

*De Nive.*

Nix congeries flocculorum est, qui filorum instar alii aliis adhærescunt. Scilicet dum aquæ tenues guttæ e nubibus cadunt, quandoque incidunt in aerem frigidum, quo inter descendendum congelantur. Aer autem ille frigidus quem trajiciunt, simul densior est, ac proinde earum motum retardat; a guttulis igitur sequentibus attinguntur, quæ ipsis sese adjungentes in glaciem pariter concresecunt. Sic formantur illi flocculi qui nivis nomine donantur. Sæpe evenit ut in montium radice pluvia decidat, dum in vertice nix delabitur. Aer scilicet qui montium cacumini imminet, multo frigidior esse potest quam aer valibus incumbens; aquæ igitur guttæ, quæ aerem superiorem trajiciunt, congelari possunt, deinde in aerem inferiorem & magis calidum delapsæ, in aquam resolvuntur.

Quæres I. utrum, sæviente gelu, nix decidat, an aliquando cum tonitru conjuncta sit.

Resp. Ea est opinio popularis, scilicet minime ningere, dum sævit gelu. Sed error ille plurimorum & maxime D. Musschenbroek, observationibus refellitur. Testatur enim se nivem decidentem non semel vidisse, dum aspernimum esset gelu; imo etiam cum augetur. Quamvis nive delabente, frigus remittere soleat, observavit idem Physicus contrarium aliquando contingere, postque delapsam nivem gelu interdum magis invaluisse.

Inter populares etiam fabulas rejiciendum est quod vulgo creditur, nivem nunquam esse cum tonitru conjunctam. Verum quidem est per hiemem cadere nivem, quo tempore rarum est audiri tonitruum; sed nihilominus constat utrumque interdum simul observari. Prima die januarii anni 1715., fulguravit & intonuit in urbe Montepessulano, dum ningeret. Superiori

saeculo, Silvanecti ( *Senlis* ) Catalauni ( *Châlons-sur-Marne* ) in vicinisque urbibus, violentissima saeviit procella in media hieme; plurima in loca ruit fulmen, quo tempore ingens nivis copia decidebat.

Quæres 2. quænam sit aliquando delapsæ nivis copia.

Resp. Quibusdam in locis incredibilis decedit nivium copia. In Diario quod inscribitur *Journal des Savans*, narratur in Ferri insula eam aliquando cadere nivis quantitatem, quæ vervecès qui in pascuis versantur ita per unius mensis spatium cooperiat, ut sub aspectum non veniant, neque detegantur nisi ope densi vaporis qui inde in auras sese attollit. Anno 1729. in Sueciæ & Norvegiæ confiniis tantum cecidit nivis, ut domos prope vicum dictum *Villars* statim obduxerit, & perierint quotquot in eas sese receperant. Idem factum in Silesia & Bohemia contigisse refert D. *Wolf*. Anno 1741. in novum Eboracum Americæ ( *Nouvelle York de l'Amérique* ), irruit tam stupenda nivis copia, ut terram ad 16. pedum altitudinem cooperuerit.

Quæres 3. quid mali interdum afferant nives e montibus sese devolventes.

Resp. Ex altissimis montibus nive obstitis, aliquando parva primum quantitas delapsa excidit, quæ dum per declivia volvitur, in tantam molem excrescit, ut monti similis videatur. Domos in vallibus subjectas prorsus subruit. Immanes illæ nivium massæ interdum in fluvios sese dant præcipites, eorum cursum impediunt, sicque horrendis inundationibus præbent occasionem.

Postquam aliquandiu supra terram nix commorata est, superficiem ipsius inferiorem liquefaciunt exhalationes e terra prodeuntes; reliqua vero illius moles veluti suspensa est, nec sustinetur nisi implexis dumorum ramis, vel nonnullis rupium apicibus. Quamobrem vel brevioris

vioris sclopeti emissio (*un coup de pistolet*) aerem satis commovet, ut pendulam hanc nivium massam decutiat, a montiumque jugis agat præcipitem. Id mali ut effugiant qui per Alpes iter faciunt, exeunte præsertim hieme, feno implenda curant jumentorum tintinnabula; imo etiam ab omni sermone abstinent, dum incedunt per calles abruptos, quibus eminent immensæ nivium congeries, in lapsum proclives, ne scilicet periculosum in aere motum excitent. Quando sese offerunt viæ angustæ, in quibus plurimum est discriminis, priusquam eas ingrediantur, breviorum sclopetum discludunt (*il firent un coup de pistolet*) ut aeris commotio nivis jamjam ruituræ lapsum acceleret.

Quæres 4. cur lacteo candore nix tincta videatur.

Resp. Id oritur ex eo quod ejus partes ita comparatæ sint, ut omnes luminis radios reflectant. Hinc oculorum aciem sæpe offendit. Xenophon refert, postquam Cyri exercitus multis diebus per montes nive candidos iter fecisset, plurimos milites oculorum morbo laborasse, & nonnullos visum prorsus amisisse. Narrat *Olaus Magnus* in plagis septentrionalibus, dum luna refulget, illiusque lumen a nive reflectitur, viatoribus sat lucis supetere, ut iter sine errore prosequantur, & satis e longinquo ursos feras detegant, a quibus præcavere debent.

Quæres 5. quænam sit nivis utilitas.

Resp. Multiplex est nivis utilitas. 1. A gelu defendit herbas, arborum gemmas quæ per autumnum natæ sunt; pariter servat plurimarum radices plantarum, bulbos (*les oignons*) & omnia generatim semina quæ adventante hieme, terræ commissa fuerunt, & germinare incipiunt. Aqua etiam in quam nix resolvitur in terram illapsa eam non parum fecundat, secum alienas particulas deferendo, ad eum effectum idoneas.

Experientia constat plantas in montium cacumini.

minibus, per anni dimidium nive coopertis, crescentes, esse vegetiores & magis sese explicare, quam eas quæ in locis depressioribus nascuntur. Nivis beneficio Helvetii (*les Suisses*) ea debent pingua pascua, quorum succis copiosis nutriuntur pecora, in quibus præsertim sitæ sunt incolarum divitiæ. In *Canada*, statim atque solutæ sunt nives, terra herbis viventibus, arbores foliis & floribus sese vestiunt, semina incredibili quadam celeritate ex humo surgunt, quando subter nivem solum non fuit congelatum.

2. Nives calore liquefactæ, plurimas fontibus, rivis & fluminibus aquas subministrant, quæ sæpe adeo copiosæ sunt, ut inde nascantur exundationes: generatim quippe observatur in Europa rivus mensibus aprili & maio intumescere, ob nivium resolutionem quæ fit in altis montibus, unde ingens devolvitur aquarum copia.

3. Obstant ne dispergantur exhalationes quæ e terræ sinu sursum avolarent, nisi hujus superficiem nix contegeret. Non solum eas exhalationes retinet; sed præterea impedit ne dissipetur calor qui in inferiori globo residet, prohibendo scilicet ne altius tertam gelu subeat.

4. Irlandiæ incolæ nivem adhibent, ut suos pisces, suasque carnes a corruptione defendant. Ea scilicet nutrimenta subter nivem recondunt, ubi perinde ac in muria (*dans la saumure*) servantur integra. Qua de re videas *Diarium Doctorum (Journal des Savans ad ann. 1675.)*

#### *De grandine*

Quemadmodum nix, ita & grando suum ortum habet ex pluviae guttis, quæ congelatæ in globulos concrescunt, quorum non eadem semper est moles. Qui in parte nubis inferiore formantur, iis sunt minores, qui ex parte superiori decidunt. Illi enim posteriores totam nubem trajiciendo aliis aquæ guttis sese adjungunt, quæ in glaciem convertæ, earum molem amplificanti.

Imo.

Imo interdum contingit, ut grandinis massa, quo gallinaceo sit magnitudine æqualis. Illud autem præcipue evenit, tempestate imminente, ubi tonitrua reboant. Tunc enim vehementes excitantur venti, qui nubem vi maxima comprimantes, eam condensant, & in aquæ guttas majusculas convertunt. Deinde guttæ illæ crassiores in aerem decidunt partibus sætum nitrosis & sulphureis, a quibus subito congelantur. Hinc grando tantæ est molis. Quandoquidem ubi scyphus aqua plenus immittitur in nivem aut glaciem contritam, cum sale marino vel ammoniaco permistam, aqua statim congelatur; hinc pronum est colligere spiritus salinos cum aere commistos, ad grandinem efficiendam plurimum conferre.

Sæpe in grandinis centro reperitur quædam nuclei (*noyau*) species, qui opacus est ac candidus, crustaque molliori & pellucida circumdatus. Nucleus ille primum in superiori regionis glacialis parte formatus fuit; deinde inter descendendum incidit in aquæ guttas quæ ipsi adhæserunt, & congelatæ sunt; cum vero in regione æris inferiori minus frigescat, hæc glacies adventitia ipso nucleo mollior est, magisque translucida. Fieri etiam potuit ut crusta nucleum ambiens formata fuerit glacie, quæ liquefieri incepisset, dum nucleus totam duritiem suam retinuit.

Quæres utrum noctu & per hiemem aliquando grandinet.

Resp. Insignes quidam Physici, & ipse *Hamberger*, quamvis suis in observationibus plerumque accuratissimus, contendunt nunquam per noctem grandinare. Quo in capite allucinati sunt. Rarum quidem est noctu, sicut & per hiemem, cadere grandinem; sed tamen utrumque aliquando contingere, ex testimoniis fide dignis constat. Refert, v. g. *Deratle*, sub ipsius oculis, die 30. mensis Januarii an. 1741., hora nona vespertina cecidisse grandinem, & quidem  
Ita

ita copiose, ut vix intra semihoram in vicis (rues) & supra tecta, ad multorum pollicum altitudinem accumulata fuerit. Quæ supra ædium tecta erat congesta, non resoluta est, nisi post 24. horas. In Montepessulano, ubi factum accidit, nemo erat qui miminuisset, in ulla anni tempestate (saison) tantum grandinasse. Dum rueret grando, perpetuus fuit tonitruï fragor, ut æstivis in procellis contingere solet.

## ARTICULUS II.

*De Meteoris volatilibus.*

**M**eteora volatilia appellantur venti qui huc & illuc quasi volitant. Ventus porro est aer agitatus, sive aeris ab una atmosphæræ parte in aliam translatio.

Quæres 1. quænam sint præcipuæ ventorum species.

Resp. Alii sunt generales, qui simul ad plures regiones pertinent; alii particulares, qui nonnullis duntaxat in locis obtinent; alii periodici, qui certis sunt anni tempestatibus. Innumeri denique sunt venti, quia nullum est horizontis punctum, ex quo non spiraret ventus aliquis: at tamen 32. tantum distinguere solent navigatores, ex quibus octo sunt præcipui. Quatuor ideo dicuntur *cardinales*, quod e quatuor horizontis punctis *cardinalibus* spirant, nempe boreas, sive septentrionalis (*le Nord*); aufer, seu meridionalis (*le Sud*); eurus, sive orientalis (*P. Est*); favonius, sive occidentalis (*P. Ouest*.)

Quatuor alii mediam inter ventos cardinales sedem occupant, ideoque appellantur *collaterales*. Illorum unusquisque nomen habet ex iis compositum vocibus, quibus designantur venti, inter quos medius est. Qui interponitur borealem inter & orientalem, dicitur *nord-est*. Qui inter borealem & occidentalem spirat, nuncupatur *nord-ouest*, qui austrum inter & ventum orientalem

talem interjacet, vocatur *sud-est*; tandem qui inter austrum & ventum occidentalem medius est, appellatur *sud-ouest*.

Quæres 2. quænam sint ventorum causæ physicae.

Resp. Variæ sunt ea de re conjecturæ, quarum verisimiliores exponemus: prima ventorum causa est solis calor. Quando enim radii solares notabilem atmosphæræ partem calefaciunt, eam simul dilatant; aer autem dilatatus majus sibi vindicat spatium; aerem igitur vicinum violenter repellit; quod fieri non potest quin ea excitetur agitatio, in qua situs est ventus. Hinc explicari potest cur æstate mane spirare soleat ventus orientalis: aer scilicet oriente sole calefactus sese expandit; dum autem sese explicat, aerem sibi proximum versus occidentem repellit. Propter rationem oppositam, sole occidente, ventum ex parte occidentali stantem sæpe experimur.

Secunda causa est aeris vis elastica, quæ in eo longe vegetior est, quam in plerisque aliis corporibus. Dum scilicet aer in aliqua terræ parte, v. g. boreali, sese dilatat, comprimit aerem in parte meridionali constitutum; aer iste compressus suam vim elasticam exerit, ut priorem in statum sese restituat; sic autem sese restituendo, aerem anteriorem in partem oppositam repellit, sicque alicui vento præbet occasionem.

Tertia causa est nubium descensus. Quando enim nubes in superiori atmosphæræ regione penilis, pari aeris volumine fit gravior, quid inde accidit? nubes motu accelerato delabitor, versus terram magno impetu decidit, aerem subiectum violenter exagitat. Hinc horrendæ in mari tempestates; hinc luctuosa in terris perniciës nascitur.

Quarta causa sunt varii sales in antris & cavernis permixti, qui secum invicem fermentescentes, aerem internum vehementer rarefaciunt. Ille vero, qua data porta, inde vi subita erumpens,



pens, aerem externum ad magnam usque distantiam aliquando propulsat; cujus rei plurima refert exempla D. Musschenbroek. Sic asserit Connor Philosophus Hybernus se accepisse a fossoribus, qui nonnullis Germaniæ fodinis operam dant, inde aliquando ventos proflire adeo vehementes, ut eos humi posternant, & casulas in ipsis fodinis exstructas evertant.

Quinta causa sunt diversi generis vapores & halitus, qui in atmosphæra commissi, simul fermentescunt, sese dilatant, & tandem erumpunt, multiplicique commotione aerem concutiant & agitant. Idcirco semper aliquis excitator ventus, cum tonat & fulgurat. Hinc explicat D. Musschenbroek, cur venti non tenore continuo, sed per temporis intervalla, nunc majora, nunc minora, spirare soleant. Modo enim major, modo minor exhalationum copia in aere permiscetur; & postquam facta est una coitio, aliquid temporis effluit, priusquam confluetur altera. Idcirco nunc magis, nunc minus vehementer fiat ventus: interdum subito remittit, & paulo post majori cum impetu sifi-debit.

Quæres 3. cur ventus meridionalis sit calidus, septentrionalis frigidus, orientalis siccus, occidentalis humidus.

Resp. Ventus meridionalis est calidus, quia e regionibus ejusdem nominis advenit, ubi aer radiis solaribus, maxime est calefactus. Septentrionalis est frigidus, quia e plagis glacialibus plurimas salis & nitri particulas secum asportat. Orientalis est siccus, quia spirat ab Asia in Europam, nec ingentem offendit aquarum copiam: pauca enim sunt maria in locis e quibus ad nos pervenit. Denique ventus occidentalis est humidus, quia multis vaporibus e mari sublatis onustus in regiones nostras devenit. In locis enim quæ percurrit ingentes sunt maris tractus.

Quæres 4. quænam sit ventorum utilitas?

Resp. Variæ sunt ventorum utilitates. 1. Per-

gando aeri in cujus ambitu vivimus, inferviunt. Eum quippe inficiunt exhalationes e corporibus nostris avolantes, unde valetudini non parum nocet. Sed exhalationes illas secum rapit ventus, novumque aera puriorem & magis salubrem advehit. Non semel observatum fuit, post longam aeris desidentis tranquillitatem, intervenire morbos contagiosos, febres perniciosas, ipsamque aliquando pestem.

2. Nimum aeris calorem temperant venti, sine quorum subsidio inhabitabiles prorsus fierent nonnullæ regiones, propter immodicos quibus obnoxiae sunt calores. In India enim, sive orientali, sive occidentali, multa sunt loca quæ diurno solis fervore adusta sunt. Sed labente die, spirat e regione maris ventus frigidulus, qui homines, jumenta & plantas recreat, simulque terram calentem & rivos refrigerat.

3. Nubes, praesertim e mari sublatae, a ventis circumquaque transferuntur, ut in pluvias resolutae, terram, & quas enutrit plantas, humectent. Plurimum etiam ad vegetalium incrementa conferunt diversae exhalationes, quæ a ventis ab una regione in aliam delatae, quoquoersum disperguntur.

4. Venti aquas Oceani, lacuum & stagnorum variis exagitant motibus, sicque obstant ne torpescendo corrumpantur, & pravis exhalationibus aerem inficiant.

5. Ars naturæ æmula nostros in usus ventorum flamina convertit. Inde vero quanta derivantur commoda! quam longe lateque excrevit commercium! enim vero angustissimos intra fines coerceretur navigatio, si naves remis duntaxat impellerentur. A longis itineribus prorsus abstinendum esset, tum propter nimiam tarditatem, tum propter ingentiores impensas. Famulanribus autem ventis, nautæ numero pauci, vel exercitum, vel immanes mercium moles, ab uno Oceani extremo ad aliud facile transferunt.

Quanta utilitatis sunt molæ vento versatiles  
ad

ad conterendum frumentum, ad extrahendum e variis seminibus oleum, ad densandos pannos (*pour fouler les draps*) ad defecanda ligna, &c. Quantus hominum vel equorum numerus adhibendus esset, ad efficiendam farinam, quæ diversis in locis auxiliante vento, paratur.

# ARTICULUS III.

## *De Meteoris ignitis & lucidis.*

**D**E Meteoris ignitis nihil certo exploratum habere Physicos, etiam recentiores, sic ingenue fatetur naturæ sapientissimus interpres D. Nollet: *Nous n'avons sur les météores enflammés, que des conjectures; encore est-il plus facile de les attaquer par des objections sérieuses, que de les défendre par des raisons satisfaisantes en tout point; conjectures sur la vraie matière de ces feux; conjectures sur la cause de leur inflammation; conjectures sur la manière dont ils opèrent les effets, qu'on est comme forcé de leur attribuer; incertitude par tout.* (Tom. 4. pag. 296.)

Verisimile tamen est materiam quam ad procreandos illos effectus adhibet natura, sitam esse in exhalationibus, quæ a terra in atmosphæram evehuntur. Id enim concludere primum est, ex eo quod frequentiores & majores sint illi ignes in locis, eaque anni tempestate, quibus copiosiores sunt, exhalationes ad inflammationem idoneæ. In regionibus quippe calidis, & præsertim in iis ubi solum est magis bituminosum aut sulphureum, sæpius conspiciuntur ignita hæc phænomena.

Dicturi sumus 1. de tonitru; 2. de globis ignitis; 3. de stellis cadentibus & ignibus fatuis; 4. de halonibus, pareliis & paraselenis; 5. de icide; 6. de aurora boreali.

## PARAGRAPHUS I.

## De Tonitru.

**I**N tonitru tria distinguenda, nempe fulgur, fragor & fulmen. Repentina luminis coruscatio, quæ ex rupta nube erumpens, oculos subito perstringit, simul & evanescit, nomen habet *fulguris*. Sonus horridus qui post fulgurationem audiri solet, dicitur *fragor*: ignis vividissimus, qui sæpe cum ingenti strage ad terram usque vi subita defilit, vocatur *fulmen*.

Hæc diu communis fuit, quam nonnulli etiamnum defendunt, opinio, tonitruum illiusque phænomena, non aliunde generari quam diversis vaporibus & halitibus, qui in atmosphæram sublatis, simul commisceantur, fermentescunt, ideoque inflammantur. Si enim, inquiunt, simul permisceantur aqua, ferri limatura, sulphur, & massa inde coalescens terræ infodiatur, experientia constat molem hanc radiis solaribus calefactam ita fermentescere, ut post aliquot horas, humum sibi impositam attollat, eaque disrupta, flammam identidem emittat, tandemque cum ingenti strepitu erumpat. Quis autem negaverit ex corporibus passim avolare, & sursum evehi varii generis exhalationes, nitrosas, bitumineas, sulphureas, &c., easque in nube permixtas fermentescere? ex hujusmodi ergo nube, inquiunt, exire debent fulgura & fulmina, nec sine ingenti fragore, qui diversorum corporum occursum percussus, multoties iterabitur.

Recentiores autem Physici in eo fere omnes consentiunt, quod mirabiles tonitruum effectus materiæ electricæ, tanquam causæ præcipuæ, adscribi debeant, & tonitruum spectant veluti immensam quandam electricitatem. Minime tamen negant alias causas in eo phænomeno suas habere partes, inter quas numerantur exhalationes

nes sulphureæ, bituminosæ & aliæ ejusmodi. Quæ enim regiones his plurimum abundant, ut Sicilia, Italia, eæ tonitruis sunt magis obnoxia. Præterea constanter observatur loca fulmini tacta, gravem sulphuris & bituminis odorem spirare. Hinc putant hodierni Physici materiam electricam in tonitruo principem quidem locum obtinere; sed eam in vehementiores effectus erumpere, cum substantiis ad inflammationem paratissimis sociatur, quas in atmosphæra collectas reperit.

Dux erunt hujus paragraphi sectiones; in priori exponemus quo pacto nubes fieri possit electrica, & quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus analogia intercedat; in posteriori vero expendemus quænam loca fulmini plus minusve sint obnoxia, & quæ adversus illius ictum adhibendæ sint cautiones.

## SECTION I.

*De modo quo nubes fieri potest electrica, & de analogia quæ inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus intercedit.*

**C**ORPORA duplici modo fieri possunt electrica, quædam scilicet ex affricu, quædam ex communicatione. Quæ priori modo evaserunt electrica, vim eandem in alia transmittunt corpora, quæ huic suscipiendæ idonea sunt, nec longius distant. Aer autem ex illorum corporum numero videtur esse, quæ juvante frictione vim electricam concipiunt. Cum vero temporibus procellosis, aeris rivuli in partes contrarias ferantur, maxime verisimile est eos ex affricu mutuo fieri electricos, & deinde vim suam electricam obviis nubibus communicare. Præterea variæ exhalationes ad inflammationem expeditæ, in atmosphæram coeuntes, aliæ in alias a ventis oppositis impelluntur, sese mutuo collidunt, & sibi invicem affricant; inde vero

fieri possunt electricæ. Alterutro vel utroque modo in nube tonitruum deferente, excitari potest virtus electrica; nubes igitur procellosa spectari potest tanquam ingentissimus conductor, immensa fluidi electrici copia prægnans.

Nunc exponendum est quanta inter tonitruum, fulminis & electricitatis effectus intersit consensio.

1. Supra ædificii cujusdam altissimi tectum constituitur fulcrum resinaceum aut vitreum, in quo virga ferrea ad perpendiculum erigatur; experientia constat, si nubes fulmen in sinu suo deferens, huic virgæ immineat, ex illa scintillas exilire, eodem prorsus modo, ac si funiculis ferreis suspensa, cum electricæ machinæ globo communicaret.

Cui experimento nunc omnibus familiari affinia sunt nonnulla facta, quæ ita referuntur in historia Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis, ad annum 1764; pag. 2.: *César rapporte dans ses Commentaires, que pendant la guerre d'Afrique, après un orage affreux arrivé pendant la nuit, & qui mit en grand désordre toute l'armée Romaine, la pointe des dards de la cinquième légion brilla d'une lumière spontanée; quintæ legionis pilorum cacumina sua sponte arserunt. Au Château de Duino, situé dans le Frioul au bord de la mer Adriatique, il y a, de temps immémorial, sur un des bastions de la place, une pique plantée verticalement la pointe en haut. Quand le temps menace d'orage, la sentinelle qui monte la garde à cet endroit, présente au fer de cette pique celui d'une balleyarde qu'on laisse toujours là pour cette épreuve; & si le fer de la pique étincelle beaucoup à l'approche de celui de la balleyarde, ou qu'il jette par sa pointe une petite gerbelumineuse, alors il sonne une cloche qui est auprès, pour avertir les gens de la campagne & les pêcheurs qu'ils sont menacés d'orage, & sur cet avis, tout le monde rentre.*

Hujus.

Hujusmodi phænomenum hūc prorsus simile est, quod procreare solet electricitas globo perfricato excitata.

2. Ubi corpus minime electricum ad *conductorem* electricum admovetur, utrinque sese prodat crista quædam lucida; quo propius ad sese accedunt duo hæc corpora, eo magis in unam coeunt ambæ cristulæ, & tandem vividissimam in scintillam cum aliquo crepitu erumpunt; pariter quando nubes electrica aliam offendit minime electricam, ex utraque parte fluunt materiæ electricæ rivuli, qui in sese invicem incurrentes colliduntur; ex eo conflictu exsilit ignis ille splendidus qui dicitur *fulgur*, neque ab ipso fulmine, nisi gradu impetus, discrepat. Aerem contiguum subito repellit fulguris eruptio; aer iste vicinum comprimit; qui sua vi elastica sese in priorem statum restituendo, fragorem excitat, quem boantem & reboantem audimus. Sonus ille intra nubium viscera quasi discurrere videtur, quia sæpe reflectitur vel a diversis nubium partibus, vel a variis montibus & cautibus.

3. Fulgur per sinuosos anfractus huc illuc discurret; quod phænomenum ex variis pendet substantiis, quæ fulguri aera trajicienti obviæ sunt. Cum enim aliæ sint magis quam aliæ idoneum materiæ electricæ vehiculum, hæc sequitur corpora quæ ad eum effectum aptiora sunt. Hujus igitur luminis motus tam inæqualis & flexuosus esse debet, quam ipsa illorum corporum in aere fluctuantium dispositio. Idem observatur phænomenum, quando e *conductore* materia electrica egregie imbuto elicitur scintilla, quæ ad certam propagetur distantiam. Tunc illam videas sinuosis flexibus ad corpus tendere quod ipsi objicitur.

4. Quædam corpora educendis e virga electrica scintillis aptiora sunt, quam alia. Sic corpus metallicum scintillas vegetiores & majori in distantia elicit, quam instrumentum ligneum. Pariter nonnulla sunt corpora fulmini provocando ma-

gis accommodata, quam alia. Hujusmodi sunt excelsa ædificia, quorum tecta plumbo coope-riuntur; campanilia (*les clochers*) quæ, præter plumbum & ferrum ex quibus constant in iis erectæ cruces, plurima metalli millia continent, &c. Idcirco docet experientia hæc corpora longe frequentius, quam alia, fulmine percuti. Sæpe accidit ut iæu fulmineo ferantur mæssores prope frumenti defecti acervum, qui ipse nihil damni patitur; sæpe etiam tactu fulminis pereunt equi plaustrum trahentes, dum quidquam mali non experitur ipsum vehiculum: quia scilicet scintillam electricam potentius sollicitat corpus animale, quam palea vel lignum.

5. In experimento quo vocitari solet *Expérience de Leyde*, ut corpus commoveatur, minime necesse est illud segregatum esse (*isolé*), sive positum supra materiam resinaceam aut vitream. Simile phænomenum in tonitruo locum habet, sed modo longe vehementiori. Plurimi enim ex iis qui vim fulminis, citra mortem, experti sunt, testantur se violenta commotione fuisse concussos: ex ipsorumque narratione sequitur eos idem, sed dispari gradu, sensitse ac illos qui experimento Leidensi subijciuntur.

6. Si levia corpuscula, *conductori* obijciantur, ea videas a fluido electrico repelli & removeri; ita tonitruum materia ingentes murorum & rupium partes, arbores, animalia evertit & procul disjicit. At, inquires, immane est discrimen inter immensas murorum rupiumque moles, & leves plumulas, vel tenues auri lamellas. Id equidem fateor; sed *conductoris* virtus electrica quæ corpora leviuscula repellit, debilissima tantum est imago illius quam nubi tonanti inesse merito supponimus. Numquid unicum pulveris pyrii granulum in aere libero accensum, tantam procreat fulminationem, quantam idem pulvis in tormento bellico congestus? sed tamen utriusque illius effectus, quamvis impetu disparis, eadem est natura & causa. Zephyrus qui arborum  
folia



folia vix movet, & ventus procellosus qui fortissimas quercus eradicat, nihil tamen aliud sunt, quam aer agitatus.

7. Fulmen sæpe visum est metalla liquare, & involucris chartaceis aut linteis, quibus continebantur, parcere; enses liquefacere, intacta vagina; argentum, illæsis oculis, conflare; porro mirabile illud phænomenum animadvertere est in electricitate. Potest scintilla electrica liquare vel terere argentum, cuprum, aurum ipsum, eaque in intimos vitri poros intrudere, nihilque damni vitris inferre inter quæ media interponitur lamella metallica. Rem sic testatur Physicus in phænomenis electricis versatissimus D. Sigaud. de la Fond: *L'électricité produit des effets tout-à-fait semblables... Veut-on imiter ces prodiges, & fondre une lame d'or entre deux glaces, sans briser & endommager celles-ci? l'expérience est on ne peut plus facile à répéter.* (Élém. de Phys. tom. 4. pag. 435. & suiv.) Deinde facilem illud exequendi modum indicat.

8. Fulmen corpora quæ percutit sæpe inflammatur, & tristibus incendiis occasionem præbet: idem efficit electricitas. Nulla pene est substantia ad ignem concipiendum idonea, quam inflammare non queat scintilla electrica, si aptum virtutis gradum affecta sit. Pulverem pyrium incendit, imo & candelam recens extinctam, modo tempus quo sumat adhuc arripiatur. Quinetiam alia corpora minus ad conflagrationem expedita, qualia sunt resina, ligna inflammabit scintilla electrica, si augeatur ipsius impetus.

9. Animal fulmine percussum plerumque subito moritur, & quidem non raro sine ulla exteriori vulneris nota. Ratio est quod fluidi electrici rivulus ex animalis corpore exiens, occursu alterius rivuli e nube irruentis repercussus, vehementissimam in omnibus corporis partibus commotionem excitet. Quam enim cum globis nostris excitamus, hæc tanto interdum impetu animalia concutit, ut illis mortem in-

ferat repentinam, & quidem sine conspicuo læsionis vestigio. Sed longe terribilior debet esse ille effectus, cum suam habet causam in nubis immensæ virtute electrica. Quis dubitet ea posse excitari commotionem, quæ organicam corporis animalis structuram penitus evertat?

### COROLLARIUM.

Ex dictis sequitur eisdem esse tonitruum & electricitatis effectus, in eoque tantum differre, quod alii sint aliis longe vehementiores: ad verum proinde magis accedere videtur Physicorum opinio, qui ad materiam electricam, veluti ad causam præcipuam, tonitruum phænomena referunt.

At, inquires, si tonitruum esset immensa quædam electricitas, guttæ pluviales quæ e procellosis nubibus decidunt, etiam forent electricæ, ac proinde in tenebris lucidæ viderentur.

Resp. Rem ita futuram esse non equidem negaverim, si illæ guttulæ sufficientem electricitatis copiam ad terram usque secum semper deferrent, & nunquam nisi noctu tonaret: cum autem raro conjunctæ sint duæ ille conditiones, rarissimum etiam est guttas pluviales apparere lucidas. Aliquando tamen observatum fuit illud phænomenum: hujusce exemplum nobis exhibet historia Regiæ Scientiarum Acad. Parisiensis ad an. 1731., pag. 19. Ibi enim legitur in Abbatia de Lessay près de Contances, sæviante horribili procella, sub vespere pluviam visam fuisse, tanquam metalli liquefacti & inflammati guttulas.

## S E C T I O II.

*Quenam loca plus minasve sint fulmini obnoxia, & quæ adversus illius iram cautiones adhibendæ.*

1. **E**Xperientia compertum est scintillas electricas a substantiis metallicis vividius quam ab aliis excitari; & aquas fluido electrico liberum facilemque aditum præbere; loca igitur quæ venas metallicas & aquam continent, fulmini sunt magis exposita.

2. Vapores aquei quos arbores per expirationem copiosius exhalant, inter eas & nubem electricam quemdam efficiunt *conductorem* qui, licet oculos fugiat, nihilominus existit. Quam ob causam arbores & nemora, nonnisi malefidam præbent stationem, imminente procella. Ne fidas præsertim arbori excelsæ, ab aliisque segregatæ: quot enim sub illis arboribus periere homines! minus esset periculi in mediâ proceraque silva: ignis quippe nubis electricus, undequaque pariter provocatus, nullam habet causam specialem propter quam dirigatur versus hominem qui in ea silva asylum quærit.

3. Altissima ædificia, intus ornamentis æreis & inauratis decorata, extrinsecus vero clathris ferreis (*grilles*) & pergulis (*balcons*) instructa; hujusmodi, inquam, ædificia fulmini sunt magis exposita, quam alia: hæc enim corpora vim electricam facile concipiunt; plurimos etiam materiæ electricæ rivulos subministrant, qui ejusdem materiæ rivulis e nube desilientibus occurrentes, eos ad fulminationem sollicitant. Idcirco, imminente procella, longe minus in paupere tugurio periclitatur rusticus, quam suis in palatiis Principes.

4. Loca subterranea quæ ab aere externo plurimum secluduntur, adversus tonitruum tu-

tiora sunt, vel potius minus periculosa: quem enim locum reperias fulmini prorsus impervium? nulla igitur est pars domus in quam securius te recipias, quam cella vinaria (*la cave*). *Adversus tonitrua*, inquit Seneca, & *minas celi subterraneæ domus*, & *defossi in altum specus remedia sunt*. (*Natur. qu. lib. 6. cap. 1.*)

5. Non sine aliquo fructu pulsantur campanæ, vel exploditur tormentum bellicum, cum nubes satis longe distat. Ad dissipandam enim fulminis materiam non parum valet agitatio, quam in aere excitat campanarum sonus, & maxime tormenti bellici fragor. Ubi vero nubes fulmen denuntians propius accessit, in pulsandis campanis plurimum est periculi. Aeris enim succussu rupta nubes dehiscit, & qua data via fulmen erumpit, quod frequenter accidit. In historia Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis ad annum 1718., legitur in Britannia Armorica inferiori eadem die fulmine percussa fuisse 24. templa, in quibus ad depellendam tempestatem fortiter agitabantur campanæ: quam calamitatem non expertæ sunt vicinæ ædes sacrae, in quibus silebant æra campana.

6. Cum nubes fulmen advehens propius accessit, claudendæ sunt fenestræ & januæ, præsertim sibi invicem oppositæ, ne aeris cubiculum præterfluentis cursus fulmini viam aperiat. Eandem ob causam numquam in curru, vel equo, vel pedibus celeriter incedendum est. Præterea cum in metallis facilius quam in aliis corporibus excitetur vis electrica, quantum fieri potest, exuendæ sunt vestes limbis aureis vel argenteis circumdatae.

Si vero quæsieris qua ratione æstimari possit tonitruum a nobis distantia, respondebitur eam vulgo sic dijudicari: fulgur prius oculos percellit, quam tonitruum fragor ad aures perveniat, quia lumen longe celerius propagatur, quam sonus. Cum vero iste unoquoque minuto secundo, sive intra pulsus arteriæ, 173. sexpedas percurrat,

rat, quot numerantur arteriæ pulsus inter fulgurationem & fragorem, toties computandæ & addendæ sunt 173. sexpedæ. Qua summa, inquit, innotescet tonitruui a nobis distantia. Si eodem pene momento, fulgur emicet, & audiat tonitruui crepitus, illud vertici nostro proxime imminere colligendum erit.

Hæc tamen tonitruui distantiam æstimandi ratio maxime incerta est. 1. Quia in temporis supputationem si quis error, vel levis, irrepserit, plurimis erratur sexpedis. 2. Quia in ea computatione supponitur tonitruui fragorem, ad aures nostras directæ via pervenire, non autem repercussione: quod tamen raro contingit.

7. Nullum est adversus fulmen remedium efficacius, quam vestis ferrea quæ in apicem designat. Qua de re quædam observanda sunt.

*Observatio I.* Illud cuspidibus proprium esse, ut suam *conductori* electricitatem tacite, & sine ullo strepitu subripiant, alibi demonstravimus. Ex ea vero cuspidum proprietate, & materiæ electricæ cum fulminea cognatione, prius omnium coniecit clarissimus *Francklin*, suum procellosis nubibus subtrahi posse ignem fulmineum; nempe supra ædium tecta cuspides metallicas erigendo, ab aliis corporibus sejunctas (*isoltes*), quibus filum metallicum subnecteretur, quod *conductoris* vices gerens, ignem fulminis a cuspe exceptum transmitteret.

Ingeniosam hanc conjectationem primus in Gallia nostra clarissimo experimento confirmavit D. *Dalibard*: in loco enim dicto *Marly-la-ville*, qui a Lutetia distat sex leucis, erigi curavit vestem ferream (*barre de fer*) acuminatam, 40. pedes longam, a ceterisque corporibus segregatam (*isolée*); die autem 10. martii an. 1752., post auditum tonitruui fragorem, e veste eruperunt vividæ scintillæ.

Stupendi illius phænomeni fama longe lateque percrebuit, & industrios electricitatis exploratores excitavit. Plurimi idem experimentum

tentarunt, & quidem interdum non sine gravi periculo. D. enim *le Monier* & Pater *Bertier* Oratorii D. J. Presbyter, dum scintillam e suis apparatusibus elicere, cælo tonante, ictu adeo vehementi fuerunt percussi, ut eos in terram dejecerit. D. de *Richmann* Physicæ Professoris (a *Saint Petersbourg*) subita mors an. 1753., triste documentum est, quam caute & prudenter tentanda sint hujusmodi experimenta; scintilla enim fulminea, quæ e veste ferrea erupit, ictus statim occubuit.

Quanam adhibendæ sint cautiones, ut ab iis experimentis removeatur omne periculum, sic exponit D. *Sigaud de la Fond*: On peut assurer qu'en construisant ces sortes d'appareils avec soin, & en leur ajoutant une décharge qui diminue l'étendue de leur sphère d'activité, & se tenant constamment à une distance plus éloignée que ne l'est la décharge, & en excitant les étincelles avec un excitateur à manche de crystal, ou armé d'une chaîne qui communique avec la terre humide, on peut impunément tenter toutes sortes d'expériences.

La décharge consiste à faire pendre de la barre isolée, ou du conducteur auquel on peut la faire communiquer, & qui reçoit l'électricité des nuages, une chaîne terminée par une petite boule de métal, qui ne soit éloignée que de 12. à 15. pouces du plancher, ou mieux d'un morceau de fer implanté profondément en terre, & qui communique de quelque manière que ce soit avec la terre humide. D'où il suit qu'on pourra toujours se tenir impunément à la distance de 16. à 18. pouces de l'appareil. Aussi voyons-nous que ceux qui ont pris de semblables précautions, n'ont point eu à se plaindre des funestes effets du tonnerre; & cependant ces sortes d'appareils se sont singulièrement multipliés dans le temps. (*Précis historique & expérimental des phénomènes électriques, pag. 433.*)

Observatio II. Ex prædictis experimentis persua-

suasum habuerunt Physici, a fulmine defendi posse ædificia, si vectibus ferreis & acuminatis, supra ædium fastigia erectis subnecteretur filum metallicum, ad terram usque deductum. Tunc enim, inquiebant, materia nubis fulmen advehentis electrica, per amicissimas cuspides defluens, totam fili metallici longitudinem decurreret, in immensamque terræ molem dissipabitur innoxia.

In hujusmodi autem apparatu quantum sit adversus fulmen præsidii innumera testantur facta: ex quo enim Angli, inquit D. *Sigaud de la Fond*, suis ædificiis & navibus hoc munimentum aptarunt, ipsis nihil mali intulit tonitruum. At, inquires, illas domos vel naves fulmen præteriisset, etiamsi cuspidibus armata non fuissent. Sed effugium illud omnino præcluditur facto, quod narrat D. *Kinnersleg* in epistola ad D. *Francklin* 12. octob. an. 1770. scripta. Refert tantam *Bostonii* (*Boston*) coortam esse procellam, ut intra unius horæ spatium, tres domus fulmine percussæ fuerint; ex iis duas gravè damnum expertas esse, dum tertia quæ conductore electrico munita erat, ea clade prorsus immunis fuit. Neque hic objici potest fulmen domum hanc præterisse: filum enim metallicum vecti ferreæ annexum, in sua parte superiori fuit liquefactum (*Transactions philosophiques*, pag. 38. an. 1773.) Plurima hujusmodi facta memorantur in postrema editione operum D. *Francklin*.

En aliud factum recens a nuntiis publicis sic narratum: De *Munich* 8. Août 1781. Son Altesse Sérénissime Electorale ayant fait placer récemment dix-sept conducteurs sur le château de *Nymphenbourg*, le Comte de *Torring-Seefeld*, ci-devant Plénipotentiaire à *Teschen*, en a fait aussi élever sur son château de *Seefeld*. Quinze jours après, un orage violent est survenu, la foudre a donné sur la pointe de la barre électrique, l'a suivie jusques dans un canal, où son extrémité inferieure, disposée en forme d'é-

toile, étoit enfoncée de six pieds de profondeur. Là s'est faite une explosion terrible, semblable à celle d'une mine; les pierres & le sable ont volé à droite & à gauche, & ont laissé l'étoile à découvert; mais c'est à quoi s'est borné l'effet du tonnerre, uniquement dirigé sur ce point. (*Gazette de France du vendredi 31 août 1781.*)

Turris Senarum (de Sienne, en Toscane) fulminis jactibus plurimum erat obnoxia. Vix conductore armata fuit, cum, sapiente procella, solitam fulmen viam iniit, in turrimque delapsam est; ab illius vero impetu nihil detrimenti accepit turris; sed fulmen eam a summo deorsum perlustravit, sinuosos ferreæ catenæ flexus decurrens, in terraque sese recondidit citra ullam ædificii injuriam. (*Nouvelles du monde de Florence an. 1777. num. 34.*)

Plurima sunt alia facta quæ demonstrant, cuspides supra ædificiorum tecta erectas, potentissimum esse adversus fulminis pericula munimentum.

At, inquires, si cuspides metallicæ a fulmine ædificia defendere valeant, cur turres & campanilia (*les clochers*) quorum in fastigiis extant cuspides, frequentius quam alia ædificia fulmine percutiuntur?

Resp. in eo facto nihil esse quod veritatem modo expositam infirmet. Enimvero cuspides illæ, cum obtusiores plerumque sint, & globis metallicis terminatæ, ad provocandam fulminationem magis idoneæ sunt, quam ad materiam electricam nobis tacite subtrahendam. Præterea acuminata hæc corpora ipsis ædificiis conjuncta sunt, quorum partem efficiunt; materiæ igitur fulminis aditum præbent in ædium interiora. Si vero cuspides illæ essent acutiores; si ipsis annexum foret filum metallicum, ad terram usque perductum, tunc ignis fulmineus per eum veluti canaliculum destuens, in commune receptaculum, illis ædificiis, sese diffunderet.

*Observatio II.* Quædam conductori necessariae sunt



sunt dotes, ut fulminis materiam sine ullo, tum sui, tum ædificii damno transmittat. Eas in egregia dissertatione exponit D. *Barbier de Tinan*. Hanc subjunxit suæ versioni gallicæ operis de *conductioribus electricis*, cujus auctor est Abbas *Toaldo*. Summa illius dissertationis capita varias in quæstiones distribuemus.

Quæres igitur 1. quanam esse debeat *conductoris* dimensio.

Resp. Si velis, inquit D. *Barbier*, ædificium ab omni fulminis injuria defendere, non satis est ut aptatus ipsi *conductor* totum fulminis ictum transmittat; sed præterea necesse est ut illius impetum sustinere possit, neque ab eo destruat: alioqui secundus fulminis jactus posset ædibus cladem importare. Nonnullis observationibus constat tenuia quædam fila metallica fulminis trajectu vel liquefacta fuisse, vel dissipata. Nullibi autem legimus contigisse, ut ignis fulmineus quidquam his *conductioribus* nocuerit, quorum diameter erat semipollicis. Hæc proinde sufficere videtur *conductoris* dimensio; nullus ergo esse debet periculi metus, si eidem conferratur unius pollicis crassitudo.

Quæres 2. utrum inferior *conductoris* extremitas in aquam demergenda sit; an vero satis fuerit eam subter humum deprimere?

Resp. Ut *conductor* fulminantem ictum omnino transmittere queat, illæsumque servare ædificium, in eo nihil esse oportet, quod materiæ electricæ transitum remoretur, & istam, statim atque *conductorem* sublit, eum posse libere permeare, in globumque terrestrem sese protinus diffundere. Constat autem aquam aptissimum esse fluidi electrici vehiculum, licet minus quam metalla; cum vero terra certam ad profunditatem semper humida sit, satis esse visum fuit, ut *conductor* ad eum usque humorem perducatur; sed immerito prorsus. Fluidi enim electrici vis, ut notat D. *Barbier*, tenuissimam aquæ copiam trajiciens, eam statim in vapores solvit.

Con-

Contingere ergo potest, inquit, ut secunda fulminis irruptio, nullum humorem, utpote a prima jam dissipatum, inveniens, totam vim suam contra ædificium exerat. Præterea humor ille semper fulmini transitum præbet minus liberum, quam ingens aquæ volumen.

Eam ob causam, inquit, ubi servandum est alicujus momenti ædificium, semper ego suaserim, ut inferior *conductoris* extremitas in aquam mergatur. Suam deinde opinionem quibusdam factis confirmat, quæ in operibus D. *Franklin* referuntur. Scilicet *conductor* quem in Philadelphia D. *West* adhibuit, cujus extremitas subter humum ad 4. vel 5. pedes depressa erat, fulmine percussus fuit. Tunc spectatores multi ignem viderunt supra pavementum, & circa *conductorem* emicare ad unius vel duarum sexpedarum distantiam. Ipse D. *West*, qui muro suo erat applicatus, satis vehementem expertus est commotionem, quia ignis electricus suo in trajectu moras passus fuerat.

En aliud factum: D. *Maine* suum *conductorem* ad trium infra terram pedum altitudinem perduxerat. Quid autem accidit? Fulmen in eum *conductorem* incidit, vicinæque fundamentorum parti plurimum damni intulit, quod materiæ fulminæ repercussionem indicabat; detrimentum vero illud non contigisset, si *conductor* in aquam fuisset demersus.

Verum prope ædificia non semper occurrit puteus, vel cisterna, vel rivus, &c. Quo in casu, inquit, D. *Sigaud de la Pond*, in experimentis electricis versatissimus, satis erit ut *conductor* cum terra humida communicet, ope vectis ferreæ quæ intra humum altius infodiatur. Maxime vero curandum est, ut vectis illa 7. vel 8. pedibus ab ædificii fundamentis removeatur; qua cautione adhibita, nihil fore periculi asserit.

Quæres 3. quæ cautiones adhiberi debeant, ut contiguæ & continuæ sint variæ *conductoris* partes?

Resp. Prædictus D. *Maine* *conductor* ex radiis fer-

ferreis ( *tringles de fer* ) sibi invicem inuncatis ( *accrochées* ) constabat. Post fulminis ictum, in uncinorum ( *crochets* ) juncturis visa sunt aperta fusuræ ( *de fusion* ) indicia; ex uncis etiam plurimi fuerunt amoti, nec parum detrimenti expectata est domus, ob vehementem qua fuit quassata commotionem. Hujusmodi effectus inde exortos putat D. *Francklin*, quod in aquam merus non fuerit *conductor*, & quod non satis continuæ & devinctæ essent ipsius partes, siquidem in paucissimis sese punctis contingebant. Ad removendum igitur omne periculum, diligenter curandum est, inquit D. *Barbier*, ut inter diversas *conductoris* partes accurata sit continuitas. Id facile obtinebis singularum vectium ( *barres* ), ex quibus constat, extrema sic incidendo, ut tibix rostrum ( *bec de flûte* ) exhibeant; eas juxta se invicem applicando, & cochlearum ope ( *des vis* ) stringendo. Ad majorem etiam securitatem, singulas inter commissuras ( *entre les jointes* ) interponendæ sunt plumbi laminæ, quæ contactum efficient perfectiorem.

Quæres 4. utrum *conductor*, citra ullum periculum, esse possit ædificio contiguus, sive intra, sive extra; an vero necesse sit eum in tota ejus longitudine segregare ( *isoler* ), vel etiam ipsum in quadam ad ædibus distantia collocare.

Resp. Non alia esset *conductorem* segregandi causa, nisi periculum ne fulminis impetus in *conductoris* latera sese ferret: id vero non metuendum est. Experientia enim constat fluidi electrici vim in latera non sese conjicere, nisi ubi quædam reperit obstacula, quæ ipsam remorantur. Porro *conductor* iis instructus doribus quæ expositæ fuerunt, libere & subito totum ignem fulmineum transmittet; iste vero nihil impedimenti in suo cursu nactus, in latera non irrumperet, nec aliquid mali inferet corporibus prope *conductorem* positis. Eum igitur se-

gre-

gregare prorsus inutile esset; hunc poteris vel intra, vel extra ædificium deducere, prout tibi commodius erit.

Quæres 5. utrum superior *conductoris* extremitas acuminata esse debeat, an obtusa.

Resp. Anteferendi sunt *conductores* in apicem desinentes. Cuspides enim materiam electricam, ac proinde fulmineam, in longe majori distantia hauriunt, quam corpora obtusa. Id plurimis compertum est experimentis. Ea tantum referemus quæ a D. Leroi tentata fuerunt, & exposita in dissertatione quam doctissimus ille Physicus in Scientiarum Academia legit an. 1773.

In trium pedum distantia *conductori* BC obtulit cuspidem acutissimam D (fig. 101.) & punctum lucidum in mucronis extremitate observavit; quod certum est argumentum, cuspidem hanc *conductori* jam tum subtrahere ejus electricitatem. Eam longe propius admoveri oportuit, nempe in E, ad distantiam tertiæ partis unius lineæ, ut scintillulam eliceret, & quidem debilissimam.

Deinde eidem *conductori* BC, in parique distantia glandem plumbeam F objecit, cujus diameter erat unius pollicis. In ea vero nullum visum fuit lumen; nullam e *conductore* traxit electricitatem. Hanc subtrahere tantum cœpit, cum in ea pene fuit distantia, ubi scintillam eliceret, id est, ad unum circiter a *conductore* pollicem.

Præterea D. Leroi lagenam Leydensem (*bon-veille de Leyde*) fluido electrico egregie imbuit, ita ut excitandæ vehementi commotioni idonea esset. Deinde eam exoneravit, acus tenuissimæ cuspidem *conductori* objiciendo, vixque sensibilis fuit commotio. Res autem longe aliter se habet, cum adhibetur corpus obtusum. Unde sequitur cuspides materiam electricam, ac proinde fulmineam, subtrahendo ipsius vim ita imminuere, ut effectum non habeat nisi debilem. Ad defendendum igitur a fulmine ædificium,  
an-

anteponendi sunt *conductores*, quorum acuminata sit pars superior.

Quæres 6. quanam esse debeat *conductoris* supra ædificium altitudo, & quam ad distantiam sese extendat ipsius efficacia.

Resp. *conductorem*, quantum fieri potest, esse attollendum: quo enim erit altior, eo magis tutum præstabit ædificium, materiam fulmineam potentius hauriendo. Quam autem ad distantiam pertineat cuspiditati *conductoris* efficacia definiri non potest: id enim ex causis pendet innumeris, nempe ex nubium magnitudine & distantia, ex copia electricitatis quam continent, ex earum directione & motu, ex modo quo cuspilibus occurrunt. Certum quippe est acuminum potentiam plurimum debilitari, quando nubi procellosæ ad perpendicularum non sese offerunt. Quam ob causam D. *Barbier* quinque cuspides quibus armatur suus *conductor* ita disposuit, ut variis inclinatz sint modis. Una est verticalis; aliæ vero quatuor in modum crucis sese interfecant. Unde fit ut diversis nubium motibus sint magis accommodatz. Ubi longissimum est ædificium, illud forte totum a fulmine non satis defenderet unicus *conductor*; ad removendum igitur omne periculum, tunc adhibendæ erunt duæ vestes ferreæ, in apicem desinentes, & ita collocandæ, ut suam habeat quæque ædificii extremitas. Præterea inter eas vestes instituenda erit metallica communicatio.

## PARAGRAPHUS II.

### *De Globis ignitis.*

**A** Liquando videntur globi ignei qui in sublimi aere accenduntur. Post se longas & albicantes caudas sæpe trahunt. Nunc motu celerissimo sunt abrepti; nunc lentius progrediuntur; quidam eidem loco videntur affixi; omnes lumen fat

fat splendidum emittunt. Varie sunt magnitudinis. In historia Academiæ Scientiarum Parisiensis ad annos 1738. & 1740., mentio fit globi cujus diameter quartam diametri lunæ partem æquabat. Alterum Lipsiæ observavit D. Kirch, cujus diameter æqualis erat semi-diametro lunæ, & qui tantum lucis spargebat, ut sine alterius luminis subsidio, distincte legere facile esset.

Alium an. 1719. Bononiæ globum vidit *Balbus*, lunæ, dum pleno orbe refulget, æqualem, & cujus splendor ad solis orientis fulgorem similitudine accedebat. Ipsius supra horizontem altitudo erat circiter 16000. passuum. Quacumque transit sulphureum odorem effudit. Tandem cum horribili fragore erupit.

Anno 1719. medio in Oceano hujusmodi globus fuit observatus, qui e maris superficie in navem incurrere videbatur. Non procul ab ea displosus est, & quidem cum sonitu huic æquali, quem edere solent piurima tormenta bellica, simul emissa. Circa navem acerrimum sulphuris odorem disseminavit. Ipsius eruptione unus e malis varias in partes fuit confRACTUS, alter vero diffusus, quinque homines prostrati, & alius igne consumptus. Horrendum illud phænomenum ita descriptum videas (*n. 494. des Transactions philosophiques.*)

Denique die 17. mensis Julii an. 1771., vespere circa horam decimam cum dimidia, tempore maxime calido & serenò, visa est lux subita, quæ progrediendo nova suscipiebat incrementa. Primum globi formam induit, deinde cum longissima cauda apparuit. Globus ille, post decursum quoddam cæli spatium, ad horizontem accessit, & quasi dehiscendo lumen effudit adeo vividum, ut illius fulgorem sustinere oculi non possent. Priusquam apparere desierit, pyri vel lacrymæ bataviæ formam assumpsit, tuncque ipsius lumen fusi metalli candorem exhibuit. Duobus vel tribus, postquam evanuit, minutis, auditum est cæcum murmur (*un bruit sourd*) toni-

tonitruo non abfimile e longinquo reboanti, vel juxta quofdam, domus ruinam facientis fragori fimile. Fertur etiam vitra multis in locis contremuiffe, quod aeris commotioni tribuendum eft. Phænomenum illud Parifis, Lugduni, Divione, Londini ( *Londres* ) plurimisque in aliis locis remotionioribus obfervatum foit.

Cum ii globi fulphureum odorem fecum importent, inde conjicere licet eos, non tam effe phænomena electrica, ut multi sentiunt Phyfici recentiores, quam nubem fulphure prægnantem & aliis fubftantiis, quæ in atmofphæra inflammantur dum fimul fermentefcunt: Eo verifimilior eft hæc opinio, quod reipfa e plurimis montibus vulcaniis ( *vulcans* ) fele efferant multæ exhalationes fulphureæ. & aliæ quæ ignem facile concipiunt. Illæ vero ventis delatæ poffunt nonnullis in nubibus accumulari, in quibus fimul permiftæ effervescunt.

Quando nubes hujusmodi corpusculis onuftæ incenduntur, facile eft intelligere ab iis induendam effe formam fphæricam. Nihil quippe aliud funt, quam fluidum inflammatum, in alio fluido innatans. Quod fpectat ad earum motum, eo celerior effe debet, quo magis agitatus eft aer cujus in finu fluctuant. Idcirco quiescere videntur ii globi, cum inflammata quibus gignuntur exhalationes, in aere placido & tranquillo fufpenfæ funt; vel quando in maxima a fpectatore diftantia incenduntur, ad eumque linea recta veniunt. Tunc enim pronuntiari facile non poteft utrum moveantur, an quiefcant.

Ad velocitatem qua impelluntur referri poteft longa quæ eos fubfequi videtur cauda. Debilius enim eft visus organum, ut loca quæ modo defuerunt discernere queat; aliunde in oculis noftris adhuc viget prius excitata luminis impressio; unde fit ut totum illud fpatium nobis videatur ignitum.

## PARAGRAPHUS III.

*De Stellis cadentibus & Ignibus fatuis.*

**A**Liquando videtur globulus, qui in atmosphæra splendidam lucem emittit, huc, il-  
 luc discurrit, & interdum in terram decidit.  
 Aliquam habet cum stella similitudinem, ideo  
*stellæ cadentis* nomen obtinuit. Hanc nihil aliud  
 esse, quam camphoræ, nitri & limi simul per-  
 missorum congeriem multi existimant: si enim,  
 inquirunt, ex iis corporibus cum affuso vino, vel  
 spiritu vini globum composueris, eumque, post-  
 quam accensus fuerit, sursum in aera projicias,  
 lumen emittit stellæ cadentis fulgori non absti-  
 mile.

Quidam vero Physici recentiores phænomenum  
 illud atmosphære electricitati longe probabilius  
 attribuunt. Ita censet Pater Beccaria, qui in  
 eam opinionem adductus est facto cujus testis  
 fuit. Quadam enim die, dum in aperto aere  
 cum amico federet, una post occasum solis ho-  
 ra, hujusmodi stellam conspexere, quæ versus  
 ipsos cursum suum dirigebat, & magnitudine au-  
 gebatur prout ad eos accedebat, donec prope lo-  
 cum in quo considebant, ex oculis evanuit. Ipso-  
 rum vultus, manus & vestes, terra ceteraque  
 objecta circumposita, levi quodam & diffuso lu-  
 mine tunc coruscarunt, at sine ullo crepitu. Me-  
 tu correpti surgunt, in se invicem oculos conji-  
 ciunt attoniti. Tunc famulus ex horto vicino  
 accurrens, ab ipsis quærit num aliquid vidissent;  
 testatur sibi visum esse in horto lumen subitum,  
 & præsertim in aqua micans quam ad irrigandas  
 plantas adhibebat. Quo phænomeno manifeste  
 sese prodit electricitas.

Ignes fatui (*feaux follets*) dicuntur flammulæ  
 erraticæ, quæ æstate præsertim & autumnò pro-  
 pe terræ superficiem in aere discurrunt. Hujus-  
 modi igniculos quasdam esse pingues & viscosas  
 ex-



exhalationes, sed paulo crassiores quam ut al-  
 rius evehantur, plerique Physici conjiciunt ex  
 natura locorum in quibus nascuntur. In locis e-  
 nim palustribus & cœmeteriis conspici solent,  
 in quibus solum vel per se pinguiſſimum sulphu-  
 reumque est, vel propter cadavera quæ ibi se-  
 pultra sunt.

Quidam vero Physici istas flammulas gigni  
 putant a quodam fluido e substantiis omnibus  
 putrefactis exeunte, quod sursum eveſtum per  
 aeris electricitatem inflammatur, quando satis  
 vegeta est. Hujusmodi fluidum ab aliis dicitur  
*air inflammable*, ab aliis vero *gas inflammable*.  
 Cum ignes *fastuos* persequeris, recedunt, quia  
 aerem anteriorem propulſas, a quo repelluntur;  
 si vero eosdem fugias, illico te inſequuntur,  
 quia fugiendo aerem dividis; unde fit ut aer a  
 tergo minus compressus, iis viam faciliorem ape-  
 riat.

#### PARAGRAPHUS IV.

*De Halonibus, Pareliis & Parafelenis.*

**H**Alones a græcis vocantur coronæ quædam  
 lucidæ, quæ stellas, planetas & solem cir-  
 cumcingunt. Eas non ex ipsis siderum atmos-  
 phæris, ut quidam existimant, sed ex eo nasci  
 quod radii luminis atmosphæram terrestrem sub-  
 eundo, certis modis refringantur, sic probat  
 Musschenbroek. 1. Aliquando tantum conspiciun-  
 tur illæ coronæ; si vero ex siderum atmosphæra  
 penderent, sub aspectum frequentissime venirent.  
 2. Nunquam apparent, nisi aer placidus sit &  
 tranquillus; statim atque spirat ventus aliquis,  
 evanescunt. 3. Eas videre, inquit, mihi nun-  
 quam contigit, tempore sereno; sed nonnisi  
 cum in aere fluctuant tenues nubeculæ, aut le-  
 vior nebula. 4. Similes coronas effingere facile  
 est, nempe inter oculum & candelam accensam  
 vas interponendo, aqua calida repletum cujus  
 vapor in sublime feratur: in nostra igitur at-  
 mos-

mosphæra residet halonum causa, a tenuibusque & rarioribus nubeculis videtur repetenda. 5. Eam opinionem confirmat, quod a D. Musschenbroek observatum fuit, mense Decembri ann. 1756. Testatur a se visam esse lunam ingenti corona circumdatam, dum eam aspiceret trans vitra sui conclavis, quæ tenui glacie tunc obducta erant; evanuisse autem illud phænomenum, statim ac fenestris apertis, lunam intuitus est.

Denique eidem sententiæ maxime accommodatum est experimentum quod indicat celeberrimus Boyle: post machinæ pneumaticæ excipulum aere vacuum candelam accensam colloca. In illud deinde aerem revoces, at sensim & sæpe iterando (à plusieurs reprises). Aer ille quadam semper onustus vaporum copia, densitate augebitur qua proportionem in excipulum intromissus fuerit. Postquam quemdam densitatis gradum acquisierit, coronam videbis lumen candelæ ambientem.

Coronæ igitur quæ sidera involvere identidem observantur, pendent a tenuibus vaporum particulis simul collectis, & quorum densitas luminis radiis certo modo refringendis idonea sit.

Parelia ( *Parélies* ) sunt ementiti soles ejusdem, ac verus, magnitudinis apparentis, sed qui lumine debiliori splendescunt, nec figuram habent omnino rotundam. Maxime verisimile est eos nihil aliud esse, quam solis imagines in nubibus congelatis depictas. Ubi enim nubes congelatæ ita disponuntur, ut radios solares excipiant, & versus oculos nostros, speculorum more, regerant; tunc in hujusmodi nubibus exhibentur solis imagines sive spurii soles qui verum æmulantur.

Per hiemem observari solent parelia, tempore frigido, cum paululum gelat, & spirat ventulus e regione septentrionis. Quando evanescent, tunc plere, vel ningere incipit. Maraldi, Krafft aliique multi, inquit D. Sauri, obser-

fervarunt tunc cadere quamdam nivis oblongæ speciem, quæ acus formam exhibet. Ellis & Middleton in America septentrionali deprehenderunt, aerem tunc particulis glacialibus & oblongis abundare, ita ut sub aspectum veniant. Quibus in corpusculis sîram esse pareliorum causam existimant, quia solis radios versus spectatoris oculos reflectunt.

Paraselenæ (*les paraselenes*) a græcis vocantur lunæ imagines in nubibus depictæ. Quod phænomenum ab iisdem causis pendet ac parelia,

## PARAGRAPHUS V.

### *De Iride.*

**I**RIS est arcus varis coloribus distinctus, qui in aere apparet, quando spectator situs est solem inter & nubem ex qua decidit pluvia, ita ut solem a tergo, nubem vero ante oculos habeat. In iride cernuntur colores septem primarii; sed ruber, viridis, cæruleus distinctius quam cæteri. Iris aliquando duplex apparet. Minor quæ in alia continetur, dici solet *interior*; quæ autem major est, vocatur *exterior*. Inter utramque duplex deprehenditur discrimen: 1. interioris colores sunt vividiores; 2. colores in utraque eundem non habent situm. In interiori scilicet color rubeus partem superiorem occupat, & violaceus inferiorem. In iride autem exteriori colorum ordo invertitur, violaceus partem obtinet superiorem.

Unanimi consensu docent Physici recentiores iridis colores oriri ex eo quod luminis radii, aquæ decedentes guttas subeundo, vel ex iis emergendo, diversis modis refringantur & reflectantur. Id inde compertum est, quod ubi fontis salientis guttas ventus dispergit, vel aliquis ex ore aquam in modum pluviae disjicit versus locum soli oppositum, tunc animadversatur

tur arcus, iisdem tinctus coloribus, quos exhibet arcus cælestis. Quamobrem, si forte sub ortum solis virentia prati gramina rore aspersa conspicias, singuli roris globuli ex certo situ & loco spectati, omnes iridis colores referent. Hæc de iride generatim dicta sufficiant. Demonstrationes enim a Mathesi petitas omittimus, utpote plerisque adolescentibus ingratas, neque eorum captui satis accommodatas.

## PARAGRAPHUS VI.

### *De Aurora boreali.*

**A**uroram borealem sic describit D. Para du Phanjas, in opere cui titulus, *Théorie des êtres sensibles*. (Tom. 3. pag. 60.) L'aurore boréale est une espece de nuite transparente & lumineuse, qui paroît de temps en temps du côté du nord, où elle répand au milieu des ombres de la nuit, une clarté plus vive, plus variée, plus intéressante, que celle que nous donne l'aurore même, dont elle a pris le nom. On croit quelque fois qu'un incendie général embrase à la fois toutes les régions situes entre le cercle polaire & le pôle septentrional.

L'aurore boréale ne se montre pas toujours de la même manière, & n'a pas toujours la même figure & la même grandeur. Elle a le plus communément la forme d'un segment de cercle, qui offre à la vue des variétés infinies: tantôt divisée en arcs concentriques de différentes couleurs; tantôt rayée de bandes lumineuses, verticales & paralleles: ici dardant des tourbillons d'un feu plus ou moins vif, plus ou moins pâle: là vomissant des torrens ondoyans d'une fumée plus ou moins sombre, plus moins dense; quelquefois suspendue entre le ciel & la terre; plus souvent appuyée par les deux extrémités de son arc sur la terre, comme sur la base: un jour, fixe & immobile en un même lieu: le lendemain, errante &

ma

*mobile de l'orient vers le couchant, ou du couchant vers l'orient: tantôt stable & invariable dans les couleurs qu'elle étale; tantôt changeant & métamorphosant sans cesse ses couleurs, le pâle en éclatant, le pourpre en violet, le verd en orange, & ainsi du reste.*

Nonnisi ab anno circiter 1716. accurate observari cœperunt auroræ boreales, quæ a Veteribus vix erant cognitæ. Putat illustris D. de Mai-  
ran, superiorem hujus phænomeni extremitatem aliquando supra globum terrestrem 400. vel 500. leucis sese attollere. Ex illa vero altitudine plurimum detrahunt alii auroræ borealis speculatores; sed eam longe altius quam nubes, aliaque meteora sese efferre omnes consentiunt; ita ut interdum 12. vel 15. leucis supra terræ superficiem emineat. Ad explicandum mirabile illud phænomenum, varia Physici systemata excogitarunt.

**SYSTEMA I.** Existimant quidam auroram borealem suam ab exhalationibus nitrosis, sulphureis, bitumineis originem ducere, sicut fulmen aliaque meteora ignita.

*Refellitur hæc opinio:* 1. quia si aurora borealis a præfatis exhalationibus repetenda esset; non minus saltem frequens foret in plagis meridionalibus, quam in septentrionalibus. Priores enim longe copiosius, quam posteriores, exhalationibus nitrosis, sulphureis & bitumineis abundant. Observationibus tamen constat, phænomenum illud in regione meridionali vix unquam apparere, dum frequenter in boreali conspicitur, suamque versus polum arcticum sedem habet, unde modo versus ortum, modo versus occasum plus minusve declinat.

2. Si aurora borealis ex iisdem exhalationibus oriunda esset, ex quibus nascuntur alia meteora ignita, iis longe altius non sese efferret: atqui tamen experientia compertum est meteora ignita nunquam fere ad unius leucæ altitudinem pervenire, dum aurora borealis sæpe 10., 12.,

15. leucis supra terræ superficiem sese attollit.  
**SYSTEMA II.** Nonnulli auroræ boreali eamdem assignant originem ac meteoris quibusdam lucidis, quales sunt iris & coronæ solares. Eam scilicet ortam volunt a radiis solaribus, quos glacies, nivesque septentrionales versus partem atmosphæræ superiorem reflectunt.

*Refellitur illud systema:* 1. Quia si admitteretur, aurora borealis per multos dies continuos quotannis affligeret; 2. quia flammæ & fumus turbines, quos evomit aurora borealis, satis demonstrant inflammari materiam ex qua constat. Absurdum est igitur eam inter lucida tantum meteora recensere; 3. Quia aurora borealis interdum versus septentrionem emicat, dum maxime fervet æstas; id est, eo tempore quo non fere copiosiores sunt glacies & nives congelatæ in regione boreali, quam in meridionali. 4. Meteora lucida nunquam ultra unam vel duas leucas assurgunt; quin etiam nonnisi raro dimidiam, vel quartam leucæ partem attingunt. Contra vero aurora borealis ad maximam altitudinem supra terræ superficiem sese attollit.

**SYSTEMA III.** Auroræ boreali nobiliorem tribuit originem celeberrimus D. de Mairan. Juxta illius opinionem, sol, quemadmodum terra, sua involvitur atmosphæra. Hæc plurimos in conos dividitur, quorum basis in sole sita est, apex vero ad 30000000. leucarum altitudinem profertur. Terra, dum in ecliptica volvitur, identidem quorundam hujusmodi conorum extremitatem offendit, ex iisque vi sua attrahente partes aliquas plus minuve ingentes distrahens, ad se revocat. Partes illæ ex atmosphæra solari avulsæ, sese atmosphæra terrestri commiscunt, in qua eo sustinentur altius, quo leviores sunt. Ibi fermentescunt, & variis lucent ignibus, donec cum aere terrestri omnino permixtæ, suam exuerint naturam primigeniam.

*Refellitur hæc hypothesis:* 1. Gratis fingitur hæc atmosphæra solaris innumeros in conos distribu-

tributa, ad tantamque distantiam producta, nullum in ipsius gratiam affertur argumentum satis firmum. Præterea quam singulari lege contigit, ut in conos a se invicem disjunctos divideretur? cur circa solem per orbem concentricos non diffunditur, sicut aeris atmosphæra circa globum terrestrem? 2. Esto suam habeat sol atmosphæram, in conos lucidos partitam, ad immensumque intervallum protensam: undenam fiet illius portiones per globi terrestris attractionem distractæ, non reperiantur nisi in regione septentrionali? numquid polus australis & æquator nunquam prædictos conos offendunt? vel cur sibi non retinent partem quam ex iis vi sua attrahente divellunt?

**SYSTEMA IV.** Alii cum doctissimo Musschenbroek Physici sentiunt, auroram borealem ortum ducere ex nonnullis exhalationibus, e regione septentrionali, cui propriæ sunt, fursum erumpentibus. Qua in hypothesi satis ingeniose explicantur auroræ borealis phænomena. 1. Aurora borealis a fulmine dissimilis nullam fregoriam habet sibi adjunctam; quia scilicet materia ex qua componitur, minorem ignis copiam continet, minusque fervoris concipit, quam ea unde fulmen coalescit.

2. Aurora borealis nullibi fere sese conspicendam præbet, nisi in plagis septentrionalibus. Ratio est, inquit, quod loca meridionalia non satis materiæ procreando huic phænomeno idoneæ contineant. Id mirum magis videri non debet, quam quod nonnullis in locis existant auri vel argenti fodinæ, non vero in aliis. Non ubique enim eadem sunt globi terrestris proprietates & exhalationes. *Non omnis fert omnia tellus.*

3. Auroræ boreales nec periodicæ, nec multum frequentes sunt, præsertim splendidiore. Materiæ enim ad illas generandas destinatæ, ut e terræ visceribus erumpant copiosius, nonnullas requirunt circumstantias, quales sunt

subterraneæ quædam conflagrationes, quidam terræ motus.

4. Aurora borealis longe altius sese attollit, quam alia meteora vel lucida, vel ignita; quia scilicet, inquit, exhalationes ex quibus nascitur, multo sunt leviores, magisque tenues & volatiles; unde fit ut longe majorem in atmosphæra altitudinem obtineant, ibique sustineri possint. Juxta accuratiores observationes, atmosphæra terrestris ultra 15. aut 16. leucas non producit. Materiæ ergo quibus gignitur aurora borealis, quæcumque sit ipsarum natura, ad majorem altitudinem pervenire nequeunt. Si quando videantur ulterius affurgere, maxime probabile est nonnisi apparentem esse hanc altitudinem, cui locum præbent nonnullæ refractiones, quæ oculis illudunt.

5. Aurora borealis in ignis, flammæ & fumi turbines erumpit. Illud inde contingit, quod exhalationes, quibus suam debent originem, secum invicem fermentescant, sicque magis vel minus inflammantur.

**SYSTEMA V.** Opinantur plurimi nostræ ætatis Physici, non aliam esse auroræ borealis causam, quam materiæ electricæ inflammationem. Nullus est qui non fateatur, in omnibus corporibus, ipsoque aëre, ingentem esse hujus materiæ copiam, eamque vel levissima collisione inflammari posse. Qua de opinione sic habet nobilis Physicus D. Brissot: *Ont-ils raison? c'est ce que je n'oserois décider, quoique je sois très porté à être de leur avis. On a observé que l'aurore boréale..... électrise des pointes isolées, placées dans des tubes de verre. M. Mesfrier assure même avoir entendu un petillement ou bruit semblable à celui des étincelles électriques. Diction. de Phys. tom. 1. pag. 194. & 195.)*

Verum quidem est in atmosphæra residere fluidum electricum, cujus effectus non videntur ab iis discrepare, quos exhibet aurora borealis.



ils. Sed idcirco non licet colligere eandem esse materiam electricam, ac eam quæ phænomenum de quo disputamus procreat. Alioqui nonne frequentius contingerent auroræ boreales? Nulla visa est in Batavia ab anno 1619. ad annum usque 1716.; numquid tantum temporis spatium effluxisset, ut notat Musschenbroek, si auroræ borealis causa in fluido electrico esset constituta? præterea nonne in Gallia & Italia tam frequens esset illud phænomenum, quam nostris temporibus in Hollandia & Germania? In prioribus enim locis non minus electricus est aer quam in posterioribus.

## DISSERTATIO III.

*De variis Corporum terrestrium speciebus.*

**C**orpora terrestria tres in classes distribuuntur, quarum prima, fossilia; secunda, vegetantia; tertia, animalia complectitur. De animalibus nihil dicturi sumus. Accurata enim corporis, sive belluini, sive humani, descriptio ab Anatomicis petenda est, non a Physicis.

## CAPUT PRIMUM.

*De Fossilibus.*

**F**OSSILIA dicuntur ea corpora, quæ in terræ visceribus formantur, ex illisque eruuntur. Præcipua sunt otea, sales, lapides, gemmæ, metalla.

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Oleis.*

**O**leum generatim est succus quilibet pinguis. Videtur constare quibusdam partibus ramosis, secum invicem implexis, & quæ igneis

corpusculis abundant. Hinc intelligitur cur oleum sit ad inflammationem expeditum, cur tenaciter aliis corporibus adhaereat. Duplex potissimum est oleorum genus, *sulphur* nimirum & *bitumen*, de quibus leviter differemus, ea contrahendo quæ a probatissimis Scriptoribus fusius exposita sunt.

### De Sulphure.

Sulphur substantia est solida, insipida, ad inflammationem prompta, & friabilis. Ubi in vase clauso igni subicitur, primum liquefit, deinde abit in pulverem splendidum & flavum. Igni aperto expositum facile accenditur, & flammam emittit cæruleam, quæ vaporem expirat ita acrem, ut animantia præfocare valeat. Sulphur reperitur variis tinctum coloribus, diversisque donatum figuris. Aliud est opacum, aliud translucentum. In terræ visceribus inveniri solet, particulis junctum metallicis. Frequentius extrahitur e montibus, qui ignes, cineres, &c. evomunt. Cum omnibus pene substantiis per fufuram sese intime jungit. Metalla dura, qualia sunt ferrum & cuprum, cum sulphure copulata promptius liquefiunt. Contra vero metalla mollia, ut plumbum & stannum eidem sociata, longe difficilius liquefiunt. In variis artibus multiplex est sulphuris usus. Ipso utuntur opifices gallice dicti *Bonnetiers* & *Gaziers*, ut pannos mudent laneos & sericos. Ad hujusmodi vero usum inflammari debet, & vapor ipsius pannorum maculas detergit & absumit. Hujus etiam ope dolia purgantur, aer pestilens depellitur, mures & insecta noxia interimuntur. Non sine sulphure sunt pulvis pyrius, & ignes artificiosi.

*De Bitumine.*

Bitumina sunt substantiæ minerales, ad inflammationem paratissimæ, quæ multum odoris effundunt: dum cremantur, fumum emittunt densissimum, postque deflagrationem plurimum carbonis relinquunt. In vase clauso igni subiecta, primum liquefiunt, deinde materiam oleosam deponunt, quæ in ipsorum compositionem venerat. In terræ sinu reperiuntur modo solida, modo liquida.

*De Bituminibus solidis.*

Bitumina solida sunt electrum (*l'ambre*), succinum (*le succin*), gagates (*le javet ou jais*), carbis fossilis (*le charbon de terre*), & asphaltium (*l'asphalte*.)

*De Electro.*

Varia sunt electri species, quæ nonnisi colorum discrimine a se invicem discrepant. Ea est opinio generalius recepta, electrum esse inter vera bitumina recensendum. Quæ de re vix ac ne vix quidem dubitari potest, ex quo artis Chymicæ peritissimi per analysim ex electrico eadem eduxerunt principia, quæ e bituminibus extrahuntur. Diversi generis substantiæ, quas habet sibi commistas, satis probant illud in statu molliæ aliquando extitisse. Vulgarius est cinereum (*l'ambre gris*.) Censet D. Geofroi, illud esse quoddam bituminis genus e sinu terræ in aquas marinas effluentis; primo liquidum, deinde sensim densatur. In maris littoribus reperiri solet, nunc majori, nunc minori mole. Interdum tanti ponderis est, ut ducentas libras superet. Cujus rei luculentum testem habemus D. Valmont de Bomare, cujus ista sunt verba: *Nous avons été requis en 1761. par un Négociant de Marseille*

le, de nous transporter dans l'endroit où l'on a-  
voit fait venir une pièce d'ambre gris du poids  
de deux cens vingt-cinq livres, afin de l'exami-  
ner. . . . Ce beau & rare morceau a été vendu  
cinquante deux mille livres. (Dict. de Physiq. 3.  
édit. tom. I. pag. 172.) Electri hujus fragmen-  
ta plerumque sunt rotunda; quam formam in-  
duunt, dum in mare aut supra litus volvuntur.  
Plurimum electri hujus invenitur in maribus In-  
dicis, prope insulas gallice dictas, *les Moluques*,  
*les Maldives* & *Madagascar*. Sæpe etiam colli-  
gitur in oris Africæ. Illud autem modo quodam  
singulari exquirunt incolæ insularum, quæ appel-  
lantur *Sambales*, nempe odoratu, sicut feras in-  
sequuntur canes venatici; scilicet post tempesta-  
tes, ad litus accurrunt, & si quid electri illuc  
jactatum fuerit, ipsius odorem percipiunt. Quan-  
do perfricatur electrum, paleas aliæque corpora  
leviuscula ad se trahit; quæ proprietas dicitur  
*vis electrica*. Igni expositum, facile liquefcit,  
flammamque concipit. Electrum ad ceræ signato-  
riæ compositionem adhibetur.

#### De Succino.

Succinum est bitumen durum, plus minusve  
perlucidum: maximam habet cum electo cognat-  
ionem, cujus quædam est species. Idcirco vo-  
cari solet electrum flavum (*ambre jaune*) vel  
linguæ Persicæ *karabê*, quod nomen idem sonat,  
ac *paleas attrahens*. Quando enim perfricatur,  
paleas aliæque corpuscula ad se allicit. Hoc bi-  
tuminis genus in oris maris, Bæltici colligitur.  
E sinu etiam terræ variis in locis extrahitur,  
in Prossia, in Germania, in Polonia, in nonnul-  
lis Provinciæ montibus.

Succinum a prima statim origine liquidum,  
vel molliculum fuisse ex eo constat, quod sibi  
implicita & involuta contineat varia insecta,  
lapidum particulas, aliæque corpuscula. Eum-  
dem quem achates (*l'agate*) nitorem suscipit.

Id-

Idcirco priusquam in usu essent adamantes, & alia gemmae, quas luxuria nostra sufficit: utraque India, magno pretio habebatur succinum. Ex eo altarium; ex eo muliebris sexus ornamenta petebantur exquisitiora. Edimburgi in Scotia recens compertum fuit, succini vaporem, muribus ita esse infectum, ut eos ex apothecis (*magasins*) etiam vastissimis expellat. Adhibetur etiam succinum in conficiendo eo liquore, quibus splendorem inducit, & gallice dicitur (*vernis*.)

### De Gagates.

Gagates (*jayet ou jais*) bitumen est solidum, ficcum, collucens, & coloris nigerrimi. Sat firmitatis habet, ut expoliri queat, & incidi. Gagates igni subjectus, flammam concipit. Si perfricetur, levissima corpuscula attrahit, & carbonis odorem effundit. Præ aliis æstimari solet qui ex Ducatu Wirtembergensi, & Comitatu Fofensi (*Comté de Foix*) adducitur. Non multum in terra depressus reperitur. Ex eo sunt armillæ, inaures, alique ornatus lugubres (*de deuil*) Quamquam satis densus sit, nihilominus ita levis est, ut aquæ supernatet.

### De Carbone fossili.

Carbo fossilis (*charbon de terre ou de pierre*) bitumen est nigrum, foliaceum, ex terra, lapidibus & sulphure simul permixtis concretum. Cum accenditur, calorem generat, eo vegetiorem & diuturniorem, qui a ligno inflammato nascitur: carbonem fossilem ex arboribus terræ jamdudum sepultis primam originem ducere, existimant quidam Physici, inter quos eminet D. de Buffon. In locis, inquit, ubi existunt hujus carbonis fodinæ, ad certam altitudinem reperiuntur arborum resinosarum silvæ, quæ aliqua globi nostri conversione humo fue-

runt obrutæ. Temporis vero lapsu contigit, ut arbores illæ in materiam terrenam conversæ fuerint, & resina, quam suam ante resolutionem continebant, imbutam. Deinde accesserunt sulphur aliæque substantiæ bituminosæ. Ex his omnibus simul coagmentatis prodixit carbonem fossilem censent non pauci Historiæ naturalis Scriptores. Verum quidem est fossiles quosdam carbones suum ex arboribus ortum ducere, id autem de omnibus pronuntiari posse negat D. Bertrand in exquisito de fossilibus Dictionario universali, ubi sic statuit: *C'est une erreur que de croire que tout charbon fossile soit du bois décomposé, changé en limon & pénétré de pétrole, de bitume, de vitriol & de soufre. Il paroît plutôt que ce sont des couches de matières limonneuses, argilleuses, marneuses qui ont été plus ou moins pénétrées de mofettes, de vapeurs sulphureuses, & de sucs bitumineux & pétroliques. . . . Comment concevoir que des couches qui ont jusqu'à 40. & 45. pieds de hauteur, & une étendue de plusieurs lieues, ne soient que des arbres décomposés? on trouve des couches qui n'ont que quelques pouces d'épaisseur, mais très étendues: seroit-ce encore une forêt abymée, & des arbres détruits? on rencontre des lits, posés les uns sur les autres, avec des couches intermédiaires, de roc, de terre, de gravier. Etoit-ce donc des forêts qui ont végité les unes sur les autres? (Diction. univ. des Fossiles. Art. CHARBON FOSSILE.)*

Hujus carbonis fodinæ aliquando flammam ita concipiunt, ut ignis extingui nequaquam possit. Multæ sunt in diversis Angliæ locis, quæ plurimis ab annis incenduntur. Hujus conflagrationis exemplum insigne suppeditat Germania. Carbonis fodina prope urbem Zwickau in Misnia, ineunte sæculo proxime elapso cœpit inflammari, & nondum desit. Inflammationem hanc excitare possunt vel fossorum lampades, quæ vaporibus e fodina erumpentibus admotæ, eos incendunt, vel humor ipse aqueus; sunt quip-

quippe carbonēs fossiles, qui postquam maduerunt, post certum tempus inardescunt. Natra enim *Urbanus Huerne*, Suecus doctissimus, Holmiae (à *Stokholm*) contigisse incendium, cui locum dederant huiusmodi carbonēs. In navi felicet, quæ eos advexerat, madefacti, in loco ubi congeſti fuerant, paulo post conflagrarunt.

Quibusdam in fodinis carbonum sese attollunt exhalationes, quarum nomina sunt seu *brisson*, *terou* ou seu *soupage*. Non minus terribiles quam singulares effectus procreant. Vapor ille e rimis subterraneis exsilit sibilans. Oculis sese conspicuum præbet, & formam induit telarum araneæ, vel filorum albicantium quæ per aera, exeunte æstate, volitant. In eo nihil est periculi, quando in locis subterraneis aer libere expatriatur. Ubi vero hic vapor, vel ista materia non satis fuit aere divisa & extenuata, tunc opificum lampadibus incenditur, eisdemque effectus gignit, ac tonitruum & pulvis pyrius.

Periculosis iis effectibus sic occurrunt opifices; albicantia hæc fila diligenter observant, quorum audiunt sibila, & quæ e fissuris vident erumpere. Ea corripunt priusquam ipsorum lampadibus inflammari potuerint, suasque inter manus conterunt. Quando nimia est huiusmodi filorum copia, haud mora lumen extinguunt, ad terram se abjiciunt, suisque clamoribus monent socios, ut pariter se humi sternant. Tunc materia quæ flammam concepit antequam lampades extinguere potuerint, supra eorum dorsa transit, & iis tantum nocet, qui eandem non adhibuerunt cautionem; istis vero plurimum est periculi ne pereant, vel lædantur.

Quando hujus naturæ vaporibus obnoxia sunt carbonum fodinæ, in eas non sine gravi periculo descenderent operarii, maxime si per unam diem in iis interruptus fuerit labor. Materia enim sese aggregavit, quo tempore nulla fuit in aere subterraneo commotio. In Anglia & Scotia sic depellitur omne periculum: operarius quidam

dam vestimentum induit cui nomen *pastos*, ex tela cerata (*cirle*) vel pannis madidis confectum. Ipsum caput obvolvitur, in eoque duo tantum sunt foramina vitrea quæ oculis respondent. Homo ille longam manu tenet perticam (*perche*), cujus extremitati aptatum fuit lumen. Statim atque descendit, toto corpore humi sese fundit. Quo in statu reptabundus progreditur, eique loco suum lumen admovet, unde vapor exit. Hæc materia subito inflammatur, & quidem cum fragore tonitruo non absimili, & per unum e puteis foras erumpit. Quo facto, nihil periculi habet descensus in fodinam. Rarissime contingit ut aliquid mali patiat operarius qui vaporem incendit, modo humi omnino prostratus jaceat: totus enim subterranei illius tonitruus impetus in partem fodinæ superiorem fertur.

Cum fossa carbonariæ fodinæ prope urbem *Workington* (dans le Comté de Cumberland) posita, tetrum afflaret odorem, operariis vetitum fuit ne ibi laborarent. Dum vero in eam descenderetur cum candela quæ in laterna erat inclusa, ad explorandum undenam exiret vapor ille, statim in flammam erupit, cum tanto fragore, ut auditus fuerit ad distantiam usque sex leucarum. Quo in casu sex homines vitam amittere; e spectatoribus quos eo loci curiositas adduxerat, plurimi laesi fuerunt. (*Gazette de France, Août 1770.*)

### De Asphaltis.

Asphaltium (*asphalte*), aliter dictum modo *bitume de Judée*. modo *karabé de Sodome*, modo *gomme des funkraibles*, bitumen est solidum, friabile, coloris nigri. Igni expositum liquefcit & inflammatur. Nomen *asphaltis* habet, ex eo quod in superficie maris mortui, vel lacus *Asphaltitis* in Judæa colligi soleat. Eandem ob causam vocatur *karabé de Sodome*. Nemo quippe nescit mare mortuum locum esse, in quo olim  
sitæ



ætæ erant infames urbes Sodoma & Gomorrha. Collectio igitur asphaltii quæ in ejusdem nominis lacu fit singulis annis, perpetuum est vindictæ monumentum, quam Deus a flagitiosis illis urbibus olim exegit.

Dictum autem fuit *gomme des funérailles*, quia in condiendis pauperum cadaveribus eo uti Judæi consueverant. Hoc bitumen molle est, viscosum & tenax, quando e mari extrahitur; sed brevi densatur, fitque solidum. Illud, dum adhuc liquidum est, adhibent Arabes ad illinendas (*pour goudronner*) suas naves. Affirmant Veteres eodem bitumine connexos (*cimentés*) fuisse lapides moeniorum famosæ Babylonis. Bitumen Judææ in eam compositionem medicam admittitur, gallice dictam *la grande thériaque*.

E visceribus etiam terræ extrahitur illud bituminis genus. Prima illius fodina quæ in Europa fuit reperta, ea est quam D. de la Sabloniere detexit in Novo-Castro apud Helvetios (*à Neuf Châtel en Suisse*), alteram invenit in Alsacia inferiori. Duæ aliæ recens in Gallia cognitæ sunt, prope Aquas Augustas (*Dax*) in Vasconia. Ex illo bitumine cum decima picis parte commisto coalescit mastiche aquis impenetrabilis, & usus maxime diuturni, modo solis ardori extra aquam non sit exposita: alioqui remollesceret, & a lapide sese disjungeret. Anno 1743, adhibita fuit ad reficiendum majorem horti regii alveum (*le principal bassin*), qui ex eo tempore nihil detrimenti expertus est.

Detegendæ in Alsacia asphaltii fodinæ locum dedit fons cujus aquæ, licet claræ & limpide, picis odorem reddunt, propter bitumineas quibus abundant particulas. Testantur hujus loci incolæ id fontis illius aquis proprium esse, ut alvum liberam efficiant, & famem (*appétit*) excitent. Supra earum superficiem singulis momentis sese attollunt bitumen nigrum, & oleum rubrum, quæ per æstatem copiosius innatant, quam

quam per hiemem. Horum quotidie colligi possunt duodecim librę. Hęc fodina sex leucas in orbem (*à la ronde*) complectitur. In ea reperiuntur venę asphaltii, quę nonnullis in locis habent crassitudinem sex pedum. Alię ad triginta, alię ad sexaginta pedum altitudinem sunt depressę.

### *De Bitumine liquido.*

Bitumen liquidum suam videtur originem ducere ex bituminum solidorum dissolutione, seu quodam esse distillatio olei bituminum, per terrę & saxorum fissuras defluentis. Idcirco *petroleum* vocitari solet. Cum omnis coloris expers est, dicitur *naphta clair*, vel *pétrole blanc*; tale est petroleum Ducatus Mutinensis (*Duché de Modene*) e regione Montis Apennini. Quando coloris est rubri ad fuscum accedentis, tunc appellatur *huile de Gabian*, a nomine vici, prope Biterras in Occitania (*Beziers en Languedoc*), ubi e quarundam rupium bituminosarum rimis elabitur. Quando petroleum nigrum vel fuscum est, tunc nuncupatur *huile minerale d'Ecosse*, quia colligitur in quodam hujus regionis fonte. Circa petroleum nonnulla facta sunt experimenta, e quibus præcipua seligemus: 1. Candela æqualibus petrolei & resinę partibus composita, in aqua non extinguitur. 2. Ubi petroleum in vase inclusum igni subjicitur, vapor inde avolans quamdam efficit atmosphæram, quę in flammam subito erumpit, quando ipsi admovetur candela ad 3. pedum distantiam. 3. Aqua oleum illud inflammatum non extinguit, sed cum strepitu sese attollere cogit. Lignum, ellychnia in hocce oleo cum aqua permixto comburuntur. 4. Unica ipsius gutta in aquam stagnantem affusa, supra illius superficiem quaquaversum sese ultra sexpedam expandit, & diffunditur; quo in statu vividos iridis colores exhibet; mirabilis profecto est tanta hæc diffusio.

Pe-

Petroleum fuisse ignis Græcanici ( *du feu Grægeois* ) partem inflammabilem vulgo censetur.

Fons Biterris proximus, de quo supra diximus, trecentas vel quadringentas petrolei libras quotannis suppeditat, olim vero tria millia & amplius dabat. Ad illuminandum adhibetur. Nihil quidem illud bitumen in Persia, multisque aliis locis, & præsertim in urbe dicta *Backu* prope mare Caspium. Ibi tantum fit petrolei commercium, ut Princeps inde jure regali ( *de droit régalien* ) centum millia librarum Francicarum percipiat. Ibi etiam ligni locum tenet, quod isto modo fieri solet; in camini focum ( *Pâtre de la cheminée* ) injiciuntur duo tresve terræ pugilli ( *poignées* ), in eam affunditur petroleum, Deinde cum palea incenditur, & statim micat flamma satis vivida. Quo magis agitur & vertitur terra hujusmodi oleo imbuta, eo vehementius comburitur.

## ARTICULUS II.

### De Salibus.

**S**alis nomine intelligitur substantia in aqua solubilis, quæ linguam pungit. Variæ sunt salium species. Alii dicuntur *acidi*, alii *alkalici*, alii *minerales*, alii *vegetales*, alii *fixi*, alii *volatiles*.

Quæres 1. quinam sint sales *acidi*, *alkalici*, *fixi* & *volatiles*.

Resp. Sales *acidi* constant lamellis rigidis, ex utraque parte extrema acuminatis, ex utroque latere secantibus. Quæ figura ipsis tribuitur, quia illius ope variæ hujusmodi salium proprietates varique effectus satis commode explicantur.

Ea est, v. g. salis proprietas, ut corpora quibus injectus est putrescere non sinat. Sic carnes & alia quæ facile corrumpuntur, ubi sale

ea, qua par est, copia fuerunt conspersa, diffusissime citra putrefactionem servantur. Carnes scilicet vitiantur, cum aeri exposita, ejus calore seu motu vehementiori sic afficiuntur, ut earum partes motum illum concipiant, & paulatim divellantur; unde fit ut per aera volitando nares subeant & nervos olfactorios ita concutiant, ut in mente tetri odoris sensum excitent. Ubi vero rigida & acuta salium particulae instar clavorum intra carnis partes defiguntur, easque arctius inter se conjungunt, ipsas ab aeris assultibus tutas praestant. Quam ob causam caro salia, non modo non putrescit, sed etiam indurescit; quia nimirum fieri nequit, ut rigidis salium particulis undique sit obstita, quin durior evadat. Quemadmodum autem obstant sales ne caro ut aeri corrumpatur, sic caro quominus sal quo referta est, aeris humiditate liquefiat, impedit; quia particulas salinas *poris* suis alte insertas retinens, eas ab aeris humore defendit.

Sales *alkalici* concipiuntur quasi corpuscula dura, plurimis pertusa meatibus, in quibus acidorum mucrones, veluti in vagina quadam excipiuntur.

Sales *alkalici* suum nomen ex eo habent, quod extrahi soleant e plantis quae *kali*, gallice *soudes* vocitantur, vel ex aliis similibus. Res ita fieri consuevit: comburuntur ejusmodi plantae, earumque cineres in vase ponuntur, cujus fundus exiguis foraminibus est pertusus. Deinde in eos cineres affunditur aqua, quae sales in ipsis dispersos solvit, quibus onusta in alio vase recipitur. Istud vero igni imponitur, donec aqua in vapores abierit, ita ut sales in imo vase remaneant.

Sales *fixi*, ii sunt qui in vapores solvi nequeunt, quicumque ignis adhibeatur. *Volatiles* autem dicuntur illi, quos dissipat calor vel moderatus.

Quaeres 2. quinam sales vocentur animales.

Resp. Ii sunt qui ex animalium urina, excre-

men-

mentis & aliis partibus extrahuntur. Inter eos principem locum obtinet sal ammoniacus, qui in Ægypto sic paratur: variorum animalium excrementa comburuntur, eorumque fuligo in vitreis & ingentibus folliculis colligitur; quibus igni impositis, sublimatur sal ammoniacus, & folliculorum parietibus adhæret. Ea de re sic habet D. *Valmont de Bomare* in suo Historiæ naturalis exquisito dictionario.

D. *Affelquist* in descriptione e Cairo (*du Caire*) urbe Ægypti, ad regiam Sueciæ Academiæ missa, narrat ab Ægypti pauperibus diligenter colligi quadrupedum stercorea, & hominum etiam excrementa, per quatuor priores anni menses. Si molliora sint, iis paleam minutatim seorsam commiscent; deinde ea solis ardori juxta parietem aliquem exponunt, donec siccata fuerint, & foco idonea. En lignum quo utuntur pauperes, & mediocris etiam fortunæ homines. Fuliginem (*la suie*) ex combustis illis stercoreibus prodeuntem salis ammoniaci fabricatoribus divendunt. Tanta est illius copia, ut singulis annis ex Ægypto in alias regiones exportentur 700000., & amplius, librarum salis ammoniaci. Ita D. *Valmont de Bomare*.

Cum maxime penetrans sit sal ammoniacus, plurimum in arte medica utilis est, ad incidendos & attenuandos humores nimium pingues & viscosos. Magni etiam est usus in multis aliis artibus.

Quæres 3. undenam extrahantur sales vegetales, & quotuplicis sint generis.

Resp. Sales vegetales e plantis extrahuntur, duplicisque sunt generis, alii nempe *lixivii*, qui per lixiviam eodem obtinentur modo, quo sales *alkalici* de quibus supra dictum fuit; alii *essentiales*, qui tritu exprimuntur: scilicet postquam contritæ fuerunt plantæ, aquis immerguntur. Aqua post tempus aliquod e vase inclinato funditur, & succus per compressionem extractus in vase recipitur. Ut succus ille in va-

pores

pores abeat, vas igni exponitur, donec in succi superficie deprehendatur pellis tenuissima. Quibus peractis, in locum frigidum vas transferatur, & paulo post sales *essentiales* instar crystallorum concresecunt.

Quæres 4. quid & quadruplex sit sal fossilis.

Resp. Sal fossile; seu minerale, illud est quod e terræ visceribus & fodinis eruitur, qualia sunt sal gemmæ, nitrum, vitriolum, alumen.

Quæres 5. unde suum nomen habeat sal gemmæ, & quæ illius natura.

Resp. Inde suum habet nomen, quod in fodinis instar gemmæ perluceat. Eiusdem est naturæ ac sal marinus. Uterque cum sit usus maxime vulgaris, dicitur *sal communis*. In diversis orbis partibus variæ sunt salis gemmæ fodinæ. Sed illæ potissimum celebrantur quæ in Polonia existunt; e quibus sal educitur ab anno 1252. Sitæ sunt in Pago Wilska, quæ a Warsavia quinque stadiis distat. Altitudinem habent plusquam 100. sexpedarum, longitudine & latitudine urbes superant amplissimas. In iis tantus est operariorum numerus, ut subterraneam quasi Rempublicam efficiant; quæ suos habet duces, suas leges, suam politicam disciplinam (*sa police*). Plurimis viis latissimis perviæ sunt; sua est cuique fossori easula. Homines videas, qui ibi nati & educati, inde nunquam exierunt. In iis fodinis paratum fuit sacellum in quo divinum celebratur officium. Subterranea hæc loca interfuit rivus copiosus aquæ dulcis & frigida. Salis fornices columnis ejusdem materiæ sustententur. Faces innumere, quarum lumen circumquaque reflectit crystallus, fulgorem spargunt splendidissimum. Ex iis fodinis educuntur quotannis circiter 60000000. librarum salis.

Quæres 6. quomodo extrahatur sal marinus?

Resp. Sales ab aquis marinis duplici potissimum modo segregantur. In eum usum plerumque adhibetur solis calor æstivus. Ita fieri consue-

suevit in Armorica inferiori, & Alnetensi Tractu (*dans la Basse Bretagne, & le pays d'Aunis*): scilicet prope maris litus excavatur fossa, quæ formam exhibet gallice dictam *quarré long*. Hæc interius obducitur argilla, ut aquas intromittendas retinere possit. Aquæ marinæ in fossam deducuntur, & radiis solaribus expositæ in vapores abeunt, in ipsiusque alveo deserunt salium crystallos, quæ confringuntur. Postquam inde extractæ fuerunt, supra terram siccam in acervos aggeruntur, donec humore guttatim stillante, exsiccatae fuerint. In Lotharingia vero & Burgundiæ Comitatu (*la Franche Comté*), res aliter geritur. Aquæ e fontibus vel puteis salariis eductæ, in amplissima caldaria (*chaudieres*) conjiciuntur. Deinde igni expositæ, in vapores resolvuntur, saliumque massam in fundo vasis dimittunt.

Quæres 7. unde & qua arte sal nitrum (*salpêtre*) extrahatur.

Resp. Sal nitrum *vegetale* est ac *minerale*. In quibusdam Indiæ locis reperitur penitus formarum instar crystalli. E terræ ac lapidum superficie tollitur. Non parum ejusdem salis plurimæ suppeditant plantæ. Sed nullibi copiosius invenitur, quam in locis depressis & humidis, qualia sunt cellæ vinariæ, stabula, latrinæ, & generatim omnia, sive hominum, sive animalium domicilia.

Sic autem obtineri solet: postquam veterum ædificiorum rudera fuerunt contrita, cum æquali circiter ligneorum cinerum quantitate permiscuntur. Deinde conjiciuntur in dolia quæ juxta eandem lineam posita sunt. Uniuscujusque dolii fundus inferior foramine est pertusus, quod paleis partim obturatur. In primum dolium aqua infunditur, quæ solutis salibus sese onerat, & in aliud vas subiectum defluit. Eadem hæc aqua in alia successive dolia transfunditur, & sese magis ac magis salinaceis particulis saturat. Hujusmodi lixivium in amplissima defun-

Funditur caldaria cuprea, quæ ignibus imponuntur donec aqua in vapores abierit. Postea frigidum in locum transferuntur, ubi sal nitrum instar crystalli concrescit.

Sal nitrum maximi est usus in conficiendo pulvere pyrio, in aqua forti, in aqua regali, & in quorundam metallorum conflatione (*fonte*). In arte etiam medica frequentissime adhibetur; temperat enim nimium sanguinis æstum, febris cujuslibet fervorem, & urinæ ardorem.

Quæres 8. quid sit vitriolum?

Resp. Vitriolum est sal mineralis, qui multiplici lotione, percolatione, & vaporazione, e quadam *marcassita*, seu *pyrite* secernitur. *Marcassitas* vocant Arabes lapides, qui terram, sulphur, sales & particulas metallicas continent. A Latinis autem dicuntur *pyritæ*. Vitriolum constat phlegmate, seu liquore insipido, partibus sulphureis, sale acido, terra, & ferri vel cupri corpusculis; siquidem hæc elementa e vitriolo educunt Chymia periti. Quatuor sunt vitrioli species, nimirum viride, subviride, cæruleum & album. *Aqua fortis* ex æquis vitrioli & nitri partibus conficitur. Hæc ferrum; cuprum, argentum dissolvit; in aurum vero nihil valet. Metallum illud solvitur *aqua regali*, quæ ipsa est aqua fortis, cui additum fuit sal ammoniacum.

Quæres 9. quid & quotuplex sit alumen (*l'alun*).

Resp. Alumen est sal fossilis & mineralis, qui in terra delitescit. Duplex distingui potest, nimirum *naturale* quod hodie vix cognoscitur, & cujus apud Veteres frequens erat usus; alterum *factitium* quod multis præparatur operationibus. Istud etiam duplex præsertim distinguitur. Aliud dicitur *alun de roche*, quia crystallos efficit crassæ molis: in Gallia paratur prope montes Pyrenæos. Aliud vocatur *alun de Rome* & invenitur in vicinia urbis *Civita Vecchia*. Educitur ex quibusdam lapidibus candidis, qui post-



postquam in calcem versi fuerunt, in acervos congeruntur, & aqua irrigantur, donec in pulverem abeant: tunc in aquam conjiciuntur, postque vaporationem efficiunt crystallos sat perlucidas & coloris subrubei.

Alumini insita est vis quædam astringens. Quam ob causam lanæ ab insectoribus (*les teinturiers*) imbuuntur alumine soluto, ut colores servant tenacius. Chartæ etiam, nisi aquæ aluminosæ immergantur, atramentum non retinent, sed transmittunt. Inservit etiam alumen diluendis liquoribus (*à clarifier les liqueurs*). Præterea cum spiritu vini aliisque liquoribus permiscetur in quibus servantur animalia, ut scilicet suos retineant colores.

Quæres 10. quid & quotuplex sit sal tartari (*sel de tartre*).

Resp. Extrahitur e fecce vini (*tartre*) quæ doctis adhæret. Ex ea duæ salis species educuntur; alius dicitur *essentialis*, alius autem *alkalicus*. Ad obtinendum salem *tartari essentialem*, quædam fecis copia in aquam ebullientem conjicitur, ut in ea solvi possit. Quæ solutio percolatur, & recipitur in vase ignibus subjecto, ut dimidia liquoris pars in vapores abeat. Deinde vas frigido in loco ponitur, & paulo post apparent crystalli vasis parietibus adhærentes. In iis crystallis consistit sal *tartari essentialis*.

Quomodo præparetur sal tartari *alkalinum*, sic indicat D. Sigaud de la Fond:

*On renferme le tartre, tel qu'on le retire des tonneaux, dans des cornets de gros papier mouillé. On met ces cornets dans un fourneau, lits par lits, avec du charbon, & on y met le feu. On laisse brûler le tout, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de fumées capables de noircir..... Le tartre étant suffisamment brûlé, il faut en faire la lessive jusqu'à ce que l'eau soit insipide, filtrer ensuite, évaporer, dessécher & calciner le résidu; & on obtiendra alors le véritable sel de tartre, ou l'alkali fixe végétal.*

Ce sel a la plus grande affinité avec l'eau. Il s'empare de celle qui voltige dans l'atmosphère, & il passe alors de l'état concret à celui de fluor, & forme ce qu'on appelle l'huile de tartre par défaillance, ou per deliquium. Lorsqu'on veut se procurer une grande quantité de cette huile, on n'attend pas que l'humidité de l'air ait fait fondre le sel de tartre. On bâte cette opération de différentes manières, en employant la quantité d'eau requise pour fondre la masse du sel qu'on veut faire tomber en défaillance; & c'est de cette manière que se fait l'huile de tartre qui se trouve dans le commerce, & qu'on appelle d'autant plus improprement huile de tartre, qu'elle n'a aucune des qualités qui conviennent aux huiles; & que d'ailleurs il y a véritablement une huile de tartre bien différente de celle-ci, celle qu'on peut retirer & qu'on retire effectivement du tartre, lorsqu'on le soumet à la distillation. (Diction. de Phys. tom. IV. pag. 333. & suiv.)

## ARTICULUS III.

### De Lapidibus.

**L** Apides formantur alii arenulis & succis quibusdam oleosis; hujusmodi sunt ii quibus sterni solent urbium vici (*les rues*). Si enim mallei ictibus conterantur, in pulverem abeunt arenæ simillimum. Præterea si invicem collidantur, sulphureum emittunt odorem; alia gignuntur ex materia fluida vel molli, qualis est argilla, tum quia multæ sunt lapidines, in quibus plurimum argillæ occurrit; tum quia innumeri sunt lapides, quorum in sinu includuntur folia, plantæ, animalium ossa. Quo pacto hæc corpora in lapidum quasi visceribus essent recondita, nisi involuta fuerint in materia lapidea, dum adhuc esset fluida vel mollicula? Inveni, inquit D. de Tournefort, pyritas (*pierres à fusil*) & cretæ fragmenta (*des morceaux de craie*) in conchiliis quo-

quorum semper tenuissimum fuit orificium ; in ea proinde intromitti non potuerunt, nisi dum essent fluida, & postea induruerunt.

Sicut in terræ penetralibus delitescunt, fluuntque succi metallici, ita etiam latent succi lapidum, quorum particulae, prout diversae sunt, & variis modis dispositae, diversis lapidum generibus dant originem. Quando illi succi multum arenæ & salis continent, quorum partes oleorum veluti glutine firmiter inter se coherant, & ita disponuntur, ut moles quam efficiunt, poros habeat sinuosos, tunc silex erit, gallice *le grès*. Si vero illius massæ meatus juxta lineas rectas dirigantur, ita ut liberum, & facilem lumini transitum præbeant, inde exurget crystallus. Si tenuissimæ sint arenarum & salium partes, & firmitus secum invicem colligatae, hinc nascetur adamas (*le diamant*). Si præterea in ejus compositionem ve-  
pian corpuscula metallica, inde orientur gemmae (*les pierres précieuses*), diversis tinctæ coloribus, prout diversae erunt particulae metallicae. Ex partibus enim metallicis, quæ cum sale & arena fufis permiscuntur, gemmas conficiunt artifices, naturalibus adeo similes, ut a peritis etiam illarum rerum æstimatoribus non facile secer-  
nantur.

Lapidei hujus succi ope explicari potest, cur reperiantur in terræ sinu plantæ, animalia, homines etiam & pisces in lapidem conversa. Ea scilicet corpora quasdam ob causas sepulta fuerunt in locis quæ succis lapideis abundabant. Hujusmodi succorum sales & arenæ calore subterraneo agitatae, intra illorum corporum meatus sese insinuarunt, novaque firmitatis & soliditatis accessione in lapides ea converterunt. Qua in transformatione naturam adjuvare potest humana industria, ut sic narrat Pater Regnault. (*Entret. Phys. Tom. 1. pag. 224.*)

Mettez un morceau de bois d'aune dans une chaudiere, où l'on cuit le haublon pour la biere. Quand le haublon sera cuit, retirez le

*Physica Tom. VI. O mor-*

morceau de bois ; enterrez-le sous le sable dans une cave, & laissez l'y pendant trois ans. Les particules déliées du sable, agitées par l'action de la matiere subtile, qui traversent rapidement tous les corps sensibles, & par le ressort de l'air mêlé dans les interstices du sable, s'insinueront dans les pores élargis du bois, & elles s'y coloront avec les sucs du houblon. Les parties du bois enchâssées & resserrées entre des corpuscules solides qui rempliront ses pores, deviendront immobiles, & feront avec eux un corps très-dur. Vous aurez aide beaucoup à l'opération de la nature.

Nonnulli sunt lapides qui vegetalium, herbarum scilicet & arborum, vel etiam animalium quorundam habent imagines sibi impressas. Quamobrem a voce græca gallice dicuntur *dendrites*. Maxime verisimile est iis phænomenis ortum dare fluida quædam permixta cum mineralibus diverso colore tinctis. Cum enim lapidum scissuræ & meatus variis modis disponantur, hæc fluida lapidum rimas subeundo, per sinuosos illarum anfractus illabuntur. Inde nascuntur diversæ illæ effigies, quæ gramina, arbores & animalia exhibent.

Aliud est singulare quoddam lapidis genus, gallice dictum *amiante*. Constat ex filis sibi invicem in longitudinem applicitis. Variis in locis reperitur in Ægypto, Tartaria, Namurci, in inferiore Germania (*les Pays Bas*), insula Corfica, in Gallia, nempe in Monte-Albano (*Montauban*), &c. Id habet sibi proprium & maxime stupendum, ut igni etiam vehementissimo contumaciter resistat: testatur enim illustris *Thomas Stillingius*, qui hujus fossilis dotes summa cum diligentia expendit, illud in fornacem conflandis vitris destinatam conjectum, inde illibatum & integrum exisse. Quidam tamen contendunt istum lapidem aliquid e suo pondere in ignibus amittere. Quam imminutionem inde oriri verisimile est, quod corpuscula quædam alie-

aliena huic fossili implicita igne consumantur.

Filis ex ea substantia decerptis uti consueverant Veteres, ad conficienda perpetua quædam ellychnia; ea etiam adhibebant in lucernis sepulchralibus, quas suis idolis consecrabant. Eo præterea pervenerat ipsorum industria, ut ejusmodi fila nerent ex iisque telas contexerent. Narrant veteres quidam Scriptores hanc olim fuisse consuetudinem, ut ea tela involverentur cremanda Regum cadavera, ne ipsorum cineres rogi cineribus commiscerentur. Fertur etiam Neronem Imperatorem habuisse mantilia (*des nappes*) filis contexta ex eo lapide detractis; quæ ut suis purgarentur sordibus, in ignem conjiciebantur. Aliquid simile narrat Plinius (*Hist. nat. lib. 19. cap. 1.*): addit autem materiam hanc, propter filorum brevitatem in telam difficillime converti.

Kirker in opere cui titulus, *Mundus subterraneus*, testatur se chartæ plagulam (*une feuille de papier*) habuisse ex ea fossilis substantia confectam, supra quam scribere facile erat. Ad delendas vero quæ exaratæ fuerant, litteras, eam in ignem injiciebat; unde extracta eundem candorem referebat, quem ante scriptionem habuerat.

Nendi amianti artem perfecit D. Maudel, quam ita exponit D. Valmont de Bomare: *Faites tremper votre amiante dans de l'eau chaude pendant quelque temps: ensuite divisez-le en le frottant avec les mains, afin de séparer toutes les matieres étrangères: répétez cette lotion cinq ou six fois dans de l'eau très chaude: faites ensuite sécher au soleil. & sur une claie de jonc vos fils d'amiant séparés des matieres étrangères. L'amiant étant ainsi préparé, & divisé avec les doigts en parcelles fibreuses, on le met entre des cartes à dents très-fines, & l'on parvient à en retirer très-doucement quelques filamens que l'on trempe dans l'huile pour les ven-*

être plus flexibles. On prend du coton, ou de la laine, ou de la filasse de lin; & à mesure que l'on fait ce fil, mêlé d'amiante & de laine ou de coton, on a grand soin d'y faire entrer plus d'amiante que d'autre matière, afin que le fil puisse se soutenir avec l'amiante. Dès qu'on a fait la soie, on la jette au feu pour faire brûler la laine ou le coton, & il ne reste plus qu'un tissu tout entier d'amiante. *Dict. univ. d'Hist. nat.* 3. édit. tom. 1. pag. 182. & 183.)

Undenam autem singulare illud privilegium habet, ut nihil damni ab igne patiatur? solvendæ huic quæstioni impar est Physicorum sagacitas. Id unum dictum velim, inquit D. Sigaud de la Fond, eos qui mirabilem hunc lapidem diligentius inspexerunt, deprehendisse illius partes simul conglutinatas esse, liquore pingui & viscoso, qui tantum habet tenacitatis, ut ignis nequeat eum in vapores convertere, nec proinde hujus lapidis texturam corrumpere.

Quæres 1. utrum crescant lapides jam formati; 2. an novi quidam generentur.

Resp. Utrumque probant facta certissima. *Baglivi* enim doctissimus Medicus Italus, in suo de lapidum vegetatione tractatu, testatur marmoris fodinas in Italia sic accrescere, ut viz planissimæ nunc in iis locis videantur, ubi centum annis antea fuerant altæ lapidicinæ. Refert idem Scriptor in fodinis recens apertis reperiri secures, malleos, & alia instrumenta, quibus olim opifices ad extrahenda marmora utebantur, in iisdem locis quæ temporis lapsu marmore succrescente, rursus oppleta sunt; nova igitur incrementa suscipiunt lapides jam formati. Non minus certum est novos generari lapides. Plurimi enim sunt quorum in visceribus varia deprehenduntur insecta; qui autem potuissent animalium corpuscula intra lapides jam formatos intrudi? necesse est igitur ut recens fuerit hujusmodi lapidum generatio.

## ARTICULUS IV.

*De Metallis.*

**M***etalli* nomine intelligitur corpus durum; solidum, fusile & mallei patiens, quod scilicet sub mallei ictibus ductile est. Sex numerari solent metallorum species, nempe aurum, argentum, cuprum, stannum, ferrum, plumbum, quibus non pauci adjungunt hydrargirum, sive mercurium.

Loca subterranea e quibus extrahuntur metalla vocantur *fodinæ*, gallice *mines*. Eas autem gigni verisimile est a vaporibus & exhalationibus quæ montium fissuris adhærent, easque paulatim replent. Halitus illi diversi variisque modis permixti, fodinis & metallis dant originem. Venæ metallicæ aliquando veluti sponte sua sunt obviæ, quia terra quæ eas contegebat, a pluvialibus aquis abrepta fuit. Sed plerumque illas rimari necesse est, eaque consulere indicia, quibus deteguntur loca, ubi suas opes natura tenet reconditas. Non semel enim avidorum hominum cupiditati illudit, qui mendacibus signis decepti, terræ sinum nequicquam aperiunt. In montibus eas esse frequentiores, fugit neminem: gramina solito tenuiora, pallentia arborum folia, metallorum ramenta, ac veluti fibræ in vicinis fluminibus conspicuæ, aquæ minerales in locis proximis scaturientes, totidem sunt venæ delitescantis argumenta. Auri atque argenti fodinæ in locis calidioribus ad orientem vel meridiem obversis reperiri solenti; contra plumbi & stanni fodinæ frigidiora amant loca.

De singulis metallis raptim eo differemus ordine, qui in ipsorum pretio institui solet.

## Aurum.

Inter metalla principem locum qualibet ætate, & apud omnes populos aurum semper obtinuit. Ceteris omnibus flexibilis est, gravius, ductilius, tenacius; nec aere, nec aqua, nec igne corrumpitur. Non eadem ubique sunt illius color, durities, pondus. Aurum Siami in Asia, nostro minus fragile est. Aurum Europæum coloris est vegetioris, quam Americanum. Istud posterius maxime pallescit. Suas singulæ orbis partes habent auri fodinas, sed illustriores sunt quæ jacent in Hungaria, in regno Siami, in Japonia, in Ceilano, apud Chilianes, Sinenes, Mexicanos, Peruvienes. Plurimi etiam sunt fluvii, qui aureas arenulas secum devolvunt, ut Rhenus, Rhodanus, Garumna.

Auri bracteolæ (*les paillettes d'or*) crebris lotionibus ab arenis & limo secernuntur, & deinde ope mercurii. Liquor ille, arenis in quibus involutæ sunt auri particule affusus, aurum statim corripit, cum eo sese intime jungit, illudque in imo vase præcipitat. Deinde extrahuntur partes terrenæ, & tandem mercurius igne subiecto in vapores sublatus aurum in fundo vasis demittit.

Aurum quod sibi implicitos habet lapides, quale inveniri solet, primo pilis ferreis conteritur. Deinde translatum ad pistinum, in pulverem redigitur. Pulvis ille cribro succretus cupreo (*passé par le tamis*) cum aqua & mercurio commiscetur. Inde conflata massa, in alveis ligneis (*des auges de bois*) sole sub ardenti per duos dies subigitur (*est pétrie*). Mercurius, neglectis aliis corporibus, quidquid inest auri imbibit & exsorbet, in imoque alveo subsidit. Deinde aquis copiose affusis terra diluta expellitur; denique mercurius vaporazione evanescit.

Ad repurgandum aurum (*pour raffiner l'or*), adhibetur sibiium (*l'antimoine*) quod lapis quidam.



dam est metallicus : liquefactum , id habet proprii, ut tennes, sive terræ, sive metalorum, particulas absorbeat, excepto tamen auro, cui nullo fere modo sese jungit. Aurum vasis fundum petit, & igni subjectum, ex iis ramentis ferrugineis sese expedit, quæ reliquerat stibium. Adhibetur etiam aliud mixtum gallice dictum *le sublimé*, quod mercurio & spiritu salis marini constat ; cum auro fusum in vapores & fumum convertit, quidquid metalli cum auro involutum est. Tandem adhiberi potest *aqua fortis*, quæ omnia dissolvit metalla, aurum vero intactum dimittit.

Auri sinceritatem designant aurifices voce *karat*, quæ vigesimam quartam semper massæ aureæ partem significat. Quando purissimum est aurum, ( quod fere nunquam accidit ) tunc gallice dicitur, *or à 24. karats*. Si vero una parte vigesima quarta imminutum fuerit, tunc vocatur, *or à 23. karats*.

### *Argentum.*

Argentum cetera post aurum metalla dignitate vincit & pretio. Quamvis ipsius superficies aere infusceatur & facile nigrescat, æruginè tamen non absumitur. Purum aliquando & sincerum invenitur, tuncque appellari solet, *argent natif ou vierge*. Interdum notabilis est illius massa. Hujus molis insigne exemplum ita refert in sua Geographia D. de la Croix, ( tom. I. pag. 578. ) *On trouva dans les mines de Schenoberg ( ville de la Misnie ) en 1477. sous l'Empereur Frédéric III., un bloc d'argent d'une grosseur extraordinaire. Le Duc Albert voulut le voir, & descendit dans la mine. Il fit mettre le couvert sur ce bloc précieux ; & dit à ceux qu'il faisoit manger avec lui : L'Empereur Frédéric est un puissant Seigneur ; mais vous conviendrez que ma table vaut mieux que la sienne. On fit ensuite de cette table 400. quintaux de monnaie d'argent.*

Argentum plerumque alia corpora sibi habet permista . Nunc filatim huc illuc discurrit , vocaturque *argent en filet* ; nunc imaginem exhibet arbusculæ , quæ suum caulem , suosque ramulos habet hinc & inde expansos , & nuncupatur *argent en végétation* . Modo foliaceum apparet , tuncque dicitur *argent en feuilles* ; modo tandem instar lamellarum extenditur , & appellatur *argent en lames* .

In quatuor mundi partibus existunt argenti fodinæ , sed ditiores sitæ sunt in America , & præsertim in ea Peruvix regione quæ dicitur *le Potosi* . Quærendum vero est illud metallum in horrendis voraginibus ; inde erumpunt halitus ita exitiosi , ut aliquando fossiores statim præfocent , & miserabiles Indi , qui ad illum laborem compelluntur , plerumque sint membris capti , variisque incommodis conflctati : incredibile est quot homines ip̄ iis horribilibus antris perierint . Longe etiam plures interituri essent , nisi fossiores adversus illam pestem sese munirent , eam herbam mandendo , quæ dicitur *l'herbe du Paraguai* .

In fodinis vulgo reperitur argentum in lapide involutum . Ut inde extrahatur , lapis in pulverem comminuitur . Ex eo pulvere aqua subacta conficitur massa (*pâte*) ; quæ ubi paululum siccata fuit , denuo subigitur cum sale marino . Denique in eam injicitur mercurius , & tertium pinfitur (*on la pèsrit*) & inde coalescit amalgama ex terra , sale marino , mercurio & argento compositum . Mistum illud variis aquis abluitur , ut sola supersit massa ex mercurio & argento constans , quæ dicitur *pigne* . Hæc supra tripodem collocatur , cui subjicitur vas aqua plenum . Totum illud terra in modum capitelli (*chapeau*) cooperitur , qui carbonibus ardentibus circumdatur . Ignis argentum segregat a mercurio , qui in vas subiectum decedit , ibique densatur .

Argentum purissimum dicitur *argent ou titre de*

*de douze deniers*. Denarium, quod 24. grana continet, semper duodecima pars est massæ argenteæ. Quapropter argentum maxime funderum, ab alienisque corpusculis omnino expeditum, 12. partes vel 12. denaria complectitur. Si vero duodecimam contineat alterius materiæ partem, ita designatur, *argent à onze deniers de fin*, huiusmodi est argentum quo constant nummi gallici. Argentum per fuluram optime cum auro sociatur. Inde coalescit compositum, quod utriusque proprietates participat. Si alterum ab altero velis sejungere, totam massam in aquam fortem dejicias, quæ antrum relinquit integrum, & argentum dissolvit. Argentum illo temperatum acido, salem metallicum procreat, qui instar crystalli concrevit, & vocatur *crystal de lune*, violentissimumque est corrodens. Facile tamen liquescit, & colorem induit subnigrum. Tunc appellatur *Pierre infernale*, cujus apud Chirurges frequens est usus, ad consumendas ulcerum carnes.

Argenti fodina *de Salsbery en Suede* singulare præbet spectaculum. In eam descenditur per tres amplissimos hiatus, ope machinæ quam movet aqua. Medio in descensu sentitur frigus asperissimum, & audiuntur torrentium fremitus, qui in antrum illud undique sese dant præcipites. Post semihoram ad imam cavernam devenit spectator. Omnia ibi collucere videt mirabundus. In spatiosam veluti cellam (*salon*) ingreditur, argenteis suffultam columnis; in eam concurrunt (*aboutissent*) quatuor porticus immensi. Lumina quibus utuntur operarii, a fornicum argento, & rivulo qui mediam interfuit fodinam repercussa, millies iterantur (*se répètent*.) Ibi omnium gentium homines videas; alii plaustra trahunt; alii volvunt lapides; unicuique suum est munus. Tandem subterranea quædam est civitas. Illic sunt cauponæ, domus, stabula, equi. Quod vero magis miraberis, ibi est mola vento versatilis (*un moulin à vent*) quam

circumagit aer profluens. Hæc perpetuo motu aquas attollit, quæ fossoribus essent incommodæ..

### *Cuprum.*

Cuprum ductile est, elasticum, & omnium metallorum maxime sonorum. Aliud est rubrum, aliud flavum. Nulla est regio quæ cupro magis abundet quam Suecia & Dania. Ipse fodinæ subviridi quidam robigine sese produnt, quæ extimam terræ in qua continetur, superficiem inficit. Ex omnibus metallis nullum est, quod tantis laboribus extrahatur & purgetur. In terræ sinu altius reconditum est, innumeris admixtum corporibus, variasque formas induens. Cum detecta fuit cupri fodina, effoditur donec occurrerit vena dives, quam accurate persequuntur fossores. Ignem adhibent ad rupem emolliendam, vel pulverem pyrium, ut in fragmenta diffiliat. In iis fodinis reperiuntur lapides variis tincti coloribus. Violacei autem uberiores cupri copiam involvunt.

Lapides illi in fornacem transferuntur, in qua primo funditur cuprum, a crassiorique materia eximitur. Deinde in massam concretum, igni rursus imponitur, donec tota moles incandescat. Tunc in ipsam affunditur aqua, quæ superficiem refrigerat, & lamellam tennem e massa sejungit, quam ab ipsa avellunt artifices. Iteratur hæc operatio, donec distractæ fuerint omnes lamellæ. Illæ bracteolæ ter igni subjiciuntur, ut omnino purgatæ, ad formam quamlibet sub mallei ictibus suscipiendam fiant idoneæ. Quando cuprum ab heterogeneis particulis secum implicatis prorsus expeditum est, tunc vocatur *civre de rosette*.

Late patet cupri usus. Ex eo constantur vasa coquinaria (*vaisseaux de cuisine*); sed inde plurimum imminet periculi. Omnia enim acida, liquores pingues, & ipsamet aqua, cupro robiginem obducunt, quæ promptissimum est venenum,

num, gallice dictum *verd-de-gris*. Cuprum flavum minus quidem periculosum est, quam rubrum; sed tamen eandem rubiginem satis facile contrahit. Nec putes ab illo incommodo tutos nos præstare stannum, quo interior hujusmodi vasorum superficies illinitur; duobus enim vitiis laborat, quæ ita exponit D. Macquer Chymiz peritissimus.

*On a deux reproches considérables à faire à l'étamage ordinaire. Le premier est que les chaudronniers n'y emploient point d'étain pur, & qu'ils y mêlent toujours une quantité de plomb assez considérable; parce que cet alliage donne un bel uni & un beau luisant à leur étamage. Or, les qualités malfaisantes du plomb, & la facilité avec laquelle il se laisse dissoudre par les acides végétaux les plus foibles, doivent le faire exclure entièrement de nos vaisseaux de cuisine.*

Le second reproche qu'en doit faire à l'étamage ordinaire, c'est sa minceur extrême qui s'oppose à sa durée, & qui même ne recouvrant pas le cuivre, ne le met pas entièrement à l'abri du *verd-de-gris*. Je me suis convaincu dans une expérience que j'ai faite avec M. Cadet, qu'une casserole de cuivre rouge de huit pouces de largeur sur trois pouces trois lignes de profondeur, n'a employé qu'un gros & demi de métal pour être parfaitement couverte, & blanchie à la manière ordinaire des chaudronniers. Cet étamage est donc plus mince qu'une feuille de papier; ce n'est réellement qu'une espèce de vernis ou de peinture. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que n'est point pour épargner la matière, que les chaudronniers font un étamage si mince; ils y sont forcés par la nature même de cet enduit, qui, s'il étoit plus épais, ne manqueroit pas de couler, & de se mettre en globules, des qu'on chaufferoit le vaisseau à sec, comme pour les roux. Nous en avons eu la preuve complète dans une autre expérience, où nous a-

vons fait mettre un étamage plus épais qu'à l'ordinaire. (*Diction. de Chymie.*)

Hic satis mirari non possumus, quanta securitate, vel potius cæcitate, alimentorum pars maxima in vasis præparetur, quæ venenum lethale secum important, a quo non defendimur, nisi tenuissima stanni lamella, quæ ipsa tam facile conflari; & ab acidis pervadi potest. Nonne facilius foret Sueciæ prudentiam imitari? quamvis ingentem cupri copiam a natura acceperit, in quo præsertim situm est ipsius commercium, ab iis tamen qui summam rerum tenent prohibitum fuit, ne cuprum in valetudinariis publicis (*les hôpitaux*) & aliis domibus quæ ab ipsis pendent, adhiberetur. Sæpe etiam observatum est artifices, qui fabricando huic metallo dant operam, alvi profluvii (*diarrhées*) morbisque violentis vexari. Undenam oritur illud mali, nisi a corrodentibus cupri particulis, quæ in pulmones & stomachum agunt? In magnis hujus metalli officinis (*les ateliers en grand*) gravis spargitur odor cupri; opificum crines, pellis vultus, manus & ungues viridi colore tinguntur.

Ex cupro aliis substantiis temperato fiunt composita, quæ ipsum pretio superant. Fusum cum semimetallo, cui nomen le zinc dat mixta gallice dicta *le tombac*, *le pinchebeck*, *le similor* & *le métal de prince*. Cum cadmia (*la calamine*) quæ terra quædam est fossilis, & igne purgata, efficit cuprum flavum, a nobis appellatum *laiton*. Ubi cum stanno sociatur, inde coalescit mixtum maxime sonorum, quod vocamus *bronze*, ex quo fiunt tintinnabula, statuae, numismata, tormenta bellica. Si copuletur arsenico, quod semimetallo est fragile, naturæ salinariæ, igne fusile, tunc candescit, & nuncupatur *cuiivre-blanc*.

Cuprum in calcem redactum, adhibetur ad vitra viridi colore tingenda, & opera fictilia Faventina (*les vaisseaux de faïence*.) Dissolutum acido vitriolico dat cæruleum colorem (*du bleu*),

aci-

acido marino, procreat colorem viridem (*du verd*) quo ignes artificiosi colorantur. In crassiori vino exsolutum efficit æruginem dictam *verd-de-gris*. Hæc quippe extrahitur e laminis cupreis in crasso vino, aut uvarum magmate (*marc de raisins*) digestis (*macérées*) Illæ enim substantiæ lamellas cupreas absumunt & corrodunt. Quod vero exesum fuit, cultris abrasitur. Iteratur hæc operatio, donec bracteolæ omnes cupreæ in novam hanc substantiam prorsus conversæ fuerint.

### *Ferrum.*

Ferrum metallum est densum, durissimum, sonorum, ceteraque vi elastica superans. Igne incallescens, crepitat, longas emittit scintillas, & diu incandescit priusquam liquefiat. Tunc plurimos exhalat vapores sulphureos. Ex aqua & aere quamdam contrahit æruginem. Cum auctor naturæ innumeras & utilissimas ferro proprietates indiderit, illud etiam liberalius in terræ sinu disseminavit. Suas quæque regio fodinas habet, & nulla est quæ iis fraudata fuerit. Ex omnibus vero Europæ regionibus nulla est, quæ uberiores ferri copiam, & quidem melioris indolis, suppeditet, quam Suecia. In ea extat mons famosissimus, cui nomen *montagne de fer de Taberg*. Terræ hujus metallicæ altitudo perpendicularis est 400. saltem pedum, suoque in ambitu leucam complectitur. Nihil aliud est, quam immensa ferri massa. Quamvis a duobus & amplius seculi ex eo monte immanes avulsæ fuerint moles, notabiliter tamen imminutus non videtur. In eo reperiuntur cervorum aliorumque animalium ossa. In Siberiæ & Russiæ confiniis mons etiam existit ferro ditissimus, cujus optima est natura. Appellari solet *fer de Sibérie*.

Quinetiam ferrum in quocumque terræ genere, & plerisque in lapidibus latet involutum.

Qua de re clarissimum experimentum D. Becher excogitavit : argillam scilicet adhibuit ex qua lateres conficiuntur. Postquam siccata in pulveremque redacta fuit, ex ea & affuso lini oleo massam effecit, quam in globulos divisit. Hos denique in ampulla cornuta (*une cornue*) positos igni subjecit. Qua ratione oleo extracto, in vasis fundo non resedit nisi materia sicca & nigra, quam in pulverem comminuit, cribro succrevit & abluit. Hæc materia fecem nigram deposuit, in qua non parum ferri in pulverem extenuati repertum est, cujus particulas ope magnetis a reliquo sedimento segregavit. In cineribus etiam plantarum, substantiarumque animalium, præsertim carnis & sanguinis humani, plurimaprehenduntur ferri corpuscula.

Ferrum in fodinis modo terra veluti incrustatum reperitur, modo crassioribus arenis admixtum. Non sine multo labore ab alienis substantiis secernitur.

1. Postquam egregie ablutum fuit, a terrenisque partibus segregatum, ope ignis violenti & alicujus acidi liquatur. Quo in statu per 12. horas retinetur. Deinde in formas (*des moules*) ex arena conflatas funditur, in quibus concrevit in massas gallice dictas *lingots*. Ferrum illud primo liquefactum appellari solet *fer en gueuse* ou *fer de fonte*. Ex eo conficiuntur quæ gallice dicimus *des pots*, *des vases*, *des tuyaux*, *des boulets de canon*, *des bombes*, *des mortiers*, *des marmites*, *des plaques de cheminée*.

Ut accuratius repurgetur primum illud ferrum, iterum liquatur, & longis vectibus ferreis (*barres de fer*) agitur. Deinde incudi impolitum, assidue tunditur mallei ictibus, cujus pondus libras quingentas superat, & qui aquarum impulsu attollitur, tunc ferrum est mallei pariens. Inde ad fornacem refertur, ubi incalcescit donec candescat. Tunc incudi redditum nervosis fabricarum brachiis elaboratur, & cuicumque formæ



formæ sese accomodat. Modo in tenues bracteas extenditur, quæ stanno illinuntur, ne æruginem contrahant. Hujusmodi ferrum dicitur *fer blanc*; modo per varia laminæ ferreæ foramina, quæ sensim decrescunt, ductum, in filum tenuatur quod appellamus *fil d'archal*.

Ferrum expurgatum & certo modo temperatum in chalybem (*acier*) convertitur. Cujus mutationis perficiendæ hanc rationem, tanquam efficaciorē, tradit clarissimus *de Réaumur*. Sumantur duæ fuliginis partes, una carbonis & cineris, tres circiter quadrantes salis marini. Ex iis simul permixtis, in pulveremque contritis fit massa, qua involvendæ sunt laminæ ferreæ, & insuper argilla cooperiendæ. Deinde igni vehementissimo subjiciuntur. Quid vero inde contingit? illius concretionis partes calore agitatæ, & sales ferri meatus subeunt, materiam terrenam nondum satis a natura elaboratam expellunt, ferri interstitia occupant, illiusque particulas inter se magis cohærentes efficiunt. Hinc flexibilis & durius fit metallum, chalybisque naturam induit.

Si utilitatem spectes, inter metalla principem locum merito ferrum sibi vindicat. Ex eo quippe artes omnes, siue mechanicæ, siue liberales, instrumenta mutuuntur, quæ ipsis necessaria sunt, ut finem suum assequantur. Quid enim nobis profutura essent aurum, argentum, aliaque metalla, si ferrum nos deficeret, cujus ope nostros in usus converterentur? Cetera metalla contra se invicem adhibita mollescunt & hebeantur. Ferrum solum ea domat, & tractat imperiosius.

### *Stannum.*

Stannum est coloris albicantis, sed qui facile obscuratur. Omnium metallorum est levissimum, & plumbo excepto, mollissimum. In bracteolas tenuissimas contundi potest. Cum pluri-

mun sulphuris contineat, haud ægre liquefit. Omnibus, si plumbum excipias, metallis facile sese jungit; sed præsertim cum ferro & cupro copulari amat. Ex intima stanni cum cupro sociate id mirabile contingit, quod scilicet metallum ex utroque conflatum, plus habeat gravitatis specificæ, quam duobus metallis suam ante conjunctionem inerat.

Varii sunt stanni usus. Ex eo conficiuntur vasa (*de la vaisselle*); in æris (*du bronze*) & tinnabulorum compositione suas habet partes. Cupro illinenda (*pour étamer le cuivre*) fabricandisque musici organi fistulis (*les tuyaux d'orgue*) inservit. In calcem redactum id procreat quod vocitari solet *la pâte d'étain*, cujus tanta est artificibus utilitas, ut opera sua expoliant. Adhibetur etiam simul cum mercurio, ad obducendam partem speculorum posticam; unde fit ut speculum objecta nobis exhibeat, radios ex iis profectos sistendo & reflectendo.

### *Plumbum & Hydrargyrum.*

Plumbum omnia post aurum metalla gravitate superat, nullum etiam ipso mollius est, minusque saporum & ductile. Plerumque cum ferro, & cupro & argento permixtum reperitur. Postquam massa, in qua continetur plumbum cum variis substantiis implicatum, e terræ sinu extracta fuit, pilo contunditur: deinde post repetitas lotiones liquatur, ut ex ea prodeat metallum: cum vero plumbum adhuc quasdam retineat cupri & argenti particulas, ut ab iis segregatur multiplex adhiberi solet præparatio.

Plumbi liquefacti superficies quadam veluti calce cinerea obducitur, quæ deinde colorem flavum induit. Si fusarum igne vehementiori urgeas, hæc scoria in colorem rubrum transit, tuncque vocatur *minium*, cujus plurimus est usus in pictura. Denique si ignis ardorem ulterius pro-

promoveas, plumbum convertes in vitrum sub flavum, quod expoliri potest, & cum electro flavo plurimum habet similitudinis. Ex eo conficiuntur monilia. Illud autem mirabile est, quod plumbum eo gravius fiat, quo magis in calcem & fumos abit; ita ut centum plumbi libras efficiant centum & quindecim minii libras.

Plurimum variari possunt plumbi dotes & usus, si cum aliis metallis permisceatur: ex apta, ut jam diximus, plumbi & stanni temperatione, prodeunt musici organi fistulae. Praecipua vero plumbi & stanni simul junctorum gloria, in eo sita est, quod fabricandis litterarum typis (*characteres d'Imprimerie*) inserviant. Unde fit, ut ejusdem libri exemplaria tam cito multiplicentur.

Hydrargyrum instar plumbi liquefacti fluidum est, nec madefacit. Ex frigore naturali, vel acerbissimo, nihil acquirit soliditatis. Adhibito tamen frigore artificiali 186. graduum cum  $\frac{2}{3}$ , DD. Grischow & Braun ex Academia de St. Petersburg anno 1760. hydrargyrum ita perdomuerunt, ut ipsius mobilitatem sisterent, illudque fixum & mallei patiens efficerent. Suis in fodinis aliquando purus & liquidus reperitur mercurius. Sed plerumque in alienis substantiis involvitur, a quibus per evaporationem expurgatur. Eum quippe ignis in auras facile dissipat. Fossores qui mercurio e fodinis extrahendo dant operam, non diu vivunt; sed brevi membris omnibus capti sunt, & febre hectica extabescens moriuntur (*meurent étiques*). Quod tribuendum est vaporibus exitiosis qui e mercurio erumpentes, nervos male afficiunt.

## C A P U T II.

### De Vegetalibus, sive Plantis.

**P**lantarum nomine intelliguntur corpora quolibet organis instructa, quae succum terræ nu-

nutritium intus suscipiendo, crescunt, adole-  
scunt, & aliud sibi simile generandi facultatem  
habent, qualia sunt legumina, arbores, flores,  
&c. In mirabili plantarum multitudine & varie-  
tate, quis non agnoscat manum Dei beneficam,  
quæ eas tam liberaliter supra terræ superficiem  
disseminavit, non ad ipsius ornamentum dunta-  
taxat, sed maxime ut hominis utilitati inservirent?  
Quidquid circa materiam hanc præcipuum erit  
diversis complectemur quæstionibus.

Quæres 1. undenam oriuntur plantæ?

Resp. Oriuntur ex semine, in quo prima plan-  
tulæ rudimenta continentur involuta, & impli-  
cata; sed quæ postea, accedente succo nutritio,  
paulatim intumescunt, sese explicant, & tandem  
in quamdam plantæ speciem assurgunt. In glan-  
de, ex. g. conspicitur quercus habens folia, &  
accuratam partium proportionem.

Vel enim plantæ omnes ortum habent ex se-  
mine, in quo ipsam plantulam natura jam de-  
lineavit; vel quædam plantæ ex fortuito succo-  
rum concursu prodeunt: atqui id posterius dici  
nequaquam potest. 1. Enim ex eadem specie non  
oriuntur nisi plantæ omnino consimiles. Num-  
quid autem ita constans & æquabilis est concursus  
fortuitus, ut innumetis in plantis tantam affe-  
cter similitudinem? 2. Si plantæ ex temeraria  
succorum permissione nascerentur, novæ & prius  
incognitæ plantarum species frequenter appare-  
rent. Succum enim modis numero prope infinitis  
simul possunt concurrere: atqui tamen id expe-  
rientiæ adversatur.

Denique tam stupenda est plantarum structura,  
tam mirabile artificium, tam elegans aptaque  
partium organicarum dispositio, ut etiam viri  
peritissimi, consociatis ingenii sui viribus, plan-  
tam, vel minus perfectam, procreare tentarent,  
nequicquam in eo opere sudarent; numquid ergo  
id efficiet cæcus fortuitusque casus? plantæ igitur  
omnes suum habent ortum ex seminibus, quæ  
eas veluti summatim continent.

Di.

Dices : quædam nascuntur plantæ in locis ubi nulla sunt semina, in altis scilicet montium rupibus, supra ædium tecta, in dirutis ædificiorum parietibus; ergo, &c.

Resp. Neg. ant. Multæ enim sunt causæ, quæ plantarum semen in loca ab hominibus non culta transferre possunt. Volucres quippe sive rostris, sive unguibus aliquando plantarum semina deferunt in ædificiorum rudera, in domorum tecta, in montium cacumina. Venti etiam & exhalationes tenuissima quarundam plantarum semina secum asportant, passimque dispergunt, quæ succos sibi accommodatos nacta, sese explicant & adolescunt. Nullas absque semine nasci plantas, celebri experimento confirmavit Malpighi, Medicus Bononiensis. Terram scilicet e profundiori loco erutam, in vase vitreo conclusit, quod velo multiplici sic obduxit, ut aerem & pluviam excipere posset, leviora autem semina, huc & illuc a ventis jactata, excluderet: porro in hujusmodi solo nequidem herbula pullulavit.

Quæres 2. quænam sint plantarum partes præcipuæ.

Resp. Septem sunt, nempe radix, truncus, rami, folia, flores, gemmæ (*les boutons*) semen (*la graine.*)

Quæres 3. quid sit radix, & quibus constet partibus.

Resp. Radix ea est pars, qua planta solo adhæret, & succum nutritium e terra excipit, qui inde in omnes plantæ partes distribuitur. Tria in radice sunt distinguenda, nimirum *cortex*, *substantia lignosa* & *medulla*. *Cortex* tenuibus componitur canaliculis, qui fibræ dicuntur. Alius est externus, qui veluti crassior pellis, supra externam radicis superficiem extenditur; alius interior, qui instar pelliculæ tenuioris, substantiam lignosam immediate obvolvitur; alius denique est cortex, qui duos inter priores medium locum occupat, *Substantia lignosa*, sicut & cor-

& cortex, est congeries fibrarum concavarum, quæ aliæ juxta alias positæ sunt, & quarum nonnullæ sibi invicem implicantur. Denique *medulla* vocatur pars delicatior, quæ radicis veluti cor occupat, & succis percolandis videtur destinata.

Cum arborum radices in terra huc & illuc sese inflectant pro variis quæ offendunt obstaculis, inde fit ut magis torruosæ & magis nodosæ sint, quam reliqua arbor. Partes illæ, quarum fibræ mille modis incurvatæ fuerunt, diversisque liquoribus imbutæ, artificibus dictis *Ebénistes*, ligna suppeditant venosa, innumerisque tincta coloribus, ita ut opus ex iis coagmentatum e pictoris officina exiisse videatur.

Quæres 4. quid trunci nomine intelligatur.

Resp. Truncus quem in arboribus *caudicem*, in herbis *caulem*, in tritico *calamum* vocant, est quasi plantæ corpus, a solo & radicibus asurgens. Sicut radix, sic etiam truncus tres diversos cortices, materiam lignosam, & medullam habet. In eo præterea deprehenduntur canales exigui, in spirarum modum contorti, qui ex una parte aerem exteriorem attingunt, ex altera vero ad radices usque, magis ac magis sese expandendo, protenduntur. Per hujusmodi tubulos, vel tracheas, plantæ respirant, & aerem externum excipiunt.

Plantis necessarium esse aerem certum est: eo nimirum deficiente, intereunt; & quando non satis habent aeris, languescunt; ubi autem aere liberiori fruuntur, tunc recreantur & convalescunt. Omnem ea de re dubitationem remouet experimentum a D. Pluche tentatum. Lactuæ semina terræ mandavit aeri exposita; eodem tempore ejusdem generis semina terræ commisit, quam sub machinæ pneumatice excipulo, post extractum inde aerem, collocavit. Quid vero contigit? prius semen germinavit, & octo post dies ad unius pollicis cum  $\frac{1}{2}$  altitudinem pervenit: alterum vero semen aere de-

si-

stitutum, in terra mansit reconditum. Deinde in excipulum aere revocato, semen exortum est, & intra dies octo ad 2. pollicum altitudinem sese extulit.

In trunco etiam distinguuntur duplicis generis vasa, quorum alia *propria*, & alia *lymphatica*, dici solent. *Propria* sunt canaliculi, qui juxta arboris longitudinem protensi, succum continent, ad eam nutriendam accommodatam. Qui succus varius est pro variis plantarum speciebus. Vasa *lymphatica* quodam liquore turgent, qui *lymphæ* dicitur, & ab aqua pura multis in plantis vix discrepat. Hujusmodi liquor in vite copiosior est, ex qua, ineunte vere, uberrimè exstillat; quo tempore vitis lacrymari dicitur.

Quæres 5. de ramis quid sentiendum sit.

Resp. Haberi possunt rami tanquam surculi ( *des rejetons* ) e caudice prodeuntes, ipsique omnino similes: totidem sunt, ut ita dicam, novi trunci. Enimvero si quarundam plantarum rami in terra defigantur, radices agunt, crescant, sursum sese efferunt; uno verbo novæ fiunt plantæ iis consimiles, ex quibus decerptæ fuerunt; ipsis igitur suæ sunt fibræ, suæ radices, quæ sese non evolvunt, nisi cum solo infodiantur; iisdem instructi sunt vasis & organis, ac truncus ipse ex quo prodierunt.

Quæres 6. qualia sint folia, & quis eorum usus.

Resp. Folia e ramis nascuntur innumerisque fibris & glandulis instructa sunt. Pilis etiam vestiri solent, qui totidem sunt tubuli, per quos pluviam aut rorem exsugunt. Ideo autem herbæ aquaticæ, quale est nasturtium ( *le cresson* ) sunt ærsæ, nec pilis hirsutæ, quia iis non egent, ut notat D. Mariotte.

Folia non sterilia sunt plantarum ornamenta: 1. Enim antequam sese evolvant, flores ipsis involutos tuentur, ut paulatim vim aeris ferant.

2. Explicata folia fructus, potissimum teneriores,

res, ut fraga, uvas & alios hujus generis a nimio calore defendunt. Hinc folia in iis plantis majora sunt, quam in malis & pyris, quorum fructus solidior, aeris impressiones minus reformidat.

3. Ad plantarum fructuumque conservationem plurimum conferunt folia, quibus si exuantur, languescunt, vel etiam omnino pereunt. Per diem enim calor succum in folia impellit, qui per eorum meatus in auras dissipatur. Redeunte vero noctis frigore, folia quæ per totum diem exhalant, rorem exsugunt quo rami, fructus, flores, totaque planta humectatur.

Quæres 7. quæ sit gemmarum natura.

Resp. Gemma (*le bouton*) est quasi foetus involutus, qui suum in tempus servatur. In tenero surculo, circa mensem Junium, erumpere solet, ut proximo vere adolescat. Inter gemmas quæ in eadem planta exoriuntur, aliæ in apicem desinunt, e quibus postea rami sunt nascituri; aliæ sunt crassiores, & formam magis rotundam induunt, ex quibus flores sunt erupturi. Quam ob causam dicuntur *boutons à fruit*.

Quæres 8. quænam sint circa flores observanda.

Resp. Flores sunt ea plantarum pars, quæ postquam oculos amoenissimis coloribus, & nares odore suavissimo recreavit, in fructum convertitur. Eæ sunt præcipuæ floris partes, nempe *pistillus* (*le pistil*), stamina (*les étamines*) & folia. *Pistilus* e centro floris sese attollit. Cavus quidam est tubus qui, instar uteri, semina recondit. Circa eum assurgunt fila tenuissima, quorum extrema in modum capsularum desinunt. Hæc fila dicuntur *filamina*, eorumque apices nomen capsularum retinent. Stamina foliis circumcinguntur, quæ ad illud destinata sunt, ut partes floris præcipuas ab aeris injuria defendant. Quando staminum apices maturitatem assecuti sunt, dehiscunt, in interioremque *pistilli* capacitatem quemdam fundunt pulverem, quo semina secundantur.

At,



At, inquires, aliæ sunt arbores masculini sexus, quæ flores tantum pariunt, & aliæ feminini sexus, quæ fructus duntaxat ferunt; ergo pulviscula e capsulis manantia ad seminis fecunditatem nihil conferunt.

Resp. arborum masculinarum pulviscula, in aliarum pistillos aeris agitatione deferri, sicque semen fecundare. Veritatem hanc probat factum a Joviano Pontano memoratum, qui præceptor fuit Alfonsi Regis Neapolis. Refert autem suæ ætate visas esse duas palmas ( *palmiers* ); alteram masculam Brundusii ( *Brindes* ) excultam; alteram vero feminam in silva Hydruntina ( *d' Otrante* ) quæ a Brundusio plus quam 15. leucis distabat. Palma feminini sexus non tulit fructus, nisi postquam supra ceteras silvæ arbores ita sese extulisset, ut palmam masculam prospectare posset. Cujus rei hæc afferri solet causa: scilicet palma femina, superatis aliis silvæ arboribus, tunc suis in pistillis excepit pulverem staminum, quem in palma mascula decerptum ventus ad ipsam deferrebat.

Quæres 9: an arte aliqua possint hortorum flores variis distingui coloribus.

Resp. Quomodo id assecuta fuerit humana industria sic exponit D. Valmont de Bomare: *L' intérêt & la curiosité ont fait trouver les moyens de panacher & de chamarrer les fleurs, vivantes des jardins; comme de faire des roses vertes, jaunes, bleues, & de donner en très-peu de temps deux ou trois couleurs différentes à un œillet, outre son teint naturel. On pulvérise, par exemple, pour cela de la terre grasse desséchée au soleil, on l'arrose ensuite l'espace de vingt-jours d'une eau rouge, jaune, ou d'une autre teinture, après y avoir semé la graine de la fleur d'une couleur contraire à cet arrosement artificiel. On lit dans d'Encyclopédie que quelques personnes ont semé & greffé des œillets dans le cœur d'une ancienne racine de chicorée sauvage, qu'elles l'ont reliée étroitement, l'ont environnée d'un*

d'un fumier bien pourri ; & par les grands soins du fleuriste on a vu sortir un œillet bleu , aussi beau qu'il étoit rare . D'autres ont enfermé dans une petite canne trois ou quatre graines de fleurs différentes , & l'ont recouverte de terre & de bon fumier : ces semences de diverses tiges ne faisant qu'une seule racine , ont ensuite produit des branches admirables pour la diversité des fleurs . Enfin quelques fleuristes ont appliqué sur une tige divers écussons d'œilleux différens , qui ont poussé des fleurs de leur couleur naturelle ; & qui ont charmé par la variété de leurs couleurs . Les fleurs en théâtre ou en parterre varient aussi par leur voisinage ; si les poussieres qui tombent des étamines sont portées par l'air sur le pistil d'une autre fleur voisine , de même espèce , mais de différente couleur , les graines qui en proviendront produiront une nouveauté dans le coloris de la fleur future . ( Dict. d'Hist. univ. 3. édit. tom. 3. pag. 509. & 510. )

Quæres 10. quonam artificio per mediam hiemem , & qua liberit die , haberi possint flores explicati ( écloses . )

Resp. rem ita fieri : Quando ultimi prodeunt flores , eligendæ sunt gemmæ ( les boutons ) bene formatæ , & jamjam sese expansuræ ( prêts à s'ouvrir . ) Cum forficibus ( ciseaux ) ita inciduntur , ut longissimum habeant pediculum ( queue ) ; partem sectam cera illinere oportet . Postquam gemmæ factæ fuerint marcidæ ( fanées ) , singulæ seorsim in papyro bene siccata involvendæ sunt , & postea in pyxide ( boîte ) clauduntur . Ubi florem explicatum volueris , pridie rescanda erit extremitas quæ cera fuit illita ; eam deinde ponas in vase quo contineatur aqua nitro paululum imbuta . Postridie gemmas videbis dehiscere , sese expandere , vividis coloribus splendescere , & odorem sibi proprium efflare .

Quæres 11. quænam circa semen annotanda sint .

Resp. Semen ( la graine ) ea est plantæ pars , quæ

quæ ab Auctore naturæ destinata est ad varias plantarum species propagandas. Semina plurimis muniri solent involucris, quæ ea ab aeris aliorumque corporum injuria defendant. Alia in intimis fructus quasi visceribus recondita sunt, ut in pomis & pyris. Alia in siliquis includuntur, ut pisa & fabæ; alia præter fructus pulpam (*outré la chair du fruit*) ligneis putaminibus obvolvuntur, ut nuces & amygdalæ; nonnulla denique munimentum habent spinis hirsutum, quo tuta sunt ab omni injuria, donec plenam ad maturitatem pervenerint, ut castaneæ. Adeo seminibus a Creatore provisum est!

Præter hujusmodi involucria & tegumenta quæ externa dicuntur, unumquodque semen pelle obducitur, quæ duas continet partes, quarum altera *pulpa* & altera *germen* vocatur, id maxime conspicuum est in faba. Detracta enim qua involvitur, tunica, occurrunt duæ partes a se invicem distinctæ, quæ *lobi* seminis appellantur: ii vero nihil aliud sunt quam acervus farinæ quæ succo nutritio permixta, humorem quemdam lacteum, vel puliculam (*bouillie*) efficit, unde prima sua alimenta tracturum est germen. In lobi extremitate superiore germen, instar clavuli, desigitur. Germen vero constat corpusculo vel caule & pediculo qui futuræ radicis est primordium. Plantulæ corpus vel caulis in interiori semine paululum reconditur, radícula autem est apex ille qui videtur prior jamjam erupturus.

Quæres 12. quomodo fiat germinis evolutio & vegetatio.

Resp. Ex pisorum & fabarum seminibus, de aliis judicandum est; in omnibus enim eadem fere est structura. Jam autem observavimus, si faba suo integumento exuatur, in ea duas partes deprehendi, quæ dicuntur *lobi*, quorum in parte superiori situm est germen; istud vero constare caudice & pediculo qui in perfectam radicem est abiturus. Pediculus ille cum lobis colliga-

ligatur duobus vinculis, vel potius tubulis ramosis, quorum ramuli in lobos sese diffundunt, ut ex iis alimentum trahant plantulæ necessarium.

Caudex, sive corpus plantæ, duobus involvitur foliis, in quibus, velut in theca, includitur. Hæc duo folia dicuntur *seminalia*, & prima sese expediendo, extra semen & terram erumpunt; hinc & inde assurgunt, sicque tenellulo caudici viam sternunt, eumque defendunt a frictione qua læderetur. Postquam radícula succis lacteis sese enutrivit, quos e lobis extrahit, in seminis involucro tenuem reperit aperturam, quæ ipsius apici respondet; eam ope microscopii in nucleis vel durissimis deprehendere poteris. Per angustum illud foramen viam sibi eluctatur radícula, & plurimas in terram emittit fibras subtiles, quæ vocantur *capillares*. Toridem sunt canaliculi, per quos in radicem succus defertur, unde in ipsum caudicem transmittitur, quem cogit sursum se efferre.

Lobi postquam in nascentis plantæ gratiam exhausti sunt, putrescunt & exsiccantur. Pariter folia *seminalia*, expleto erga novam plantam suo munere, marcescunt. Tunc recens planta per suam radicem e terra succos extrahit, iis vegetiores & copiosiores, quos ipsi semen prius supeditabat, sicque magis ac magis firmatur & invalescit, suasque partes diversas explicat, quæ prius aliæ in aliis convolutæ erant & complicatæ.

Quæres 13. quid eveniat, quando pars seminis unde radix proditura est, superiorem in terra locum obtinet, & inferiorem occupat pars altera ex qua caulis emersurus est.

Resp. Quando semina inverso situ terræ mandantur, radices aliquanto post ita sese flectunt, ut locum inferiorem sibi vindicent. Cujus rei hæc videtur esse causa: cum scilicet radices tubulos habeant latiores, succos excipiunt iis graviores, qui ad caulem perveniunt; pars igitur seminis quæ radicem continet, debet sua

gra-

gravitate vincere pondus alterius partis in qua caulis situs est, sicque deorsum ferri.

Quæres 14. quomodo nutriantur plantæ.

Resp. Huc usque plantam quasi in fasciis inspicimus. & succo lacteo nutritam, quem e lobis exsugit. Cum vero tenellulæ infantie succedit valens juvenus, tunc cogitur suis alimentis providere. Ubi animal e lacte materno removeatur, tunc suum ipse quærit alimentum, & natura duce, ea discernit quibus opus habet nutrimenta. Aliquid simile in plantis deprehendimus: Terra suos sales. & succos ad plantarum radicem indiscriminatim, & sine ullo delectu adducit. Sed omnes singulis plantis non conveniunt. Aliæ acres, aliæ dulciores succos postulant. Hæc humore lacteo, illa vescitur oleo. Plantarum Creator qui eas omnibus vasis instruxit, ad ipsarum nutritionem necessariis, imis illorum vasorum partibus quædam aptavit veluti cribra, quorum diversi meatus quosdam admittunt succos & sales, aliosque rejiciunt & excludunt. Succis quibus unaquæque planta nutritur, gallice dicitur *la sève*.

Quæres 15. undenam oriatur plantarum juxta longitudinem simul & latitudinem incrementum.

Resp. 1. Ideo excrescit in longum planta, quia succus perpetuo lapsu a radice ad ramos allabens, fibras extendit ex quibus planta coalescit.

2. Latitudinis, sive crassitudinis incrementum ex cortice interiori reptendum est, qui ab externo sese, unoquoque vere, disjungit, ut substantiæ lignosæ firmiter adhæreat. Sic enim novum orbem (*un nouveau tour*): ligno juxta totam suam longitudinem impertit. Cum arbor ita præciditur, ut sectio ejus radicibus sit parallela, facile est unumquodque incrementum annum discernere. Varii enim circa medullam arboris circuli conspiciuntur, plus minusve densi; ita ut arboris anni certo computari queant, per numerum circulorum quos exhibet substantia lignosa. Orbis ultimi naturæ sunt mollior-

ris,

ris, & dicuntur *alburnum* (*P aubier*), quod rejiciunt artifices, quia suam ob molliem elaborari non potest. Alburnum illud annis subsequen-  
 ✓ tibus ita densatur & indurescit, ut a vero ligno non discrepet; sed novum aliud succrescit, quod a tenuiori cortice procreatur.

Quæres 16. quam ratione accelerari possit alburni (*de P aubier*) durities.

Resp. Mira quadam sagacitate eo pervenerunt D. D. *de Buffon* & *Dubamel*, ut alburno brevi tempore eam duritiem conciliarent, quam nonnisi post multos annos, aut forte nunquam habuisset: suo nimirum cortice nudanda est arbor, quo tempore maxime viget succus nutritius; postquam autem arefacta est arbor, succiditur. Succus qui cortici alimenta subministrabat, in alburnum confluit uberius; cujus poros maxima ex parte obstruens, ipsi eam duritiem & densitatem impetit, quæ ipsum cuilibet operi idoneum efficiat. Ligni etiam formati soliditatem plurimum auget decortitatio.

Quæres 17. quam causa succum nutritium cogat intra plantas ascendere.

Resp. Multiplex afferri solet: 1. Liquores intra tubos *capillares* attolluntur; lignosi autem plantarum canaliculi, intra quos assurgit succus nutritius, totidem sunt tubi *capillares*. 2. Fibre ligneæ sunt quasi tubuli, qui a radicibus ad alias partes protenduntur. Hujusmodi fibrarum pars infima in succis terrestribus immergitur; ii vero succi crasso aere compressi, intra cavas plantarum fibras ascendunt, ubi minorem patiuntur pressionem. 3. Aeris columnæ laterales, atmosphæræ pondere magis premuntur quam aer qui fibrarum orificio respondet; iste ergo intra fibrarum tubulos evehitur, succosque sibi obvios antrorsum propellit. 4. Aer in fibris inclusus calore dilatatur; dum vero sese expandit, humorem in iis contentum sursum impellit.

Quæres 18. utrum in plantis admittenda sit succorum circulatio.

Resp.

Resp. Ea est communis opinio, succum nutritium ad supremas plantarum partes assurgere, & deinde versus infimas descendere; quo in motu sita est succorum circulatio. In hujus sententiae gratiam afferuntur ingeniosa experimenta.

1. Enim quando plantæ lactariæ, ut tithymalus, arctiori vinculo in medio caule constringuntur, supra vincturam fit tumor: atqui plantæ, iniquiunt, non ita intumescunt, nisi quia succus a partibus superioribus ad inferiores delapsus, opposito ligamine sistitur, & sese colligit.

2. Pergunt iidem Physici, si cujus arboris truncus, duas habeat radices, quarum altera terræ sit infixæ, altera vero extra terram emineat, & ista resecetur; ramos & folia anno subsequente proferet, etiam si quatuor digitis a solo distet; quod sane fieri non posset, nisi radix secta succum acciperet, qui postquam ad ramos ascendit, deinde ad radices remeat.

3. Aliquando contingit ut duarum carpinorum (*chames*) trunci suos cortices in aliqua parte simul consociant, ita ut succus ab uno in alterum transeat. Si mense februario alterutrum truncum resecet infra corticum mutuam cohesionem, rami laterales infra corticum junctionem, vere novo furculos & folia proferent; necesse est igitur eos per interpositam truncorum cohesionem succum recipere, qui a parte superiori ad inferiorem defluat. Sicut ergo sanguis in animalibus a corde per arterias totum in corpus diffunditur, & a singulis corporis partibus per venas ad cor reducitur; ita succus nutritius in plantis perpetuo circuitu a radicibus ad ramos allabitur, a ramisque ad radices relabitur. Quam comparisonem his versibus exprimit Vaniërius suo in *Prædio rustico*:

*Succus enim tenues subit abs radice meatus  
Pervaditque comas, & vertice lapsus ab alto  
Circuit, ac late plantam defertur in omnem;  
Sanguis ut humanos circumvagus irrigat artus.  
Perpetuo illo circuitu, sive ita & reditu, suc-*  
cus

cus nutritius durior semper & subtilior evadit, pro variaque fibrarum quas permeat textura variis modis percolatur, digeritur, ac veluti excouquitur.

Hæc sententia ingeniosis quidem observationibus nititur; sed alias accuratiores opponit doctor Hales in opere eximio cui titulus: *Statique des végétaux*. Ibi contendit succum nutritium per eosdem tubulos in plantas sese attollere & descendere, quod multis comprobatur experimentis. Unus, v. g. e grandioribus arboris ramis resector, & parti derruncatæ ( *au tronçon* ) aptetur tubus vitreus qui mercurium contineat: tunc hydrargirum videas per diem a succis attolli, & per noctem demitti; ita ut quænam sint succorum vires ex mercurii altitudine æstimari possit. Ceteris aliunde paribus, eo majores sunt mercurii variationes, quo calidior est dies & nex frigidior. Qua in opinione plurimum est analogiæ inter modum quo succus intra plantas attollitur, & modum quo liquor in thermometro ascendit vel descendit. Hæc opinionum circa succi nutritii motum diversitas probat, a Physicis multa superesse adhuc inquirenda, ut ea de re probe exploratum habeant naturæ arcanum.

Quæres 19. quænam sint plantarum morbi sanabiles.

Resp. Nimia succorum affluentia & defectus, nonnullique casus externi, diversos plantis morbos afferunt, quibus mederi facile est.

1. Quidem nimia succorum copia plantas vel præfocare potest, vel earum fibras dirumpere. Cui malo ut occurratur, plantis variæ fieri debent incisiones, ex quibus defluat quidquid in succis nutritiis superfluum est. Sic repetitis venæ incisionibus sanantur homines, quorum corpus sanguine copiosiori laborat.

2. Non minus plantis nocet succorum penuria, quam nimia eorundem copia. Eas, nisi opem promptus tuleris, languescere, flavescere, & tandem interire videas. Languidulis hujus-

mo-



modi plantis, & crebra irrigatione, & pingui fimo succurrendum est: tum receptis novis succis & viribus, omnino convalescent. Eadem mala experiuntur homines & animalia, quando ipsis deficiunt alimenta; nec aliter quam salubribus & bene præparatis nutrimentis reficiuntur.

3. Denique frigos, calor, gela, insectorum punctiones, quædam vulnera, totidem sunt casus externi, quibus non minus afficiuntur plantæ, quam homines & animalia. Unum hic annotabo: ramus arboris semis fractus eodem fere modo, quo tibia hominis, vel animalis, restituitur; duæ scilicet rami partes ad sese invicem admoventur, iis applicatur medicamentum (*appareil*) quo succus retineatur; iste vero per solitos canaliculos fluens, ambas rami partes internectit.

Quæres 2. quinam plantarum morbi habendi sint insanabiles.

Resp. Duplex est, nempe succorum malignitas & senectus: hæc fibras dilacerat, illa vero pestilenti carie infestat. Idem hominibus & brutis contingit. Adversus pestem vix aliquid remedii habent Medici, nullum vero contra senectutem.

F I N I S.

NOI

# NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

**C**Oncediamo Licenza alla Dita *Giuseppe Remondini, e Fi.* Stampatori di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Institutiones Philosophicae auctoritate DD. Archiepiscopi Lugdunensis ad usum Scholarum suae Diocesis Tom. Sex.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 14. Dicembre 1790.

( *Andrea Querini Rif.*

(

( *Zaccaria Vallarezzo Rif.*

Registrato in Libro a Carte 413. al  
Num. 3193.

*Marcantonio Sanfermo Segr.*

A. 1  
1453221



3.75.








Fig. 8



Fig. 5.







Fig. 93.

Fig. 9

